



# مشاوره تحصیلی هپیوا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ثبت نام ، انتخاب رشته و برنامه ریزی

آزمون دکتری وزارت علوم و بهداشت

برای ورود به صفحه مشاوره آزمون دکتری کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی آزمون دکتری

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹

تماس از تلفن ثابت

372

A

# آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## رشته مدیریت منابع خاک - (کد ۲۴۲۱)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - شیمی و حاصلخیزی خاک - فیزیک و حفاظت خاک - رده‌بندی و ارزیابی خاک - فیزیک و حفاظت خاک پیشرفت - پیدایش و رده بندی خاک پیشرفت - ارزیابی تناسب اراضی	۸۰	۱	۸۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ اگر ثابت دی الکتریک یک سوسپانسیون کلوئیدی ۲۰ درصد کاهش یابد، غلظت محلول چقدر باید تغییر کند تا ضخامت لایه دوگانه پخشیده ثابت باقی بماند؟

- (۱) ۲۰ درصد کاهش یابد.  
 (۲) ۲۰ درصد افزایش یابد.  
 (۳)  $\sqrt{20}$  درصد کاهش یابد.  
 (۴)  $\sqrt{20}$  درصد افزایش یابد.

-۲ کدام گزینه درست است؟

(۱) سرعت تجزیه ماده آلی اضافه شده به خاک از جمله به  $Eh$  و نسبت  $C/N$  بستگی دارد که هرچه این دو زیادتر باشد، سرعت تجزیه بیشتر است.

(۲) در  $Eh$  های کم تجزیه ماده آلی در خاک به کندی انجام می‌گیرد، زیرا فعالیت الکترون زیاد است.

(۳) سرعت تجزیه ماده آلی در خاک با دما زیاد می‌شود. لذا درصد ماده آلی خاک در خاک‌های مناطق حاره کم است.

(۴) هنگام تجزیه ماده آلی در خاک فعالیت الکترون افزایش و باعث رانش واکنش تجزیه به سمت تولید  $CO_2$ ، آب و اندرکی گازهای دیگر می‌شود.

-۳ نسبت مولی  $\frac{Si}{O}$  برای واحد ساختمانی بنیادی در سیلیکات زیر چقدر است؟



- (۱) ۰/۲۹  
 (۲) ۰/۳۲  
 (۳) ۰/۳۳  
 (۴) ۰/۳۶

-۴ پارامتر SAR در کدام وضعیت رطوبتی خاک، بالاترین مقدار را دارد؟

- (۱) اشباع  
 (۲) ظرفیت مزرعه  
 (۳) نقطه پزمردگی دائم  
 (۴) رطوبت قابل استفاده

-۵ کدام مورد نشان دهنده نقش مواد آلی در واکنش‌های اکسیداسیون و احیاء در محیط خاک است؟

- (۱) دهنده الکترون و اکسیدکننده  
 (۲) دهنده الکترون و احیاءکننده  
 (۳) گیرنده الکترون و اکسیدکننده

-۶ از واکنش دی اکسیدکربن با کدام ماده برای شناسایی آن استفاده می‌شود؟

- (۱) آب آهک  
 (۲) آب مقطر  
 (۳) پتاسیم پرمونگنات  
 (۴) سدیم هیدروکسید

-۷ در کانی‌های سیلیکاتی نوع پیوند در  $H-O-Al-O-Si-O$  به ترتیب کدام نوع پیوند است؟

- (۱) کوالانس غیر قطبی، یونی، کوالانس یونی  
 (۲) کوالانس قطبی، یونی، کوالانس یونی  
 (۳) کوالانس قطبی، کوالانس یونی، یونی  
 (۴) کوالانس غیر قطبی، کوالانس قطبی، کوالانس یونی

- ۸- در حضور کدام آئیون، سدیمی شدن خاک سریع‌تر اتفاق می‌افتد؟
- (۱) بورات      (۲) سولفات      (۳) کربنات      (۴) کلراید
- ۹- پتاسیم تبادلی یک نمونه ۲۰ گرمی خاک توسط ۲۰۰ میلی‌لیتر عصاره‌گیر استخراج شده است. اگر غلظت پتاسیم در عصاره حاصله ۲ میلی‌مولار باشد، در هر کیلوگرم این خاک چند میلی‌اکی‌والان پتاسیم تبادلی وجود دارد؟
- (۱) ۵      (۲) ۱۰      (۳) ۲۰      (۴) ۴۰
- ۱۰- علت گسترش یا پخش شده (**diffuse**) بودن لایه دوگانه الکتریکی تشکیل شده در اطراف ذرات کلوئیدی دارای بار الکتریکی:
- (۱) انرژی جنبشی یون‌ها یا حرکت گرمائی آن‌ها است.  
 (۲) دفع یون‌های همبار توسط یکدیگر است.  
 (۳) کاهش شدت میدان الکتریکی با فاصله از سطح ذرات است.  
 (۴) یون‌های همبار با بار سطح ذرات کلوئیدی همدیگر را دفع می‌کنند.
- ۱۱- اگر آب آبیاری حاوی کلسیم و بی کربنات زیاد باشد، کدام کود توصیه می‌شود برای تأمین فسفر مورد نیاز گیاه استفاده شود؟
- (۱) سوپرفسفات تریپل      (۲) سوپرفسفات معمولی  
 (۳) فسفریک اسید      (۴) کودهای قلیایی
- ۱۲- ریزوپیوم در تقسیم‌بندی بیولوژیکی جزو کدام گروه از ارگانیسم‌ها محسوب می‌شود؟
- (۱) اوتروف هوایی      (۲) انوتروف بی‌هوایی      (۳) هتروتروف هوایی      (۴) هتروتروف بی‌هوایی
- ۱۳- ترشح صمغ در شاخه‌های مرکبات و تشکیل زخم‌های قهقهه‌ای روی میوه‌های آن‌ها ناشی از کمبود کدام عنصر غذایی است؟
- (۱) آهن      (۲) کلسیم      (۳) مس      (۴) منگنز
- ۱۴- حد بحرانی عناصر غذایی در خاک با افزایش ظرفیت بافری چگونه تغییر می‌کند؟
- (۱) افزایش می‌یابد.  
 (۲) کاهش می‌یابد.  
 (۳) بستگی به سطح دیگر عناصر غذایی دارد.  
 (۴) رابطه‌ای با ظرفیت بافری خاک ندارد.
- ۱۵- خاک دارای ۵٪ درصد رطوبت جرمی اشباع و ۱۶٪ درصد گوگرد عنصری است. اگر گوگرد عنصری موجود در این خاک به طور کامل سولفاتی شود، pH در محلول این خاک چقدر خواهد بود؟ (جرم اتمی گوگرد = ۳۲)
- (۱) ۱      (۲) ۲      (۳) ۳      (۴) ۴
- ۱۶- عنصر فسفر در کدام مورد نقش شناخته‌شده‌ای ندارد؟
- (۱) ذخیره‌سازی و انتقال انرژی  
 (۲) شرکت در فرایند فتوسنتر و تنفسی  
 (۳) کوفاکتور برای تعدادی از آنزیم‌های مهم

- ۱۷- تحت کدام شرایط، نیتریفیکاسیون با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد؟
- ۱) رطوبت ظرفیت زراعی و دمای ۲۵ درجه سلسیوس      ۲) رطوبت ظرفیت زراعی و دمای ۱۰ درجه سلسیوس
- ۳) رطوبت اشباع و دمای ۳۵ درجه سلسیوس      ۴) رطوبت نزدیک اشباع و دمای ۱۰ درجه سلسیوس
- ۱۸- ۰/۵ میلی اکی والان پتابسیم قابل جذب در ۱۲۰ گرم خاک مربوط با ۲۰ درصد رطوبت وزنی برابر چند میلی گرم بر کیلو گرم خاک خشک است؟
- (۱) ۱۹/۵      (۲) ۱۹۵      (۳) ۲۰/۳      (۴) ۲۰۳/۱
- ۱۹- کدام مورد درباره عوامل مؤثر بر نفوذ آب به خاک درست است؟
- ۱) با گذشت زمان، اثر نیروهای ماتریک بر نفوذ آب به خاک افزایش می‌یابد.
- ۲) در زمان‌های ابتدایی نفوذ و در خاک‌های رسی، اثر نیروهای ماتریک بر نفوذ آب به خاک غالب است.
- ۳) شدت نفوذ عمودی تحت شرایط اشباع در زمان‌های زیاد به سمت مؤلفه ضریب جذب میل می‌کند.
- ۴) نیروی ثقل بر نفوذ آب در خاک‌های رسی اثری بیشتری نسبت به خاک‌های شنی دارد.
- ۲۰- در خاکی جرم مخصوص ظاهری و حقیقی به ترتیب برابر ۱/۵ و ۲/۵ گرم بر سانتی متر مکعب است. اگر ۲۵ درصد از حجم منافذ این خاک را با آب پر کنیم، درصد رطوبت وزنی آن چقدر می‌شود؟
- (۱) ۶      (۲) ۶/۶      (۳) ۸/۸      (۴) ۱۰
- ۲۱- اگر نسبت جرم مخصوص ظاهری به جرم مخصوص حقیقی خاکی برابر با ۰/۴ باشد، نسبت پوکی در این خاک چقدر است؟
- (۱) ۱/۶      (۲) ۱/۴      (۳) ۱/۵      (۴) ۱/۶
- ۲۲- درصد وزنی رطوبت یک خاک در پتانسیل‌های ماتریک ۳۳/۰ و ۱۵- بار به ترتیب برابر ۳۰ و ۲۰ است. چگالی ظاهری و حقیقی خاک به ترتیب ۱/۵ و ۲/۶۵ گرم بر سانتی متر مکعب است. اگر بخواهیم رطوبت لایه ۲۰ سانتی متری این خاک را از FC PWP به افزایش دهیم، ارتفاع و حجم آب آبیاری به ترتیب چند سانتی متر و متر مکعب است؟
- (۱) ۲ و ۲۰۰      (۲) ۳ و ۳۰۰      (۳) ۳ و ۲۰۰      (۴) ۳۰ و ۳۰۰
- ۲۳- کدام مورد درباره نفوذ آب در خاک‌های لایه‌ای (خاک لوم روی خاک شنی) درست است؟
- ۱) جبهه رطوبتی در خاک شنی مانند خاک لوم رویی، شکل منظم، صاف و نیمه کره دارد.
- ۲) وقتی جبهه رطوبتی به خاک شنی می‌رسد، به دلیل منافذ درشت این خاک سریع‌تر حرکت می‌کند.
- ۳) وقتی جبهه رطوبتی به خاک شنی می‌رسد، به دلیل منافذ درشت این خاک ابتدا سریع‌تر و سپس کندتر حرکت می‌کند.
- ۴) وقتی جبهه رطوبتی به خاک شنی می‌رسد، به دلیل مکش ماتریک کمتر این خاک، آب با تأخیر وارد آن می‌شود.

- ۲۴- در کدام مورد، عوامل مؤثر بر ویژگی‌های گرمایی و دمای خاک درست است؟
- ۱) با افزایش چگالی ظاهری در رطوبت ثابت خاک، هدایت گرمایی افزایش و گنجایش گرمایی کاهش می‌یابد.
  - ۲) تبخیر آب از سطح خاک یک فرایند گرمگیر بوده و سبب خنک شدن خاک می‌شود.
  - ۳) خاکورزی با کاهش چگالی ظاهری خاک سبب افزایش هدایت گرمایی در خاک می‌شود.
  - ۴) بخ زدن آب یک فرایند گرمگیر بوده و سبب خنک شدن خاک می‌شود.
- ۲۵- کدام مورد درباره عوامل مؤثر بر هدایت هیدرولیکی خاک ( $k_W$ ) درست است؟
- ۱) افزایش دما سبب افزایش سیالیت و در نتیجه افزایش  $k_W$  می‌شود.
  - ۲) افزایش اعوجاج منافذ خاک سبب افزایش  $k_W$  می‌شود.
  - ۳) افزایش شوری و کاهش قلیاییت محلول خاک سبب کاهش  $k_W$  می‌شود.
  - ۴) تأثیر حجم کل منافذ بر  $k_W$  مهم‌تر از تأثیر توزیع اندازه منافذ خاک است.
- ۲۶- رطوبت اولیه خاکی  $10 \text{ g/cm}^3$  است، برای افزایش آن به  $25 \text{ cm}^3/\text{cm}^3$  تا عمق  $30 \text{ سانتی‌متری}$  یک هکتار از این خاک، چند مترمکعب آب لازم است؟ (جرم مخصوص ظاهری خاک  $1.5 \text{ g/cm}^3$  است).
- (۱) ۳۰۰
  - (۲) ۴۵۰
  - (۳) ۳۰۰۰
  - (۴) ۴۵۰۰
- ۲۷- اگر سطح آب زیرزمینی در خاکی در عمق  $80 \text{ سانتی‌متری}$  سطح زمین قرار گیرد و در این خاک آب در نقطه A دارای پتانسیل ماتریک  $-30 \text{ سانتی‌متر}$  باشد، اگر باران ببارد و سطح ایستایی به سطح زمین برسد، پتانسیل فشاری نقطه A چند سانتی‌متر خواهد شد؟
- (۱)  $+110$
  - (۲)  $+80$
  - (۳)  $+50$
  - (۴)  $+30$
- ۲۸- استوانه فلزی به حجم  $100 \text{ سانتی‌متر مکعب}$  را از خاک مرطوبی پر کردیم و در آون گذاشتیم تا کاملاً خشک شود، اگر وزن خاک خشک  $12 \text{ گرم}$  و وزن خاک مرطوب  $144 \text{ گرم}$  شده باشد، درصد رطوبت حجمی خاک چقدر است؟
- (۱) ۲۰
  - (۲) ۴۰
  - (۳) ۲۴
  - (۴) ۴۴
- ۲۹- فرسایش‌پذیرترین ذرات خاک در برابر فرسایش آبی در ابعاد چند میکرون هستند؟
- (۱)  $1/10 \text{ تا } 2$
  - (۲)  $2 \text{ تا } 100$
  - (۳)  $50 \text{ تا } 1000$
  - (۴)  $1 \text{ تا } 100$
- ۳۰- کدام نوع فرسایش آبی، از نظر ذاتی (نیروی فرساینده) با بقیه متفاوت است؟
- (۱) پاشمانی
  - (۲) زمین لغزش
  - (۳) شیاری
  - (۴) کنار رودخانه‌ای
- ۳۱- در کدام شکل شیب، میزان تلفات خاک دامنه بیشترین است؟
- (۱) کمپلکس
  - (۲) مقعر
  - (۳) محدب
  - (۴) یکنواخت
- ۳۲- فرسایش‌پذیری خاک از نظر فرسایش آبی در کدام کلاس بافت خاک کمترین مقدار است؟
- (۱) رسی
  - (۲) رسی
  - (۳) رس سیلیتی
  - (۴) لوم رسی
- ۳۳- کدام فرسایش آبی، بیشترین تأثیر را بر نسبت غنی شدن رسوب می‌گذارد؟
- (۱) بین‌شیاری
  - (۲) خندقی
  - (۳) رودخانه‌ای
  - (۴) شیاری

- ۳۴- خندق‌های V شکل و U شکل به ترتیب در کدام خاک تشکیل می‌شوند؟

۱) لایه زیرین مقاوم‌تر از لایه سطحی - لایه زیرین خیلی مقاوم

۲) لایه زیرین خیلی مقاوم - لایه زیرین و سطحی با مقاومت یکسان

۳) لایه زیرین و سطحی با مقاومت یکسان - لایه زیرین مقاوم‌تر از لایه سطحی

۴) لایه زیرین مقاوم‌تر از لایه سطحی - لایه زیرین و سطحی با مقاومت یکسان

- ۳۵- مؤثرترین اقدام در کنترل فرسایش خندقی کدام است؟

۱) اصلاح حوضه آبخیز به منظور کاهش و تنظیم رواناب

۲) انحراف آبهای سطحی از بالادست خندق

۳) تثبیت خندق با پوشش گیاهی

۴) تثبیت خندق با احداث بند

- ۳۶- اندوده سطحی که در اثر برخورد قطرات باران به وجود می‌آید شامل دو بخش لایه سطحی با آرایش خاص رس‌ها و لایه زیرین که در آن منافذ خاک با ذرات شسته شده مسدود شده‌اند. ضخامت این دو لایه به ترتیب حدود چند میلی‌متر است؟

۱) ۱ و ۳ تا ۵      ۲) ۱ و ۱ تا ۳      ۳) ۰/۱ و ۳ تا ۵      ۴) ۰/۱ و ۱ تا ۳

- ۳۷- در خاک‌های آهکی، معمولاً کدام فرایند پیش‌نیاز فرایند ایلوویشن رس و تشکیل افق آرجیلیک است؟

۱) Salinization      ۲) Gypsification      ۳) Decalcification      ۴) Calsification

- ۳۸- کدام کانی در برابر هوادیدگی مقاوم‌تر است؟

۱) الین      ۲) بیوتیت      ۳) فلدسپار کلسیم      ۴) موسکویت

- ۳۹- در مورد کائولینایت موجود در خاک‌های مناطق خشک و مناطق استوایی (به ترتیب) کدام درست است؟

۱) Loss و Translocation      ۲) Addition و Translocation      ۳) Transformation و Translocation

- ۴۰- طی فرایند فرالیتی شدن امکان تشکیل کدام کانی بیشتر است؟

۱) اوپال      ۲) پالی گورسکیت      ۳) کائولینیت      ۴) مونتموریلونیت

- ۴۱- در مقایسه دو گروه بزرگ Eutrudox و Kandiudults کدام درست است؟

۱) CEC خاک دوم بیشتر از خاک اول است.

۲) خاک اول دارای هوادیدگی بیشتری نسبت‌به خاک دوم است.

۳) در هر دو خاک تنها کانی‌های رسی اکسیدی باقی مانده‌اند.

۴) خاک دوم دارای اشباع بازی بیشتری نسبت‌به خاک اول است.

- ۴۲- شرط nValue کوچکتر از ۷۰٪ جزء شرایط کدام مورد نیست؟

۱) Umbric      ۲) Mollic      ۳) Melanic      ۴) Anthropic

- ۴۳- حداقل عمق سولوم خاک در کدام تحت رددهای خاک اتفاق می‌افتد؟

۱) Xerepts      ۲) Udolls      ۳) Uadults      ۴) Cambids

- ۴۴- مساحت خاک‌های اشغال شده در ایران با کدام رژیم‌های حرارتی (مجموعاً) حداقل است؟

۱) Thermic + Cryic      ۲) Thermic + Hyperthermic

۳) Frigids + Hyperthermic      ۴) Mesic + Cryic

- ۴۵- در کدام مورد خاک خیلی شور و مرطوب انتظار دارید؟
- (۱) بلندی‌های مناطق مرطوب
  - (۲) بلندی‌های مناطق خشک
  - (۳) گودی‌های مناطق خشک
  - (۴) گودی‌های مناطق مرطوب
- ۴۶- افق تحت‌الارضی سیمانی شده که کمتر از  $5^{\circ}$  درصد حجم قطعات هوای خشک آن حتی پس از تیمارهای دراز مدت در اسید کلریدریک ۱ نرمال از هم پاشیده می‌شود اما بیش از  $5^{\circ}$  درصد در  $KoH$  غلیظ و یا تیمارهای متناوب اسیدی و قلیایی از هم می‌پاشد، چه نامیده می‌شود؟
- (۱) پتروکلسیک
  - (۲) پلینتایت
  - (۳) دوری‌بن
  - (۴) فراجی‌بن
- ۴۷- کدام مورد درباره اثر بافت خاک بر مراحل تبخیر آب از سطح خاک درست است؟
- (۱) مرحله اول تبخیر در خاک درشت‌بافت از نظر زمانی طولانی‌تر از خاک ریز‌بافت است.
  - (۲) در شرایط یکسان تقاضای تبخیری و شرایط اولیه خاک، تبخیر تجمعی از خاک شنی بیشتر از خاک لومی است.
  - (۳) هدایت هیدرولیکی غیراشباع و پیوستگی منافذ موئینه سبب افزایش مدت مرحله اول تبخیر در خاک درشت‌بافت می‌شود.
  - (۴) هدایت هیدرولیکی غیراشباع بیشتر در خاک ریز‌بافت نسبت به خاک درشت‌بافت سبب تبخیر آب بیشتر از سطح آن می‌شود.
- ۴۸- جرم مخصوص ظاهری خاکی با  $1/2$  گرم بر سانتی‌متر مکعب برابر با چند تن بر متر مکعب است؟
- (۱)  $0/12$
  - (۲)  $1/2$
  - (۳)  $120$
  - (۴)  $1200$
- ۴۹- در معادله نفوذ گرین و امپت، کدام متغیر وابسته به زمان است؟
- (۱) پتانسیل ماتریک در سطح خاک
  - (۲) هدایت هیدرولیکی ناحیه انتقالی
  - (۳) فاصله از سطح خاک تا جبهه رطوبتی
  - (۴) پتانسیل ماتریک در جبهه رطوبتی
- ۵۰- کدام مورد درست است؟
- (۱) تخلخل پر از هوای بیش از  $10^{\circ}$  درصد حجمی برای تهویه و رشد اکثر گیاهان زراعی مناسب است.
  - (۲) تخلخل تهویه‌ای خاک می‌تواند بیانگر شدت تأمین اکسیژن به سطح ریشه گیاهان باشد.
  - (۳) تمام منافذ پر از هوای تهویه خاک نقش فعال دارند.
  - (۴) جریان توده‌ای مهم‌ترین مکانیسم تهویه و تجدید هوای خاک است.
- ۵۱- کدام مورد درباره منحنی مشخصه رطوبتی خاک درست است؟
- (۱) با کاهش اندازه ذرات خاک، پتانسیل ورود هوای افزایش می‌یابد.
  - (۲) با کاهش اندازه ذرات خاک، مکش ورود هوای افزایش می‌یابد.
  - (۳) با کاهش چگالی ظاهری خاک، مکش ورود هوای افزایش می‌یابد.
  - (۴) با کاهش انحراف معیار هندسی قطر ذرات، شیب منحنی مشخصه رطوبتی خاک،  $C(\theta)$ ، کاهش می‌یابد.
- ۵۲- با کاهش هم‌زمان میانگین هندسی و انحراف معیار هندسی قطر ذرات خاک، مقدار کدام مورد افزایش می‌یابد؟
- (۱) هدایت هیدرولیکی اشباع - تخلخل تهویه‌ای، جرم مخصوص ظاهری
  - (۲) هدایت هیدرولیکی اشباع - رطوبت اشباع، جرم مخصوص ظاهری
  - (۳) هدایت هیدرولیکی غیراشباع - تخلخل تهویه‌ای، جرم مخصوص ظاهری
  - (۴) هدایت هیدرولیکی غیراشباع - رطوبت اشباع، خیز موئینه

- ۵۳- اگر در خاکی مقدار آب ثقلی برابر ۲۵ درصد حجمی باشد و رطوبت خاک در حد ظرفیت مزروعه و نقطه پژمردگی دائم به ترتیب ۲۰ و ۱۰ درصد حجمی شود، درصد رطوبت حجمی خاک در حد اشباع و همچنین رطوبت قابل دسترس گیاه به ترتیب چقدر است؟

- (۱) ۱۰ ، ۴۵
- (۲) ۱۰ ، ۳۵
- (۳) ۲۰ ، ۳۵
- (۴) ۲۰ ، ۴۵

- ۵۴- کدام مورد درباره نفوذ آب به خاک درست است؟

- (۱) با گذشت زمان سرعت نفوذ متوسط بیشتر می‌شود.
- (۲) با گذشت زمان سرعت نفوذ لحظه‌ای بیشتر می‌شود.
- (۳) با گذشت زمان سرعت نفوذ متوسط و سرعت نفوذ لحظه‌ای کاهش می‌یابد، روند کاهشی سرعت نفوذ لحظه‌ای بیشتر از متوسط است.
- (۴) با گذشت زمان سرعت نفوذ متوسط و سرعت نفوذ لحظه‌ای کاهش می‌یابد، روند کاهشی سرعت نفوذ متوسط بیشتر از لحظه‌ای است.

- ۵۵- جریان‌های واگرا و همگرا بر روی دائمه به ترتیب در تشکیل کدام نوع فرسایش آبی نقش دارند؟

- (۱) آبکندی - ورقه‌ای
- (۲) بین شیاری - شیاری
- (۳) شیاری - بین شیاری
- (۴) ورقه‌ای - آبکندی

- ۵۶- اگر شاخص  $I-G/Tc$  یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده فرسایش شیاری و  $G$  بار رسوب باشد، مقدار  $Tc$  کدام است؟

- (۱) برش هیدرولیکی بحرانی
- (۲) ظرفیت حمل رسوب
- (۳) فرسایش پذیری بین شیاری
- (۴) میزان رسوب حاصله از فرسایش بین شیاری


- ۵۷- کدام مورد در ناپایداری توده‌های لغزشی، نقش کمتری دارد؟

- (۱) بارندگی‌های شدید
- (۲) جاده‌سازی و بارگذاری
- (۳) لایه نفوذناپذیر عمقی
- (۴) نوع کانی‌های رسی در سطح لغزش

- ۵۸- اگر قطر قطره باران از ۲ میلی‌متر به ۴ میلی‌متر افزایش یابد، انرژی جنبشی چند برابر می‌شود؟ (با فرض این‌که سرعت سقوط نهایی آن از ۴ به ۶ متر بر ثانیه افزایش می‌یابد)


- (۱) ۲/۲۵
- (۲) ۴/۵
- (۳) ۱۸
- (۴) ۳۶

- ۵۹- در شکل زیر شعاع هیدرولیکی چند سانتی‌متر است؟




- (۱) ۱/۳
- (۲) ۱/۷
- (۳) ۲/۶
- (۴) ۵/۲

-۶۰- اگر نمودار شدت رواناب در یک خاک معین در دو حالت مختلف به صورت نمودارهای A و B باشد، گزینه درست کدام است؟



- (۱) در حالت A، خاک مرطوب‌تر و شدت بارندگی کمتر است.
- (۲) در حالت A، خاک خشک‌تر و شدت بارندگی بیشتر است.
- (۳) در حالت B، خاک مرطوب‌تر و شدت بارندگی کمتر است.
- (۴) در حالت B، خاک مرطوب‌تر و شدت بارندگی بیشتر است.

-۶۱- اگر هیدروگراف یک سیل به صورت شکل زیر باشد، مقایسه غلظت رسوب در زمان A و B در کدام مورد درست است؟



-۶۲- اگر میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف یک حوضه به شرح جدول زیر باشد، متوسط سالانه فرسایش خاک حوضه چند تن در هکتار است؟ (گرم بر سانتی‌متر مکعب  $\rho_b = 1/4$ )

کاربری	مساحت (هکتار)	میزان فرسایش (میلی‌متر / سال)	زمان	جنگل	بیرون‌زدگی سنگی
میزان فرسایش (میلی‌متر / سال)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۶۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰
میزان فرسایش (میلی‌متر / سال)	۰	۰/۱	۰/۵	۱	۰

- (۱) ۲/۳۵
- (۲) ۵/۲۵
- (۳) ۷/۱۴
- (۴) ۸/۱۵

-۶۳- رسوب کربنات‌ها در طی فرایند تشکیل افق کلسیک عمدتاً توسط کدام مورد کنترل می‌شود؟

- (۱) افزایش  $\text{Ca}^{2+}$
- (۲) افزایش  $\text{HCO}_3^-$
- (۳) افزایش  $\text{CO}_2$
- (۴) کاهش فشار  $\text{CO}_2$

-۶۴- نسبت  $\frac{\text{Al}}{\text{Si}}$  در کدام کانی بزرگتر است؟

- (۱) آلوفان
- (۲) اسمکتایت
- (۳) فری‌هیدریت
- (۴) میکا

-۶۵- کدام مورد، مربوط به افق‌های اصلی در سیستم ردبه‌بندی جهانی است؟

- (۱) H,V,E,I
- (۲) H,A,B,I
- (۳) O,V,M,W
- (۴) O,A,L,M

-۶۶- مفهوم Bi در تشریح خاک به روشن WRB معادل کدام گزینه در USDA است؟

- (۱) اسلیکن ساید
- (۲) افق B دارای رس بالا
- (۳) مواد غیرآلی
- (۴) مواد آلی نیمه تجزیه شده

-۶۷- وجه مشترک گروههای مرجع خاک Alisols و Acrisols کدام است؟

- (۱) بافت شنی خاک سطحی
- (۲) درصد اشباع بازی پایین
- (۳) شرایط فیزیکی نامناسب
- (۴) ظرفیت تبادل کاتیونی بالا

- ۶۸- تغییرات اقلیمی و به تبع آن تغییرات خصوصیات خاک (نظیر pH و میزان آهک) در کدام مورد حداکثر است؟

Cambisols (۴)

Calcisols (۳)

Ferralsols (۲)

Podzols (۱)

- ۶۹- کدام مجموعه کامل گروههای مرجع خاک (براساس WRB) ارتباط چندانی با نوع اقلیم ندارند؟

Alisols, Gleysols, Chernozems, Kastanozems (۱)

Calcisols, Plinthosols, Ferralsols, Gypsisols (۲)

Cryosols, Technosols, Podzols, Solonchaks (۳)

Technosols, Fluvisols, Regosols, Gleysols (۴)

- ۷۰- در شرایط مشابه از نظر مواد مادری میزان کانی‌های مقاوم به هوادیدگی در کدام گروه مرجع خاک حداکثر است؟

Alisols (۴)

Ferralsols (۳)

Kastanozems (۲)

Vertisols (۱)

- ۷۱- مواد آلی نسبتاً بالا، CEC بالا و ساختمان خوب از مشخصات خاک‌های سطحی کدام تحت رده خاک در سیستم

آمریکایی است؟

Ustults (۴)

Udolls (۳)

Udox (۲)

Calcids (۱)

- ۷۲- هدف کلی از طبقه‌بندی اراضی برای آبیاری چیست؟

(۱) تعیین پتانسیل‌ها، محدودیت‌ها، مشکلات و ظرفیت تولید اراضی

(۲) تعیین میزان هزینه و درآمد کشاورزان و حل مشکلات اقتصادی

(۳) تعیین میزان آب آبیاری مورد نیاز و تأمین منابع آب لازم برای اراضی

(۴) طراحی پروژه‌های اجرایی و ارزیابی کمی آن‌ها برای اراضی

- ۷۳- در کدام نوع از واحد اراضی، آب و هوای منطقه نقش مهمی ایفا می‌کند؟

(۱) پهنه‌های زراعی - اکولوژیکی

(۲) واحدهای مدیریتی

(۳) واحدهای نقشه خاک

(۴) واحدهای تفکیک شده در سیستم‌های اراضی

- ۷۴- کدام سیستم ارزیابی اراضی «حافظت خاک» در اولویت اول قرار داده شده است؟

USDA (۴)

USBR (۳)

FAO (۲)

روش ایرانی (۱)

- ۷۵- در کدام سیستم ارزیابی از داده‌های رده‌بندی خاک استفاده شده است؟

USDA (۴)

USBR (۳)

FCC (۲)

FAO (۱)

- ۷۶- در کدام دوره رشد، میزان بارندگی در برخی ماه‌ها از نصف تبخیر و تعرق بیشتر ولی در همه ماه‌ها از کل تبخیر و

تعرق کمتر است؟

(۱) نرمال

(۲) خشک

(۳) رشد بینابین

(۴) مرطوب

- ۷۷- کدام تحت کلاس تناسب اراضی نشان‌دهنده محدودیت در حاصل خیزی خاک است؟

S3w (۴)

S3f (۳)

S3n (۲)

S3s (۱)

- ۷۸- در ارزیابی کیفی تناسب اراضی، کدام مورد نشان‌دهنده روش پارامتریک ریشه دوم است؟

$$I = A \times \sqrt{\frac{B}{100} \times \frac{C}{100} \times \dots} \quad (۲)$$

$$I = A \times \frac{B}{100} \times \frac{C}{100} \times \dots \quad (۱)$$

$$I = R \min \times \sqrt{\frac{A}{100} \times \frac{B}{100} \times \frac{C}{100} \times \dots} \quad (۴)$$

$$I = R \min \times \frac{A}{100} \times \frac{B}{100} \times \frac{C}{100} \dots \quad (۳)$$

-۷۹- براساس ملاحظات رشد گیاه مرز بین کدامیک از لایه‌های زیر به عنوان لایه محدود کننده محسوب می‌شود؟

	عمیق	درصد آهک	درصد گچ	درصد سنگریزه
A	۰-۲۰	۲۰	۱۰	۱۰
B	۲۰-۵۰	۳۵	۱۵	۷۵
C <sub>۱</sub>	۵۰-۹۰	۶۰	۱۵	۸۰
C <sub>۲</sub>	۹۰-۱۱۰	۷۵	۴۰	۴۰
R	+۱۱۰			

B و C<sub>۱</sub> (۱)

B و A (۲)

C<sub>۲</sub> و C<sub>۱</sub> (۳)

R و C<sub>۲</sub> (۴)

-۸۰- کدام گیاه مسیر فتوستنتزی C<sub>۴</sub> را طی می‌کند و جزو گیاهان گروه III است؟

(۴) نیشکر

(۳) لوپیا

(۲) سویا

(۱) پنبه

