



مشاوره تحصیلی هپیوا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ثبت نام ، انتخاب رشته و برنامه ریزی

آزمون دکتری وزارت علوم و بهداشت

برای ورود به صفحه مشاوره آزمون دکتری کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی آزمون دکتری

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹

تماس از تلفن ثابت

کد کنترل

423

A



423A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) – سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی – (کد ۲۷۲۰)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – فیزیولوژی تولید مثل – جنین‌شناسی – مامایی – اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی	۹۰	۱	۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

-۱ سرج FSH که مسئول شروع موج جدید فولیکولی است و در نهایت منجر به تخمک‌گذاری می‌شود، در چه زمانی از چرخه فحلی مادیان صورت می‌پذیرد؟

(۱) اوایل استروس چرخه‌ی فعلی
 (۲) اوایل دیاستروس چرخه‌ی قبلی

(۳) اواسط تا اواخر استروس چرخه‌ی فعلی
 (۴) اواسط تا اواخر دیاستروس چرخه‌ی قبلی

فیدبک استروژن و پروژسترون بر مراکز ترشح تونیک و سرج GnRH در هیپوتالاموس چگونه است؟

(۱) استروژن: فیدبک مثبت بر مرکز تونیک و سرج - پروژسترون: فیدبک مثبت بر مرکز تونیک و فیدبک منفی بر مرکز سرج

(۲) استروژن: فیدبک منفی بر مرکز تونیک و فیدبک مثبت بر مرکز سرج - پروژسترون: فیدبک منفی بر مرکز تونیک و سرج

(۳) استروژن: فیدبک مثبت بر مرکز تونیک و فیدبک منفی بر مرکز سرج - پروژسترون: فیدبک مثبت بر مرکز تونیک و سرج

(۴) استروژن: فیدبک منفی بر مرکز تونیک و سرج - پروژسترون: فیدبک منفی بر مرکز تونیک و فیدبک مثبت بر مرکز سرج

-۲ لپتین - IGF1 - کورتیزول هر کدام به ترتیب چه تأثیری بر ترشح LH دارد؟

(۱) کاهش - افزایش - کاهش
 (۲) افزایش - افزایش - کاهش

(۳) افزایش - کاهش - افزایش
 (۴) کاهش - افزایش - کاهش

-۳ در کدامیک از حیوانات، بقای جنین در تمام طول آبستنی وابسته به پروژسترون مترشحه از جسم زرد است؟

(۱) بز - سگ
 (۲) بز - گوسفند
 (۳) گاو - گوسفند
 (۴) گاو - سگ

-۴ از داروی Clenbuterol در گاو به چه منظوری استفاده می‌شود؟

(۱) ایجاد سقط

(۲) همزمانی فحلی

(۳) القاء زایمان

-۵ کدام جمله در مورد اپیوئیدها نادرست است؟

(۱) تزریق اپیوئیدها سبب ترشح برولاکتین می‌شود.

(۲) اثر اپیوئیدها تحت تأثیر محیط استروئیدی بدن است.

(۳) تزریق اپیوئیدها سبب ترشح FSH و LH می‌شود.

(۴) تزریق نالوکسون سبب افزایش فرکانس ترشح اپیزودیک گناندوتروپین‌ها

-۶ طی پرسه تخمک‌گذاری، آنزیم‌های پروتئولیتیک (کلازناز و پلاسمین) تحت تأثیر افزایش موضعی کدام هورمون‌ها آزاد می‌شوند؟

(۱) PGE2 و پروژسترون

(۲) PGF2α و استروژن

(۳) PGE2 و استروژن

- ۸- غلیان قبل از تخمک‌گذاری استرادیول در حیوانات باعث تحریک آزادسازی کدام یک می‌شود؟
- ۱) هورمون آزاد کننده FSH
۲) LH
۳) FSH
۴) ملاتونین
- ۹- کدام عبارت در مورد گاو صحیح است؟
- ۱) مقادیر بالای پروژسترون، تعداد گیرنده‌های اکسی‌توسیک رحم را افزایش می‌دهد.
۲) مقادیر بالای استروژن، تعداد گیرنده‌های اکسی‌توسیک را افزایش نمی‌دهد.
۳) مقادیر بالای پروژسترون، تعداد گیرنده‌های اکسی‌توسیک رحم را کاهش می‌دهد.
۴) در زمان تحلیل جسم زرد، غلظت اکسی‌توسین تغییر نمی‌کند.
- ۱۰- سیستم **Insulin Like Growth Factor (IGF)** چگونه بر روی سیستم تولیدمثل عمل می‌کند؟
- ۱) فقط باعث رشد و بلوغ فولیکولی و خروج اسیت از فولیکول غالب می‌شود.
۲) فقط باعث رشد و بلوغ فولیکول و حساس شدن گرانولوزا نسبت به FSH می‌شود.
۳) فقط باعث خروج اسیت از فولیکول غالب و حساس شدن سلول‌های گرانولوزا نسبت به LH می‌شود.
۴) باعث رشد و بلوغ فولیکول غالب توسط حساس شدن سلول‌های گرانولوزا نسبت به اثرات FSH و LH می‌شود.
- ۱۱- شروع برنامه نور مصنوعی جهت به جلو انداختن فصل تولیدمثلی مادیان در چه زمانی توصیه شده است؟
- ۱) اواسط آذرماه
۲) اواسط آبان‌ماه
۳) اواسط دی‌ماه
۴) اواسط مهرماه
- ۱۲- ترشح LH و FSH در حیوانات ماده اهلی به‌وسیله کنترل می‌شود.
- ۱) یک سیستم اپیزودیک / تونیک
۲) دو سیستم -۱- اپیزودیک -۲- تونیک
۳) سیستم Surge
۴) ۲ سیستم فعال مجزا شامل: ۱- سیستم اپیزودیک / تونیک ۲- سیستم Surge
- ۱۳- در اسپرماتوزن، مقادیر داخل بیضه‌ای چه هورمونی (هایی) بیشتر از مقادیر خونی آن می‌باشد؟
- ۱) استروژن
۲) تستوسترون
۳) پروژسترون
۴) استروژن و پروژسترون
- ۱۴- چه هورمون (یا هورمون‌هایی) دارای اثرات فیدبک منفی بر روی هیپوتالاموس و ترشح GnRH در دام نر می‌باشد؟
- ۱) فقط تستوسترون
۲) تستوسترون، دی‌هیدروتستوسترون و استروژن
۳) تستوسترون، پروژسترون و استروژن
۴) دی‌هیدروتستوسترون، پروژسترون و استروژن
- ۱۵- جریان خون برگشتی از بیضه به بدن است.
- ۱) بسیار کند است و فشار خون سطح بیضه بسیار پایین است.
۲) همانند فشارخون بدن است و نیز فشار خون سطح بیضه همانند فشار خون بدن است.
۳) بالاست و فشارخون سطح بیضه نیز بالا می‌باشد.
۴) بسته به نوع دام و فصل تولید مثلی متفاوت می‌باشد.
- ۱۶- کدام عبارت ذیل صحیح می‌باشد؟
- ۱) انقباض کم Tunica Dartus در دام نر اخته شده به دلیل عدم آزاد شدن LH است.
۲) توانایی انقباض Tunica Dartus در دام نر اخته شده به دلیل نبود سلول‌های Leydig کمتر است
۳) توانایی انقباض Tunica Dartus در دام نر اخته شده طبیعی است.
۴) در دام‌های نر اخته شده، توانایی انقباض Tunica Dartus در پاسخ به هوای سرد به دلیل عدم وجود تستوسترون بسیار کم است.

- ۱۷ برای فعالیت طبیعی سلول‌های سرتولی بیضه کدام‌یک الزامی است؟
- (۱) LH و تستوسترون
 - (۲) FSH و تستوسترون
 - (۳) GnRH و استروژن
 - (۴) FSH و استروژن
- ۱۸ کدام عبارت در رابطه با سنتز داخل رحمی پروستاگلاندین بهوسیله افزایش کورتیزول در روش غیروابسته به استروژن در زایمان گوسفند صحیح می‌باشد؟
- (۱) استروژن منجر به تولید C19 Steroids می‌شود.
 - (۲) افزایش بیان پروستاگلاندین سنتتاز (PGHS-II) در سلول‌های تروفوبلاست جنینی جفت می‌باشد.
 - (۳) یکی از نتایج کاهش پروژسترون ، تحریک پروستاگلاندین سنتتاز (PGHS-II) ، در آندومتریوم مادری است
 - (۴) یکی از نتایج کاهش پروژسترون ، تحریک پروستاگلاندین سنتتاز (PGHS-II) ، در آندومتریوم مادری است و در نتیجه، تولید PGE است.
- ۱۹ Acrosomal phase همراه با اسپرم است.
- (۱) تشکیل وزیکول اکروزومیک
 - (۲) تشکیل ناحیه میانی (Middle piece)
 - (۳) گستردگی شدن وزیکول اکروزومیک بر روی هسته
 - (۴) طویل شدن هسته و سیتوپلاسم اینهیبین در جنس نر توسط کدام‌یک ترشح می‌شود؟
- ۲۰
- (۱) سلول‌های سرتولی
 - (۲) سلول‌های لیدیگ
 - (۳) Basement membrane
 - (۴) لوله‌های سمینیفر
- ۲۱ کدام روش برای ایجاد فحلی در فاز آنسترووس گربه کارآیی دارد؟
- (۱) تجویز ۳ دوز از گنادولین و سپس تجویز hCG
 - (۲) تجویز دسلورلین و پس از شاخی شدن درصد بالایی از سلول‌های اپیتلیال وازن با تجویز hCG
 - (۳) تجویز روزانه استروژن و پروژسترون و پس از شاخی شدن درصد بالایی از سلول‌های اپیتلیال وازن با تجویز hCG
 - (۴) تجویز روزانه پروژسترون و پس از شاخی شدن درصد بالایی از سلول‌های اپیتلیال وازن با تجویز hCG
- ۲۲ کدام دارو جهت تحریک تولید شیر در سگ و گربه کارآیی دارد؟
- (۱) متراگولین
 - (۲) کابرگولین
 - (۳) متوكلوپرامید
 - (۴) Delmadinone
- ۲۳ کدام دارو به عنوان آنتاگونیست GnRH در سگ و گربه کارآیی دارد؟
- (۱) متراگولین
 - (۲) Acycline
 - (۳) Deslorelin
 - (۴) ملاتونین
- ۲۴ سیگنال آنتی لوთولیتیک ارسالی از رویان گاو نام دارد که بیشترین میزان ترشح آن در بازه زمانی روزهای آبستنی است.
- (۱) ۱۶ oIFN-tau
 - (۲) ۱۵ bIFN-tau
 - (۳) ۱۶ bIFN-tau
 - (۴) ۱۵ oIFN-tau
- ۲۵ مهم‌ترین منابع استروژن در مادیان آبستن است که مهم‌ترین منبع ترشح آن‌ها می‌باشد.
- (۱) اکوئیلین و اکوئیلینین - جفت
 - (۲) استروژن و اکوئیلین - گنادهای فتوس
 - (۳) استروژن و اکوئیلین - گنادهای فتوس
- ۲۶ هورمون لوთوتروپیک اصلی در گوسفند کدام است؟
- (۱) پرولاکتین
 - (۲) GnRH
 - (۳) LH
 - (۴) FSH

- ۲۷- کدام جمله زیر در مورد گربه صحیح است؟

- ۱) پروژسترون بافت جفت بعنوان منبع اصلی این هورون در کل طول آبستنی می‌باشد.
- ۲) علاوه بر پروژسترون، استروژن نیز برای بقای آبستنی مورد نیاز است.
- ۳) حداقل غلظت پروژسترون جهت بقای آبستنی در گربه ۱-۲ نانوگرم در هر میلی‌لیتر می‌باشد.
- ۴) پروژسترون بافت تخدمان در اوائل و سپس جفت در اواسط آبستنی به بعد به عنوان عوامل اصلی بقای آبستنی هستند.

- ۲۸- شناخت مادری آبستنی (MRP) در گاو معمولاً چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| (۱) ۱۲-۱۳ روزگی | (۲) ۲۰ روزگی | (۳) ۱۲-۱۳ روزگی |
|-----------------|--------------|-----------------|

- ۲۹- سن بلوغ جنسی گاو در نژادهای بوس تاروس بوس ایندیکسوس است.

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| (۱) همگن تراز | (۲) زودتر از | (۳) دیرتر از |
|---------------|--------------|--------------|

- ۳۰- کدام جمله درست است؟

- ۱) فاصله دو تخمک‌گذاری در گاوها دو موجی طولانی تر از گاوها سه موجی است.
- ۲) فاصله دو تخمک‌گذاری در گاوها دو موجی و سه موجی بستگی به تولید شیر دارد.
- ۳) فاصله دو تخمک‌گذاری در گاوها دو موجی و سه موجی تفاوتی ندارند.
- ۴) فاصله دو تخمک‌گذاری در گاوها دو موجی کوتاه تر از گاوها سه موجی است.

- ۳۱- کدام جمله نادرست است؟

- ۱) داینوپروست نیمه عمر طولانی تر از کلوپروستنول دارد.
- ۲) داینوپروست یک پروستاگلاندین طبیعی است
- ۳) کلوپروستنول یک پروستاگلاندین سنتیک است.
- ۴) داینوپروست نیمه عمر کوتاه تر از کلوپروستنول دارد.

- ۳۲- بهترین باروری در برنامه اووسینک زمانی است که تلقیح در ساعت بعد از GnRH انجام شود.

- | | | | |
|--------|--------|-------|--------|
| (۱) ۲۴ | (۲) ۱۶ | (۳) ۲ | (۴) ۳۲ |
|--------|--------|-------|--------|

- ۳۳- مهم‌ترین دلایل افزایش فرکانس‌های LH در دینامیسم فولیکولی عبارت است از:

- ۱) کاهش ترشح FSH
- ۲) افزایش ترشح استروژن
- ۳) کاهش ترشح پروژسترون

- ۳۴- یکی از دلایل طولانی شدن آنسترووس در گاوها گوشته عبارت است از:

- ۱) سخت‌زایی
- ۲) کمبودهای تغذیه‌ای
- ۳) تولید شیر

۴) مکیده شدن پستان توسط گوساله

- ۳۵- بهترین علت افزایش سطح آنژیم ۱۷ آلفا-هیدروکسیلаз جفت چیست؟

- ۱) ترشح کورتیکوستروئید از فتوس
- ۲) ترشح استروژن از جفت
- ۳) ترشح کورتیکوستروئید از مادر

- ۳۶- مرحله migration در کدام یک از جنین‌های گونه‌های زیر رخ می‌دهد؟

- | | | | |
|--------|---------|------------|------------|
| (۱) بز | (۲) گاو | (۳) گوسفند | (۴) مادیان |
|--------|---------|------------|------------|

- ۳۷- استفاده از دز کم هورمون eCG در گاو در برنامه هیزمانی چند هورمونی باعث چه می‌شود؟

- | |
|-------------------------|
| (۱) افزایش سایز فولیکول |
|-------------------------|

- | |
|--------------------|
| (۲) سوپر اوولاسیون |
|--------------------|

۴) می‌توان به جای GnRH از eCG استفاده کرد.

- ۳۸ زمانی که مقادیر LH در دام نر در بالاترین سطح خود به شکل مستمر در دام نر قرار می‌گیرد صورت می‌گیرد.
- ۱) ابتدا افزایش پروژسترون و سپس تستوسترون
 - ۲) کاهش ترشح تستوسترون
 - ۳) افزایش ترشح تستوسترون
 - ۴) ابتدا افزایش استروژن و سپس تستوسترون
- ۳۹ Capacitation در گونه‌هایی که اسپرم در زمان جفت‌گیری در قسمت عقبی گردن رحم تخلیه می‌شود
- ۱) در رحم شروع و در انتهای شاخهای رحم کامل می‌شود.
 - ۲) در گردن رحم شروع و در انتهای شاخهای رحم کامل می‌شود.
 - ۳) در گردن رحم شروع و در Isthmus اویدوکت کامل می‌شود.
 - ۴) در رحم شروع و در Isthmus اویدوکت کامل می‌شود.
- ۴۰ کدام عبارت در مورد انتقال اسپرماتوزوا در اپیدیدیم درست است؟
- ۱) تحت کنترل سیستم آندوکرینی است که شامل: FSH, LH و اکسیتوسین است.
 - ۲) تحت کنترل سیستم عصبی - آندوکرینی است که شامل: اکسیتوسین، FSH و آنژتانسیون ۲ است.
 - ۳) تحت کنترل سیستم عصبی است که شامل: استیل کولین و نوراپینفرین است.
 - ۴) تحت کنترل سیستم عصبی - آندوکرینی است که شامل اکسیتوسین، پروستاگلاندین‌ها و آنژتانسیون ۲ است.
- ۴۱ مشخص کردن آنتی‌ژن‌های سطحی Spermatogonial Stem Cells (SSCs) برای نیاز می‌باشد.
- | | |
|---|--------------------------|
| Embryonic germ Cells (۲) | Embryonic Stem Cells (۱) |
| Embryonic Carcinoma (EC) Stem Cells (۴) | Immunoselection (۳) |
- ۴۲ فاز گلزی در کدام مرحله سلولی در اسپرماتوزنز اتفاق می‌افتد؟
- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Spermatid differentiation (۲) | Spermatogonia B (۱) |
| Spermatocyte اولیه (۴) | Spermatocyte ثانویه (۳) |
- ۴۳ در طول زمان فحلی گاو، سلول‌های گردن رحم تولید موکوس با چسبندگی می‌کند.
- ۱) کم Sialomucin
 - ۲) زیاد Sialomucin
 - ۳) کم Sulfomucin
 - ۴) در قسمت قاعده گردن رحم و چسبندگی کم
- ۴۴ در دام‌های نر Pampiniform Plexus
- ۱) اسپرماتوزنز را تخریب می‌کند.
 - ۲) محل تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون است.
 - ۳) به صورت یک مبدل حرارتی عمل می‌کند.
 - ۴) فقط Differentiation را در اسپرماتوزنز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
- ۴۵ در تلقيق مصنوعی گوسفند با اسپرم تازه به ترتیب بیشترین درصد بره زایی و بیشترین تعداد اسپرم مربوط به کدام روش‌ها است؟
- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Intracervical – Transcervical (۲) | Intravaginal – Laparoscopic (۱) |
| Transcervical – Intravaginal (۴) | Laparoscopic – Intracervical (۳) |
- ۴۶ زمان ایده‌آل تلقيق مصنوعی سگ با اسپرم منجمد مقارن با کدامیک از مقادیر پروژسترون سرم است؟
- ۱) ۳-۲ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۲) کمتر از ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۳) ۲۵-۱۰ نانوگرم در میلی‌لیتر
 - ۴) ۸-۴ نانوگرم در میلی‌لیتر

- ۴۷- کدام روش جداسازی اسپرم X و Y امروزه به شکل تجاری استفاده می‌شود؟
- ۱) فلوسیتومتری
 - ۲) بر پایه H-Y آنتیژن
 - ۳) بر پایه سایز اسپرم
 - ۴) بر پایه پروتئین‌های Sex-Specific
- ۴۸- بر اثر کدام‌یک از موارد زیر ابتدا سرعت حرکت اسپرم‌ها بیشتر می‌شود و سپس اسپرم‌ها حرکت خود را از دست می‌دهند؟
- ۱) افزایش فشار اسمزی
 - ۲) Dilution Effect
 - ۳) تغییرات pH
 - ۴) اتمام منابع انرژی
- ۴۹- کدام‌یک از موارد غیرطبیعی در اسپرم موجب ناباروری گاو نمی‌شود و احتمالاً به عنوان یک نقص طبقه‌بندی نمی‌شود؟
- ۱) Pyriform heads
 - ۲) قطره پروتوپلاسمیک دیستال
 - ۳) قطره پروتوپلاسمیک پروکسیمال
 - ۴) Dag defect
- ۵۰- اسپرمیوژن (Spermiogenesis) به فاز گفته می‌شود؟
- ۱) Meiosis
 - ۲) تمایز (Differentiation)
 - ۳) ترازید (Proliferation)
 - ۴) اشاره به اسپرماتوزنیزیس است
- ۵۱- در مرحله Cap phase اسپرماتوزنیزیس
- ۱) گلزاری به طرف ناحیه اکروز مهاجرت می‌کند.
 - ۲) گلزاری به طرف ناحیه دم سلول مهاجرت می‌کند.
 - ۳) گلزاری به طرف ناحیه دم تشکیل می‌شوند.
 - ۴) هسته اسپرماتید شروع به بزرگ شده می‌کند.
- ۵۲- اکروزوم حاوی آنزیمهای است.
- ۱) لیپولیتیک
 - ۲) پروتئولیتیک
 - ۳) هیدرولیتیک
 - ۴) کراتیناز
- ۵۳- سیکل اپیتلیوم سمینیفروس (تبديل اسپرماتوغونیا به اسپرماتوزوا) در گاو به ترتیب طی چند مرحله و چند روز صورت می‌پذیرد؟
- ۱) ۱ و ۶۶
 - ۲) ۲ و ۶۱
 - ۳) ۳ و ۶۶
 - ۴) ۴ و ۶۸
- ۵۴- کدام‌یک از محیط‌های زیر بیشتر جهت کشت تخمک نابالغ گاو استفاده می‌شود؟
- ۱) Menezo B2
 - ۲) TCM_۱۹۹
 - ۳) TALP
 - ۴) Hams F22
- ۵۵- منشاء جنینی اپیدیدیم کدام است؟
- ۱) Mesonephric duct
 - ۲) Mesonephric tubules
 - ۳) Mesonephric duct
 - ۴) Paramesonephric duct
- ۵۶- در کدام حیوان بیشترین میزان اتصال بین مجاري پارامزوفریک در طی دوره جنینی رخ می‌دهد؟
- ۱) سگ
 - ۲) گاو
 - ۳) اسب
 - ۴) گوسفند
- ۵۷- Syngamy یعنی
- ۱) Fetal
 - ۲) اوپلین مرحله باروری اووسایت
 - ۳) اتصال اسپرم به ZP3 اووسایت
 - ۴) آخرین مرحله باروری که پرونکلتوس نر به پرونکلتوس ماده متصل می‌شود.
- ۵۸- زمان جمع آوری رویان‌های گاو در برنامه انتقال جنین در چه بازه زمانی دوره جنینی است؟
- ۱) در بازه ۸-۱۰ در مرحله مورولا و بلاستوسیست
 - ۲) در بازه ۶-۱۰ در مرحله مورولا و بلاستوسیست
 - ۳) روز ۵-۹ در مرحله بلاستوسیست

-۵۹- در جمع آوری رویان مادیان کدام عبارت صحیح است؟

۱) نرخ جمع آوری رویان بسته به اسپرم سیلیمی ثابت است.

۲) نرخ جمع آوری رویان در نژادهای مختلف اسب ثابت است.

۳) نرخ جمع آوری رویان با سن رویان در ارتباط نیست و در روز ۹ دوره جنینی این میزان نسبت به روز ۶ کمتر است.

۴) نرخ جمع آوری رویان با سن رویان در ارتباط است و در روز ۸ دوره جنینی این میزان نسبت به روز ۶ بیشتر است.

-۶۰- نرخ جمع آوری رویان در میش و بز چند درصد است؟

۴۰ (۴)

۶۰-۵۰ (۳)

۱۰۰-۹۰ (۲)

۷۰

-۶۱- در طی بلوغ آزمایشگاهی تخمک (IVM)، اکثر تخمک‌ها

۱) تقسیم میتوز را از سر می‌گیرند.

۲) در انتهای زمان کشت در مرحله متافاز ۳ هستند.

۳) تقسیم میوز را از سر می‌گیرند و در انتهای زمان کشت به مرحله پروفاز ۱ می‌رسند.

۴) تقسیم میوز را از سر می‌گیرند و در انتهای زمان کشت به مرحله متافاز ۲ می‌رسند.

-۶۲- فرآیند اسپرماتوزنزن طی چند مرحله و به ترتیب در چه مراحلی انجام می‌شود؟

۲ مرحله: تزايد - میوز - تمایز

۴ مرحله: میوز - تزايد - تمایز

-۶۳- بعد از ورود هسته اسپرم به داخل سیتوپلاسم اووسایت، تبدیل به می‌شود.

(۱) Male pronucleus

(۲) Female pronucleus

۳) بعد از اینکه وارد قسمت ویتلین اووسایت شد تبدیل به Male pronucleus می‌شود.

۴) بعد از اینکه وارد قسمت ویتلین اووسایت شد تبدیل به Female pronucleus می‌شود.

-۶۴- در انزال (Ejaculation) سگ، Pre-sperm fraction منشاء دارد.

(۱) وزیکول سمینال (۲) پروستات (۳) غده کویر (۴) اسپرمیک

-۶۵- کدام عبارت صحیح است؟

۱) اسپرماتوزنزنیس پستاندارانی نظیر فیل تحت تأثیر درجه حرارت محیط قرار دارد.

۲) اسپرماتوزنزنیس گاو تحت تأثیر حرارت محیط نمی‌باشد.

۳) اسپرماتوزنزنیس در گاو در زمان خنک بودن بیضه صورت می‌پذیرد.

۴) اسپرماتوزنزنیس پستاندارانی نظیر خرگوش، در فصل تولید مثلی، تحت تأثیر درجه حرارت محیط قرار ندارد.

-۶۶- اسب با فرمول ژنتیکی XX64 حاوی بیضه‌ها و دارای رفتار نرینگی اما دستگاه تناسلی خارجی شبیه مادیان را چه می‌گویند؟

۲) هرmafrodیت کاذب نر

۴) هرmafrodیت واقعی ماده

(۱) هرmafrodیت کاذب نر

(۳) هرmafrodیت واقعی نر

-۶۷- بیشترین حجم منی سگ در بخش انزال وجود دارد و عمل برگشتن سگ نر و از locking

خروج بخش غنی از اسپرم روی می‌دهد.

۴) اول - قبل

۳) سوم - پس

۲) اول - پس

(۱) سوم - قبل

- ۶۸- استفاده از اسپرم IVF در sex-sorted گاو، میزان تسهیم و بلاستوسیست در قیاس با اسپرم ایجاد می‌کند و نرخ آبستنی حاصل از رویان‌های IVP معمولاً در حد است.
- (۱) کمتر - %۳۰-۴۰
 (۲) مساوی - %۱۰-۲۰
 (۳) کمتر - %۱۰-۲۰
 (۴) مساوی - %۳۰-۴۰
- ۶۹- طول مرحله Zygotic کدام حیوان مشابه گوسفند است؟
- (۱) گاو
 (۲) مادیان
 (۳) سگ
 (۴) گربه
- ۷۰- آخرین پرده جنینی در مرحله تشکیل پرده‌های جنینی می‌باشد.
- (۱) آلانتوکوریون
 (۲) آلانتوئیس
 (۳) آمنیون
 (۴) کوریو آمنیون
- ۷۱- تعداد کروموزوم‌های کدام گونه صحیح است؟
- (۱) گورخر، اسب و الاغ ۶۴ کروموزوم
 (۲) سگ و گربه ۷۸ کروموزوم
 (۳) گوسفند و بز ۵۴ کروموزوم
 (۴) الاغ، ۶۲ کروموزوم
- ۷۲- در کدام یک از حیوانات، اولین تخمک‌گذاری پس از زایش در مدت زمان کوتاه‌تری بعد از زایمان رخ می‌دهد؟
- (۱) گوسفند
 (۲) گاو گوشته
 (۳) گاو شیری
 (۴) اسب
- ۷۳- مانور Retropulsion در سخت‌زایی گاو به چه معنا است؟
- (۱) کشیدن یک دست خم شده جنین به خارج
 (۲) چرخاندن جنین در داخل رحم
 (۳) کشش جنین به سمت خارج رحم
 (۴) هل دادن جنین از ناحیه واژن (تنگی استخوان لگن) به سمت رحم
- ۷۴- در shoulder flexion گوسفند هنگام زایمان
- (۱) جنین ۱۰۰ درصد بدون کمک خارج می‌شود.
 (۲) ابتدا با مانور Rotation جنین، اصلاح را انجام داده و سپس با مانور Traction جنین را خارج می‌کنیم.
 (۳) در شرائطی که عدم تناسب جثه جنین با لگن مادر مطرح نباشد، جنین پس از اصلاح Position خارج می‌شود.
 (۴) در شرائطی که عدم تناسب جثه جنین و لگن مادر مطرح نباشد، با استفاده از مواد لغزنده کافی، جنین بدون اصلاح خارج می‌شود.
- ۷۵- Ring womb یعنی
- (۱) عدم اتساع گردن رحم در گاو در زمان زایمان
 (۲) عدم اتساع گردن رحم در گوسفند و بز در زمان زایمان
 (۳) اتساع ناقص گردن رحم گاو در زمان فحلی
 (۴) عدم اتساع گردن رحم در اسب در زمان زایمان
- ۷۶- موارد گردن رحم ۲ تایی (Double cervix) گاو
- (۱) در معاينه رکتال کاملاً قابل تشخيص است.
 (۲) یکی از علل مهم سخت‌زایی است.
 (۳) به طور اتفاقی بیشتر در کالبد گشاپی پس از مرگ مشخص می‌شود.
 (۴) همیشه زایمان کاملاً طبیعی انجام می‌شود.

-۷۷- سکون اولیه رحم (Primary Uterine Inertia)

- ۱) به دلیل عدم نقص در توانایی انقباضی میومتریوم رحم است.
- ۲) یکی از علل عمدۀ سخت‌زایی در گونه‌های چند قلوzas است.
- ۳) یکی از علل سخت‌زایی در گونه‌های تک قلوzas است.
- ۴) به دلیل بسته بودن گردن رحم می‌باشد.

-۷۸- علل پاتولوژیک بروز سخت‌زایی در گاو با منشاء جنینی از کدام‌یک عوامل ذیل است؟

Anasarca, Ascities (۲) Cystocele, Anasarca (۱)

Cystocele, Emphysema (۴) Anarsarca, Emphysema, Ascitis (۳)

-۷۹- کدام‌یک از هورمون‌های زیر را می‌توان در تشخیص آبستنی سگ به کمک گرفت؟

LH (۴) ریلاکسین (۱) پروولاکتین (۲) پروژسترون (۳)

-۸۰- در سگ، Fertilization period در چه بازه زمانی رخ می‌دهد؟

LH-surge (۲) همزمان با LH-surge (۱)

(۴) ۲-۱ روز پس از تخم‌گذاری (۳)

-۸۱- کدام‌یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

(۱) کابرگولین، احتمالاً با تحریک مستقیم LH و FSH موجب شروع روند فولیکولوژنر در سگ می‌گردد.

(۲) برومکریپتین احتمالاً با تحریک مستقیم ترشح FSH موجب شروع روند فولیکولوژنر می‌شود.

(۳) آنتاگونیست‌های دوپامین می‌توانند طول فاز آنستروس در سگ را کوتاه کنند.

(۴) کابرگولین، احتمالاً با مهار ترشح پروولاکتین موجب کاهش طول فاز آنستروس سگ می‌شود.

-۸۲- کدام‌یک از سگ‌های نژادهای زیر Achondroplastic نبوده و به همین دلیل سخت‌زایی ناشی از عدم تطابق

جنین و لگن مادر کمتر به وجود می‌پیوندد؟

Sealyham (۴) Scottish terrier (۳) Boxer (۲) Pekinese (۱)

-۸۳- در کدام‌یک از گونه‌های زیر مکانیسم مسئول شناسایی مادری آبستنی (MRP) کمتر شناخته شده است؟

(۱) گوسفند (۲) اسب (۳) گاو (۴) بز

-۸۴- تعداد Endometrial cups در رحم مادیان حدود عدد است که محل آنها می‌باشد.

(۱) ۱۲ - در قاعده شاخ آبستن رحم

(۲) ۶ - در قاعده شاخ آبستن رحم

(۳) ۱۲ - در قاعده شاخ آبستن و غیرآبستن رحم

(۴) ۶ - در قاعده شاخ آبستن و غیرآبستن رحم

-۸۵- در مادیان از حدود روزهای آبستنی به بعد، وجود تحمدان‌ها برای ابقای آبستنی

(۱) ۱۴۰ - تا زمان زایمان ضروری نمی‌باشد.

(۲) ۱۰۰ - تا زمان زایمان ضروری نمی‌باشد.

(۳) ۱۴۰ - تا یک ماه مانده به زایمان ضروری نمی‌باشد.

(۴) ۱۰۰ - تا یک ماه مانده به زایمان ضروری نمی‌باشد.

- ۸۶- زودترین زمان تشخیص آبستنی در مادیان، توسط سونوگرافی **B-mode** در روز ۹ است و زمان رویان در روزهای آبستنی می‌باشد.
- (۱) پس از خاتمه فحلی - ۱۴ الی ۱۶
 (۲) پس از تخمک‌گذاری - ۱۴ الی ۱۶
 (۳) پس از خاتمه فحلی - ۱۶ الی ۱۸
 (۴) پس از تخمک‌گذاری - ۱۶ الی ۱۸
- ۸۷- در کدام گونه از ۲ روز قبل زایمان، میزان استروژن‌های پلاسمای مادری شروع به کاهش می‌کند؟
- (۱) گوسفند
 (۲) گاو
 (۳) سگ
 (۴) گربه
- ۸۸- فتوتوم مدل **Utrecht** است.
- (۱) انتهای این وسیله کاملاً برند
 (۲) الزاماً دارای ۲ لوله
 (۳) الزاماً دارای یک لوله محافظتی
 (۴) دارای یک لوله مارپیچ به منظور جلوگیری از بریده شدن سیستم تولید مثل
- ۸۹- جابه‌جایی رحم آبستن گوسفند ناشی از می‌باشد.
- (۱) فقط ناشی از پارگی Prepubic tendon
 (۲) پارگی عضلات کف محوطه بطنی.
 (۳) پارگی عضلات مورب داخلی و مستقیم شکم
 (۴) پارگی تاندون Prepubic و عضلات دیواره بطنی
- ۹۰- چرخش رحم گاو اتفاق می‌افتد.
- (۱) در مرحله ۲ زایمان
 (۲) به دلیل پایداری رحم اتفاق می‌افتد.
 (۳) در ارتباط با عدم تناسب جثه جنین بالگن مادر
 (۴) عمدتاً در اواخر مرحله اول و اوایل مرحله دوم زایمان

