

کد کنترل

865

A

عصر پنج شنبه  
۱۴۰۳/۱۲/۰۲

دفترچه شماره ۱۳ از ۳



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.  
مقام معظم رهبری

## آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه‌تمترک) – سال ۱۴۰۴ اپیدمیولوژی (کد ۲۷۱۳)

مدت زمان پاسخگویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۵ سؤال

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	اصول اپیدمیولوژی – آمار حیاتی – بیماری‌های باکتریایی – ویروسی – انگلی و غیرواگیردار دام و طیور – بیماری‌های مشترک انسان و دام	۷۵	۱	۷۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات کادر زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

اصول اپیدمیولوژی - آمار حیاتی - بیماری های باکتریایی - ویروسی - انگلی و غیر و آگیر دار دام و طیور - بیماری های مشترک انسان و دام

-۱ اگر میزان بروز آنفلوانزا فوچاد در طیور واکسن زده ۵۰٪ و در طیور واکسن نزدیک ۱۰٪ باشد، کارایی این واکسن چقدر است؟

- (۱) ۹۰٪  
(۲) ۸۵٪  
(۳) ۷۵٪  
(۴) ۶۰٪

-۲ کدام مورد، برای مطالعه های کارآزمایی درست است؟

- (۱) نمونه گیری تصادفی کاملاً ضروری است.

(۲) استفاده از شاهدهای تاریخی چندان توصیه نمی شود.

(۳) ملاحظات اخلاقی را در شرایط خاصی می توان نادیده گرفت.

(۴) در فاز اول کارآزمایی ها در انسان، حدود ۵۰ نفر مطالعه می شوند.

-۳ شیوع سندرم کره اسب اسطوخودوس (کمرنگ شدن کشنده رنگ پوشش) در جمعیت اسب های عرب، یک در دویست و پنج هزار است. برای شناسایی عامل خطر این بیماری، کدام مطالعه مناسب تر است؟

- (۱) کوهورت آینده نگر  
(۲) مقطعي  
(۳) کوهورت گذشته نگر  
(۴) مورد - شاهدی

-۴ در یک مطالعه مورد - شاهدی که ۱۰۰ بیمار و ۲۰۰ شاهد مورد تحقیق قرار گرفتند، به ترتیب، ۲۰ و ۳۰ نفر از هر گروه سابقه مواجهه داشتند. نسبت شانس، برابر کدام است؟

- (۱) ۶۶٪  
(۲) ۳۳٪  
(۳) ۱۵٪

-۵ برای مطالعه ارتباط ابتلا به بروسلوز و تماس با دام در پرسنل دامپزشکی، کدام مطالعه مناسب تر است؟

- (۱) هم گروهی تاریخی  
(۲) هم گروهی آینده نگر  
(۳) مقطعي  
(۴) مورد - شاهدی

-۶ در یک مطالعه هم گروهی، دو گروه ۵۰۰۰ نفری مورد تحقیق قرار گرفته اند. اگر میزان بروز بیماری در گروه مواجهه برابر ۵ درصد و در گروه شاهد ۷۵ نفر بیمار باشند، شاخص قدرت ارتباط، کدام است؟

- (۱) ۱۵٪  
(۲) ۲۵٪  
(۳) ۳۳٪

-۷ افزایش اندازه نمونه، کدام خطای را می تواند کاهش دهد؟

- (۱) تورش اطلاعات  
(۲) تورش انتخاب  
(۳) خطای منظم  
(۴) خطای تصادفی

- ۸ استفاده از واکسن هاری، جراحی پریودنتال در سگ و انجام رینگ تست روی شیر گاو، به ترتیب، چه سطحی از پیشگیری محسوب می‌شوند؟
- (۱) اولیه - ثالثیه - ثانویه  
 (۲) ثانویه - اولیه - ثانویه  
 (۳) اولیه - ثالثیه - ثانویه
- ۹ در یک گاوداری ۲۰۰۰ رأسی که ۶۰ درصد از گله گاوهای دوشاستند، سیلوی جدیدی در گاوهای غیردوشا مصرف می‌شود که باعث بروز مسمومیت در ۲۰ درصد آنها می‌شود. میزان حمله چند درصد است؟
- (۱) ۱۵  
 (۲) ۲۰  
 (۳) ۲۵
- ۱۰ با انجام یک تست غربالگری در یک جمعیت ۶۰۰ رأسی گاو شیری، ۳۶۰ رأس منفی و بقیه مثبت گزارش شدند. آزمون استاندارد طلایی نشان داد ۴۰ رأس از گاوهایی که نتیجه منفی داشته‌اند، بیمار هستند. اگر حساسیت آزمون غربالگری ۸۰ درصد باشد، ارزش اخباری مثبت آزمون چند درصد است؟
- (۱) ۴۱  
 (۲) ۶۶  
 (۳) ۷۸
- ۱۱ اگر آزمون رایت در تشخیص قب مالت دارای حساسیت ۹۵ درصد و ویژگی ۹۸ درصد باشد، چند درصد احتمال دارد فردی که نتیجه آزمون وی مثبت است، واقعاً بیمار باشد؟
- (۱) ۵  
 (۲) ۹۵  
 (۳) ۹۸
- ۱۲ کدام مورد بیانگر اعتبار (Validity) آزمون تشخیصی است؟
- (۱) دقت (Precision) آزمون  
 (۲) تکرارپذیری (Repeatability) یافته‌های آزمون  
 (۳) درجه همخوانی (Adaptation) یافته‌های آزمون با واقعیت  
 (۴) عدم وجود خطای تصادفی (Random Error) در یافته‌های آزمون
- ۱۳ کدام تعیین‌کننده، جزو فاکتورهای مستعدکننده محسوب می‌شود؟
- (۱) سن  
 (۲) جیره غذایی  
 (۳) سیستم پرورشی  
 (۴) مواجهه با عوامل عفونی
- ۱۴ محققی مایل است رابطه جنس، سن و ابتلا به یون را بعد از حذف اثرات مهم‌ترین عوامل شناخته‌شده مربوط به امنیت زیستی بررسی کند. متغیرهای وابسته، مستقل و مخدوش‌کننده به ترتیب کدام‌اند؟
- (۱) سن - ابتلا به یون - جنس  
 (۲) جنس - سن - ابتلا به یون  
 (۳) ابتلا به یون - جنس - سن
- ۱۵ کدام مورد، در خصوص اعتبار داده‌ها درست‌تر است؟
- (۱) در نظام های مراقبت، ارتباطی با روش جمع‌آوری آنها ندارد.  
 (۲) در هر دو نوع مراقبت فعال و غیرفعال، مشابه است.  
 (۳) در مراقبت غیرفعال، می‌تواند بیشتر باشد.  
 (۴) در مراقبت فعال، بیشتر است.
- ۱۶ کدام یک از معیارهای زیر، برای نشان دادن رابطه علیتی مهم‌تر است؟
- (۱) Analogy  
 (۲) Temporality  
 (۳) Specificity  
 (۴) Consistency

- ۱۷ همه‌گیری ناشی از تب برفکی، کدام است؟
- Single source (۲) Propagated (۱)  
 Common source (۴) Common vehicle (۳)
- ۱۸ کدام مورد، جزو استراتژی‌های بقای میکروب‌ها برای محفوظ ماندن از عوامل محیطی نیست؟
- (۱) انتقال عمودی  
 (۲) گوشتخواری (سارکوفاژی)  
 (۳) انتقال افقی  
 (۴) انتقال جنسی
- ۱۹ زرافه برای ویروس عامل تب برفکی، نقش کدام میزان را ایفا می‌کند؟
- (۱) اولیه  
 (۲) ثانویه  
 (۳) تصادفی  
 (۴) هیچ نقشی ندارد.
- ۲۰ جان اسنو در مطالعه علت ابتلا به وبا در لندن، از کدام مورد استفاده کرد؟
- (۱) استنتاج بر پایه مشاهدات طبیعی  
 (۲) طراحی و اجرای یک مطالعه هم‌گروهی  
 (۳) استفاده از مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی  
 (۴) استفاده از مطالعه مورد – شاهدی
- ۲۱ در یک سالن پرورش طیور در اول مرداد ۱۴۰۳، تعداد ۶۰۰ پرنده موجود است که ۱۰۰ مورد از آنها دچار بیماری آنفلوانزا هستند، از اول مرداد ۱۴۰۳ تا اول شهریور ۱۴۰۳، تعداد ۵۰ پرنده دیگر هم در این سالن به بیماری آنفلوانزا مبتلا می‌شوند و در طی این مدت ۳۰ پرنده در اثر آنفلوانزا می‌میرند. بروز تجمعی بیماری آنفلوانزا از اول مرداد ۱۴۰۳ تا اول شهریور ۱۴۰۳ و کشنده‌گی بیماری (case fatality) در طی این مدت، به ترتیب، چند درصد است؟
- (۱) ۱۰ و ۶۰  
 (۲) ۱۰ و ۲۰  
 (۳) ۸/۳ و ۶۰  
 (۴) ۸/۳ و ۲۰
- ۲۲ برآورده خطر (Risk Evaluation) و سنجش خطر (Risk Estimation) (به ترتیب، جزو کدام مراحل محسوب می‌شوند؟)
- (۱) شناسایی مخاطره (Hazard Identification) – ارزیابی خطر (Risk Assessment)  
 (۲) ارزیابی خطر (Risk Communication) – ارتباط خطر (Risk Assessment)  
 (۳) مدیریت خطر (Risk Management) – ارزیابی خطر (Risk Assessment)  
 (۴) ارزیابی خطر (Risk Assessment) – ارزیابی خطر (Risk Assessment)
- ۲۳ برای مقایسه بیماری در جمعیت‌هایی که در بعضی از ویژگی‌ها (نظیر ترکیب سنی یا نسبت جنسیتی یا ....) با هم تفاوت دارند، از کدام مقادیر استفاده می‌شود؟
- (۱) واقعی (True)  
 (۲) خام (Crud)  
 (۳) اختصاصی (Specific)  
 (۴) تطبیق‌یافته (Adjusted)
- ۲۴ کدام مورد، درخصوص بروز و شیوع بیماری‌های حاد و مزمن درست است؟
- (۱) در بیماری‌های مزمن، شیوع بیشتر از بروز و در بیماری‌های حاد، بروز بیشتر از شیوع است.  
 (۲) در بیماری‌های مزمن، بروز بیشتر از شیوع و در بیماری‌های حاد، شیوع بیشتر از بروز است.  
 (۳) هم در بیماری‌های حاد و هم در بیماری‌های مزمن، شیوع بیشتر از بروز است.  
 (۴) هم در بیماری‌های حاد و هم در بیماری‌های مزمن، بروز بیشتر از شیوع است.
- ۲۵ در کدام یک از انواع مطالعات واحد آماری مورد مطالعه، فرد نیست؟
- (۱) کارآزمایی بالینی  
 (۲) اکولوژیک  
 (۳) مقطعی  
 (۴) مورد – شاهدی
- ۲۶ در مقایسه میانگین‌ها با استفاده از روش آنالیز واریانس، کدام یک از پیش‌فرض‌های زیر، غیرضروری است؟
- (۱) تساوی حجم نمونه‌ها  
 (۲) تساوی واریانس‌ها  
 (۳) تصادفی بودن نمونه‌ها  
 (۴) نرمال بودن توزیع

- ۲۷ - کدام مورد، حدود اطمینان ۹۵ درصد برای میانگین را نشان می‌دهد؟
- (۱) ۵ درصد افراد جامعه در آن قرار می‌گیرد.  
 (۲) ۹۵ درصد افراد جامعه در آن قرار می‌گیرد.  
 (۳) با ۹۵ درصد اطمینان، میانگین را دربرمی‌گیرد.  
 (۴) با ۵ درصد اطمینان، میانگین در آن قرار می‌گیرد.
- ۲۸ - از جامعه‌ای نرمال، نمونه‌ای تصادفی به حجم ۱۶ گرفته شد که میانگین و انحراف معیار نمونه به ترتیب برابر با ۱۵ و ۵ بود. برای آزمون  $H_0: \mu = 12.5$  در برابر  $H_1: \mu < 12.5$  ملاک آزمون برابر با کدام است؟
- (۱) ۲ (۲) ۰.۵ (۳) ۲ (۴) ۵
- ۲۹ - نمودار زیر، نشان‌دهنده توزیع فراوانی یک متغیر گسسته (X) است. میانگین این متغیر، کدام است؟
- 
- (۱) ۱۵ (۲) ۱۲/۵ (۳) ۱۰ (۴) ۶
- ۳۰ - اگر X و Y دو متغیر مستقل و دارای توزیع نرمال باشند، کدام یک از متغیرهای زیر، ممکن هست توزیع نرمال نداشته باشند؟
- (۱)  $X - Y$  (۲)  $X^2$  (۳)  $X + 5$  (۴)  $2X$
- ۳۱ - اگر صفتی در جامعه به صورت تناوبی توزیع شده باشد، کدام روش نمونه‌گیری نامناسب است؟
- (۱) خوشه‌ای (۲) سیستماتیک (۳) قرعه‌کشی (۴) مطبق
- ۳۲ - در جدول توافقی به ابعاد  $3 \times 5$ ، عدد بحرانی جدول را با چه درجه آزادی جستجو می‌کنیم؟
- (۱) ۱۵ (۲) ۱۲ (۳) ۱۰ (۴) ۸
- ۳۳ - ساده‌ترین راه تشخیص وجود همبستگی بین دو متغیر، کدام است؟
- (۱) محاسبه کوواریانس (۲) محاسبه ضریب همبستگی (۳) رسم دیاگرام پراکنش (۴) محاسبه شاخص همبستگی
- ۳۴ - برای تعیین شیوع یک بیماری با سطح اطمینان ۹۵ درصد، پیش‌بینی اولیه ۲۰ درصد و خطابی معادل ۱٪، به چه تعداد نمونه نیاز است؟ ( $Z_{0.975} = 1.96$ )
- (۱) ۳۸۵ (۲) ۶۴۷ (۳) ۵۸۶۹ (۴) ۶۱۴۴
- ۳۵ - در یک مجتمع گاو شیری، ۱۰۰ رأس گاو شیروار وجود دارد که میانگین تولید شیر آنها ۳۸ کیلوگرم و واریانس تولید شیر آنها ۶۴ کیلوگرم است. ضریب تغییرات تولید شیر چقدر است؟
- (۱) ۲/۶ (۲) ۸ (۳) ۲۱ (۴) ۱۶۸
- ۳۶ - اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر ۰/۶ باشد، تا چه حد می‌توان با استفاده از اندازه‌گیری یک متغیر، مقدار متغیر دیگر را پیش‌بینی کرد؟
- (۱) ۰/۳۶ (۲) ۰/۴۰ (۳) ۰/۶۰ (۴) ۰/۶۴
- ۳۷ - چنانچه داده‌های یک مطالعه به صورت جدول ارائه شوند، افزایش فاصله گروه‌ها سبب کدام مورد می‌شود؟
- (۱) میانگین داده‌ها با دقت بیشتری محاسبه شود.  
 (۲) میانگین داده‌ها با دقت کمتری محاسبه شود.  
 (۳) میانگین داده‌ها افزایش یابد.  
 (۴) میانگین داده‌ها کاهش یابد.

- ۳۸- از بین ۵ دامپزشک، ۳ کارشناس آزمایشگاه و ۴ واکسیناتور، به چند طریق می‌توان یک اکیپ دامپزشکی شامل ۲ دامپزشک، ۱ کارشناس آزمایشگاه و ۳ واکسیناتور انتخاب کرد؟
- (۱) ۱۰  
(۲) ۱۲  
(۳) ۶۰  
(۴) ۱۲۰
- ۳۹- در آزمون یک فرضیه آماری، اگر واریانس متغیر افزایش یابد، توان آزمون چه تغییری می‌کند؟  
(۱) تفاوتی نمی‌کند.  
(۲) کاهش می‌یابد.  
(۳) قابل پیش‌بینی نیست.  
(۴) افزایش می‌یابد.
- ۴۰- کدام متغیر، از نوع فاصله‌ای است؟
- (۱) نژاد  
(۲) رتبه تولد  
(۳) درجه حرارت بدن  
(۴) میزان تولید شیر
- ۴۱- سنوروز در گوسفند، ناشی از ابتلای سگ به کدام تنیا است؟
- (۱) هیداتیزنا  
(۲) گرانولوزوس  
(۳) مولتی‌سپس  
(۴) مولتی‌لوكولاریس
- ۴۲- کدام پلاسمودیوم می‌تواند در قناری بیماری مalaria با ایجاد کند؟
- (۱) اواله  
(۲) ویواکس  
(۳) فالسیپاروم  
(۴) سیرکومفلوکسوم
- ۴۳- کم خونی، مهم‌ترین نشانه درمانگاهی آلدگی به کدام نمایتود است؟
- (۱) همونکوس  
(۲) نماتودیروس  
(۳) تلادرورسازیوز  
(۴) تریکوسترونژیلوز
- ۴۴- کدام پاتوتیپ آنفلوانزا جداشده از شیر گاو در سال جاری، سبب ایجاد نگرانی‌هایی درباره احتمال انتقال زئونوتیک آن شده است؟
- (۱)  $H_1N_1$   
(۲)  $H_5N_1$   
(۳)  $H_5N_8$   
(۴)  $H_9N_2$
- ۴۵- کدام مورد، در خصوص PBFD درست است؟
- (۱) فقط در طوطی‌سانان دیده می‌شود.  
(۲) ویروس عامل ایجاد‌کننده آن، در خانواده رتروویریده قرار دارد.  
(۳) ویروس عامل ایجاد‌کننده آن، دارای مقاومت بسیار پایینی در برابر عوامل محیطی است.  
(۴) فقط به پر، منقار و ناخن پرندگان آسیب وارد می‌کند و سیستم ایمنی پرنده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
- ۴۶- کدام بیماری، جزو بیماری‌های اخطار دادنی (Notifiable) می‌گو توسط سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) نیست؟
- (۱) IHHNV  
(۲) AHPND  
(۳) KHV  
(۴) TSD
- ۴۷- گیاه اوکالیپتوس کامالدولنسیس، در حفظ و نگهداری کدام یک از قارچ‌های زیر در طبیعت نقش دارد؟
- (۱) کاندیدا آلبیکانس  
(۲) کریپتوکوکوس نئوفورمنس  
(۳) مالاسزیا فورفور  
(۴) ساکارومایسین سرویزیه
- ۴۸- کدام یک از کلستریدیوم‌های زیر، در ادم بدخیم گاو نقشی ندارد؟
- (۱) نووای  
(۲) شووای  
(۳) سپتیکوم  
(۴) بوتولینوم
- ۴۹- چند درصد هیپرکراتوز نوک پستان‌ها، به عنوان شاخص عملکرد ماشین شیردوشی در مستعد نمودن گاوهای به ورم پستان است؟
- (۱) ۱ - ۲  
(۲) ۵ - ۱۰  
(۳) ۱۵ - ۲۰  
(۴) بیش از ۲۰
- ۵۰- کدام مورد، در خصوص سالمونلوز درست نیست؟
- (۱) در اسب اغلب، به صورت تک‌گیر رخ می‌دهد.  
(۲) بیماری پولوروم در طیور، به طور معمول به شکل عمودی منتقل می‌شود.  
(۳) سالمونلا دابلین، در گاوهای بالغ عامل معمول ایجاد سالمونلوز است و اغلب به صورت همه‌گیر رخ می‌دهد.  
(۴) اگرچه برخی از سروتیپ‌های سالمونلا در حیوان سالم وجود دارد، اما سالمونلوز با نشانه‌های بالینی در سگ و گربه غیرمعمول است.

- ۵۱- بروز لیستربوز در گوسفندانی که از خوارک‌های سیلوشده تغذیه می‌کنند، به میزان چند درصد، قابل انتظار است؟
- (۱) ۱۰ (۴) ۸ (۳) ۵ (۲) ۲ (۱)
- ۵۲- عامل ترین عامل عفونت کیسه زردۀ جوجه‌های گوشته، کدام است؟
- (۱) استافیلوكوکوس (۴) کلستریدیوم (۲) اشريشیا کلی (۳) سودوموناس
- ۵۳- مثبت شدن آزمون توبرکولین در گاو، بر کدام مورد دلالت دارد؟
- (۱) بیماری فعال سل (۲) بیماری مزمن سل (۳) حساسیت بالا نسبت به سل (۴) واکنش آلرژیک مثبت نسبت به توبرکولین
- ۵۴- مهم‌ترین راه انتقال لنفادنیت کازئوز در گوسفندان، کدام است؟
- (۱) آب و غذا (۴) تنفسی (۲) دام آلوده (۳) بندپایان
- ۵۵- کدام راه در گسترش عفونت ورم پستان ناشی از استرپتوکوکوس آگالاكتیه، نقش مهم‌تری دارد؟
- (۱) گوارشی (۴) هوای آلوده سالن شیردوشی (۲) بستر آلوده (۳) وسایل شیردوشی
- ۵۶- کدام مورد، در خصوص آنتروتوکسی درست نیست؟
- (۱) بیماری واگیردار نیست. (۲) گاو بالغ بهندرت مبتلا می‌شود. (۳) عامل بیماری، به‌طور طبیعی در روده میزبان وجود دارد. (۴) در تمام نقاط دنیا، تیپ دی کلستریدیوم پرفرنژنس عامل بیماری است.
- ۵۷- کدام مورد، در خصوص باسیلوس سرئوس در گاو درست است؟
- (۱) اغلب اوقات به فرم گوارشی، حیوان را مبتلا می‌کند. (۲) مشابه باسیلوس آنتراسیس عمل می‌کند. (۳) باعث تورم پستان می‌شود. (۴) باعث نازایی می‌شود.
- ۵۸- کدام مورد، در انتشار لیستریا مونوسيتوژنز مهم است؟
- (۱) خاک (۲) شیر (۳) مدفوع (۴) همه موارد
- ۵۹- کدام مورد، در خصوص شاربن علامتی درست است؟
- (۱) یک بیماری تحت حاد و اغلب مزمن است. (۲) جرم عامل بیماری، در خاک وجود دارد. (۳) گوسفند به بیماری مقاوم است. (۴) عامل بیماری، هوایی است.
- ۶۰- در مناطق آلوده به کلستریدیوم همولیتیکوم، عامل بیماری در کدام ارگان بدن گاو وجود دارد؟
- (۱) کبد (۴) طحال (۲) کلیه (۳) روده
- ۶۱- کدام مورد، در خصوص مسمومیت با فلور درست است؟
- (۱) مسمومیت حاد با ترکیبات دارای فلور، به‌طور معمول نادر است و تنها به‌شكل موارد تصادفی رخ می‌دهد. (۲) مسمومیت حاد با فلور، بیشتر به‌علت استفاده از حشره‌کش‌ها و جونده‌کش‌ها رخ می‌دهد. (۳) مسمومیت مزمن با فلور، از مشکلات پرورش دام‌ها در کنار مراکز صنعتی است. (۴) فاصله بین مقدار مفید و مقدار سمی فلور، بسیار زیاد است.
- ۶۲- از موارد کمیاب اورژانس واقعی در بیماری‌های گاو، کدام است؟
- (۱) کمبود مس (۴) کمبود سلنیم (۲) هیپوکلسما (۳) هیپومنیزیمی
- ۶۳- کدام مسمومیت، ناشی از مواجهه با سمهای قارچی نیست؟
- (۱) گیجی سرخس در اسب (۲) لکوانفالومالاسی اسب (۳) دگنالا در گاو و گاومیش
- ۶۴- کمبود کدام ویتامین در گاوها و گوسفندهای پرورای، عوارض شدیدتری ایجاد می‌کند؟
- A (۴) A (۳) B<sub>۱</sub> (۳) D (۲) E (۱)

- ۶۵ - علت **Swayback** در برههای نوزاد، کدام است؟
- (۱) کمبود مس در برههای ۲ تا ۴ ماهه
  - (۲) کمبود روی در برههای نوزاد
  - (۳) کمبود مس در میش‌های مادر
  - (۴) کمبود روی در میش‌های مادر
- ۶۶ - کالا آزار در هندوستان از نظر مخزن طبیعی، جزو کدام گروه است؟
- (۱) متازئونوز
  - (۲) زئونوز
  - (۳) آمفیکسینوز
  - (۴) آنتروپونوز
- ۶۷ - به علت واکنش متقاطع تست‌های سرولوژیک مانند الایزا ..... شیوع سرولوژیک بیماری هیداتید در هر جامعه به مراتب ..... از میزان فراوانی موارد اولتراسوند است.
- (۱) گاهی - بیشتر
  - (۲) همیشه - بیشتر
  - (۳) گاهی - کمتر
- ۶۸ - در انتقال کدام بیماری، کنه نقش مهم‌تری می‌تواند داشته باشد؟
- (۱) سالمونلوز
  - (۲) لپتوسپیروز
  - (۳) تب کیو
  - (۴) کزاد
- ۶۹ - آمار سالیانه موارد بروسلوز انسانی در سال‌های اخیر در کشور، حدوداً چند هزار نفر است؟
- (۱) ۱۰
  - (۲) ۱۵
  - (۳) ۲۰
  - (۴) بالای ۲۰
- ۷۰ - از نظر سیر تکاملی، عامل بیماری‌زای تریشینوز و لیشمانيوز به ترتیب جزو کدام زئونوزها هستند؟
- (۱) سیکلوزئونوز - چرخه‌ای
  - (۲) مستقیم - چرخه‌ای
  - (۳) متازئونوز - متازئونوز
- ۷۱ - تحت‌گروه اول متازئونوزها شامل آن بیماری‌هایی هستند که برای تکامل چرخه زندگی خود، به یک میزبان مهره‌دار و یک میزبان بی‌مهره نیاز دارند. کدام‌یک از بیماری‌های زیر، جزو این تحت‌گروه محسوب می‌شود؟
- (۱) آنسفالیت اسبی شرقی
  - (۲) آنسفالیت ناشی از کنه
  - (۳) تب زرد
  - (۴) پاراگونیمیوز
- ۷۲ - متاسرکر فاسیولا، در کجا تشکیل (ایجاد) می‌شود؟
- (۱) روی گیاهان
  - (۲) داخل بدن حلزون لیمنه‌آ
  - (۳) مجرای صفراوی گاو و گوسفند
  - (۴) درون آب شیرین پس از ورود تخم فاسیولا دفع شده از نشخوارکنندگان
- ۷۳ - نقش کدام پرنده، در چرخه انتقال آنفلوانزای فوق حاد پرنده‌گان بیشتر است؟
- (۱) شترمرغ
  - (۲) قو
  - (۳) ماکیان بومی روستایی
  - (۴) مرغابی
- ۷۴ - حساسیت کدام موجود (موجودات) زنده، در ابتلا به هاری با سایر موارد متفاوت است؟
- (۱) گربه
  - (۲) سگ
  - (۳) انسان
  - (۴) گوسفند و بز
- ۷۵ - کدام مورد، درخصوص **Ring worm** درست است؟
- (۱) ناشی از کرم‌ها است.
  - (۲) ناشی از عوامل قارچی است.
  - (۳) در بیماری شارین ایجاد می‌شود.
  - (۴) اندام‌های داخلی بدن را درگیر می‌کند.