

فصل ۱: عبارتهای جبری

درس (۱) چند اتحاد جبری و کاربردها
درس (۲) عبارتهای گویا

فصل ۲: معادله درجه دوم

درس (۱) معادله
درس (۲) معادله درجه دوم
درس (۳) معادله شامل عبارتهای گویا

فصل ۳: تابع

درس (۱) مفهوم تابع
درس (۲) ضابطه جبری تابع
درس (۳) تابع خطی
درس (۴) تابع درجه دو
درس (۵) توابع ثابت، چند ضابطه‌ای و همانی
درس (۶) توابع پلکانی، علامت، جزء صحیح و قدر مطلق
درس (۷) اعمال بر روی توابع (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم)

فصل ۴: کار با داده‌های آماری

درس (۱) گردآوری داده‌ها - انواع متغیرها
درس (۲) معیارهای گرایش به مرکز (حد وسط)
درس (۳) شاخص‌های پراکندگی (معیارهای پراکندگی)

فصل ۵: نمایش داده‌ها

درس (۱) نمودارهای تک‌متغیره
درس (۲) نمودارهای چندمتغیره

فصل ۶: آمار

درس (۱) شاخص‌های آماری
درس (۲) سری‌های زمانی
درس (۳) چرخه آمار در حل مسائل

فصل ۷: آشنایی با منطق و استدلال ریاضی

درس (۱) مفهوم گزاره‌ها
درس (۲) ترکیب عطفی و فصلی گزاره‌ها
درس (۳) ترکیب شرطی و دوشروطی گزاره‌ها
درس (۴) استدلال‌های ریاضی

فصل ۸: آنالیز ترکیبی و احتمال

درس (۱) شمارش
درس (۲) احتمال

فصل ۹: الگوهای خطی

درس (۱) مدل‌سازی و دنباله
درس (۲) دنباله حسابی

فصل ۱۰: الگوهای غیرخطی

درس (۱) دنباله هندسی
درس (۲) توان‌های گویا
درس (۳) تابع نمایی

پاسخ‌نامه تشریحی

پاسخ‌نامه کلیدی

۱۴	۷
۲۱	۱۶
۲۷	۲۶
۳۴	۲۸
۴۳	۴۰
۴۷	۴۵
۵۲	۴۸
۵۸	۵۴
۶۷	۶۰
۸۰	۷۵
۹۷	۸۵
۱۱۱	۱۰۴
۱۱۹	۱۱۶
۱۲۴	۱۲۱
۱۳۲	۱۲۷
۱۴۰	۱۳۶
۱۵۰	۱۴۸
۱۵۷	۱۵۴
۱۶۵	۱۶۳
۱۷۱	۱۶۸
۱۷۷	۱۷۵
۱۸۳	۱۷۸
۱۹۰	۱۸۶
۱۹۸	۱۹۵
۲۱۱	۲۰۵
۲۲۰	۲۱۵
۲۳۴	۲۲۷
۲۴۷	۲۳۹
۲۶۲	۲۵۶
۲۷۶	۲۶۸
۲۸۴	۲۸۰
۲۸۸	
۴۶۰	

آمار ترکیبی

احتمال

درس ۱

شمارش



اصول شمارش

اصل جمع

فرض کنید بتوانیم یک عمل مشخص را به X یا Y یا ... یا Z روش مختلف انجام دهیم، در این صورت طبق اصل جمع تعداد کل حالت‌های انجام آن کار برابر است با $X + Y + \dots + Z$. دقت کنید که حرف «یا» در سؤالات، نشان‌دهنده اصل جمع است. مثلاً فرض کنید مریم برای رفتن از تهران به مشهد، بتواند از یکی از ۳ خط اتوبوس یا یکی از ۲ خط هوایی یا یکی از ۴ خط ریلی استفاده کند. تعداد کل حالت‌هایی که مریم می‌تواند به مشهد برود برابر است با:

$$3 + 2 + 4 = 9$$

دقت دارید که مریم نمی‌تواند هم‌زمان از هر سه وسیله نقلیه استفاده کند و برای رفتن به مشهد فقط باید یکی از وسایل نقلیه را انتخاب کند. به همین علت از اصل جمع استفاده کرده‌ایم.

اصل ضرب

اگر عملی طی دو مرحله اول و دوم انجام پذیرد به طوری که در مرحله اول به m طریق و در مرحله دوم، هر کدام از این m طریق به n روش انجام‌پذیر باشند، در کل، آن عمل به $m \times n$ طریق انجام‌پذیر است (اصل ضرب نیز قابل تعمیم به بیشتر از ۲ مرحله می‌باشد). توجه کنید که اگر دو یا چند کار، پشت سر هم انجام شوند از اصل ضرب استفاده می‌کنیم. ضمناً حرف «و» نشان‌دهنده اصل ضرب است.

تست اگر علی ۳ پیراهن آبی، سفید و زرد و ۲ شلوار سیاه و طوسی و ۲ جفت کفش قهوه‌ای و نارنجی داشته باشد، به چند طریق می‌تواند از لباس‌های خود استفاده کند؟

۱۸ (۴)

۱۴ (۳)


۱۲ (۲)

۷ (۱)

پاسخ گزینه ۲ علی می‌تواند هم پیراهن، هم شلوار و هم کفش انتخاب کند؛ پس متوجه می‌شویم که باید از اصل ضرب استفاده کنیم:

$$\text{تعداد حالت‌ها} = 3 \times 2 \times 2 = 12$$

تست نمودار زیر، ارتباط بین سه شهر A ، B و C را با جاده‌هایی که همگی دوطرفه هستند نشان می‌دهد. شخصی می‌خواهد از شهر A به



C برود و برگردد به طوری که در مسیر برگشت از مسیرهایی که موقع رفتن استفاده کرده، دوباره عبور نکند. او چند انتخاب خواهد داشت؟

۱۸۰ (۴)

۱۲۰ (۳)

۳۶۰ (۲)

۲۴۰ (۱)

پاسخ گزینه ۱ فرد باید اول به شهر B و سپس به شهر C برود؛ پس چون باید دو کار را پشت سر هم انجام دهد، لذا متوجه می‌شویم که با اصل

$$\text{ضرب مواجه‌ایم: تعداد حالت‌های مسیر رفت} = 4 \times 5 = 20$$

شخص در مسیر برگشت، نمی‌تواند از مسیرهایی که رفته استفاده کند، لذا بین B و C یک مسیر و بین A و B هم یک مسیر حذف می‌شود و چنین می‌نویسیم:

$$\text{تعداد حالت‌های مسیر برگشت} = 4 \times 3 = 12$$

$$\text{تعداد کل حالت‌های رفت و برگشت} = 20 \times 12 = 240$$

نکته در سؤالاتی که موضوع آن‌ها آزمون‌های چند گزینه‌ای است اگر پاسخ‌دادن به همه سؤالات الزامی باشد، برای یافتن تعداد کل حالت‌های پاسخگویی باید تعداد گزینه‌ها را به توان تعداد سؤالات برسانیم.

ولی اگر پاسخ‌گویی به همه سؤالات الزامی نباشد، برای یافتن تعداد کل حالت‌ها باید تعداد گزینه‌ها را به علاوه یک کرده جواب را به توان تعداد سؤالات برسانیم.

تست اگر بخواهیم به یک آزمون چهار گزینه‌ای با ۱۰ سؤال پاسخ دهیم، چند حالت مختلف خواهیم داشت؟ (پاسخ گویی به همه سؤالات الزامی است).

$2^{10} (4)$

$10^4 (3)$


$4^8 (2)$

$2^{10} (1)$

پاسخ گزینه ۴

$4^{10} = (2^2)^{10} = 2^{20}$ = تعداد سؤالات (تعداد گزینه‌ها) = تعداد حالت‌ها

اگر در همین سؤال گفته می‌شد پاسخگویی به همه سؤالات الزامی نیست جواب برابر با 5^{10} می‌شد.



نکته در بسیاری از مسائل، از اصول جمع و ضرب به طور هم‌زمان استفاده می‌شود. مثلاً به شکل روبه‌رو

توجه کنید: فرض کنید شخصی می‌خواهد از شهر A به C سفر کند. او ۴ مسیر کلی را می‌تواند انتخاب کند.

مسیر ABC یا ABDC یا ADC یا ADBC حالا فرد هر مسیری را که انتخاب کند، باید حالت‌های

مختلف بین شهرها را در هم ضرب کند:

ABC مسیر $3 \times 4 = 12$ = تعداد حالت‌های مسیر

ADC مسیر $2 \times 2 = 4$ = تعداد حالت‌های مسیر

$ABDC$ مسیر $3 \times 1 \times 2 = 6$ = تعداد حالت‌های مسیر

$ADBC$ مسیر $2 \times 1 \times 4 = 8$ = تعداد حالت‌های مسیر

لذا تعداد کل حالت‌ها برابر با 30 می‌باشد.

نماد فاکتوریل

فرض کنید n عددی طبیعی باشد $n!$ (بخوانید n فاکتوریل) به صورت روبه‌رو تعریف می‌شود: $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$

یعنی برای یافتن فاکتوریل یک عدد طبیعی باید آن عدد را در تمام اعداد طبیعی کوچک‌تر از خود ضرب کنیم، مثلاً داریم:

$2! = 2 \times 1 = 2$ و $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ و $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ و $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

ضمناً توجه کنید که: $0! = 1$ و $1! = 1$

تذکر اگر نخواهیم فاکتوریل یک عدد را تا 1 باز کنیم، کافی است هر جا که متوقف می‌شویم علامت فاکتوریل بگذاریم؛ مثلاً:

$n! = n(n-1)(n-2)(n-3)!$

$10! = 10 \times 9!$

$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3!$

معمولاً در کسرهای این اتفاق می‌افتد؛ یعنی لازم نیست تمام عددهایی را که فاکتوریل دارند تا 1 باز کنیم؛ مثلاً در کسر $\frac{(n+3)!}{(n+1)!}$ کافی است

را 2 مرحله باز کنیم تا به مخرج برسیم (چون $n+3$ بزرگ‌تر از $n+1$ است):

$$\frac{(n+3)(n+2)(n+1)!}{(n+1)!} = (n+3)(n+2)$$

تست در کدام گزینه، یک تساوی نادرست داریم؟

$\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = n^2 + n$ (۴)

$(3!)! - 2! = 718$ (۳)

$\frac{8!}{3!2!5!} = 24$ (۲) $\sqrt{0!} + \sqrt{1!} + \sqrt{4!} + 1 = 7$ (۱)

۱ $\sqrt{0!} + \sqrt{1!} + \sqrt{4!} + 1 = \sqrt{1} + \sqrt{1} + \sqrt{24} + 1 = 1 + 1 + 5 = 7$

پاسخ گزینه ۲

۲ $\frac{8!}{3!2!5!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 28$

۳ $(3!)! - 2! = (6!) - 2! = 720 - 2 = 718$

۴ $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = \frac{(n+1) \times n \times (n-1)!}{(n-1)!} = (n+1) \times n = n^2 + n$

تست حاصل ضرب ریشه‌های معادله $(x^2 - 13) = 6$ کدام است؟

- ۱۶ (۱) -۱۶ (۲) ۲۵ (۳) -۲۵ (۴)

پاسخ گزینه ۲ فاکتوریل یک عبارت، برابر با ۶ شده؛ پس آن عبارت باید ۳ باشد؛ چون می‌دانیم که $۳! = ۶$ است:

$$x^2 - 13 = 3 \Rightarrow x^2 = 16 \xrightarrow{\text{جذر}} x = \pm 4 \Rightarrow \text{ضرب ریشه‌ها} = (+4)(-4) = -16$$

جایگشت

مفهوم جایگشت: افراد، اعداد، اشیا و ... به صورت‌های مختلف می‌توانند کنار هم قرار بگیرند. به هر یک از حالت‌های ممکن برای قرار گرفتن n شیء متمایز در کنار هم، یک جایگشت از آن n شیء می‌گوییم. به عنوان مثال می‌خواهیم جایگشت‌های ارقام ۱ و ۲ و ۳ را بنویسیم؛ یعنی می‌خواهیم تمام اعداد سه‌رقمی که با این ارقام می‌توان ساخت را بنویسیم. این اعداد عبارت‌اند از:

۱۲۳، ۱۳۲، ۲۳۱، ۲۱۳، ۳۱۲، ۳۲۱
پس ملاحظه می‌کنیم که ۶ عدد ۳ رقمی یا ۶ جایگشت ۳ رقمی ساخته شد. بدون نوشتن تمام جایگشت‌ها نیز می‌توانیم تعداد آن‌ها را تعیین کنیم. تعداد جایگشت‌های n شیء متمایز برابر است با $n!$ مثلاً تعداد جایگشت‌های مختلف که با حروف کلمه «AMIR» می‌توان ساخت برابر $۴! = ۲۴$ است با:

تست تعداد جایگشت‌های چند شیء متمایز برابر ۱۲۰ می‌باشد. تعداد این اشیاء کدام است؟

- ۴ (۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۷ (۴)

پاسخ گزینه ۲ اگر تعداد اشیای متمایز را n فرض کنیم، خواهیم داشت:


$$n! = 120 \Rightarrow n = 5 \text{ (می‌دانیم } 5! \text{ برابر } 120 \text{ می‌شود)}$$

نکته در بسیاری از مسائل، بهتر است برای ساختن اعداد، کلمات و ... از روش پرکردن خانه‌ها استفاده کنیم. در این مسائل اگر شرط خاصی مثل زوج یا فرد بودن عدد مطرح شد، باید ابتدا اولین خانه سمت راست را پر کنیم و سپس به سراغ اولین خانه سمت چپ برویم و خانه‌ها را از چپ به راست پر کنیم. (البته هر مسئله، شرط خاص خودش دارد ولی فوهمیدن این‌که از کجا شروع به پرکردن فونه‌ها کنیم با کمی تمرین کاملاً براتون میفته)

تست با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ چند عدد ۶ رقمی می‌توان ساخت؟ (بدون تکرار ارقام)

- ۳۰۰ (۱) ۵۰۰ (۲) ۶۰۰ (۳) ۷۰۰ (۴)


پاسخ گزینه ۳ شرط خاصی برای عدد شش‌رقمی ذکر نشده (جز این‌که رقم‌ها تکراری نباشند)، پس پرکردن خانه‌ها را از چپ به راست انجام می‌دهیم. فقط توجه کنید که اولین رقم سمت چپ عدد نمی‌تواند با صفر شروع شود، ضمناً پس از پرکردن هر خانه، وقتی به سراغ خانه بعدی می‌رویم، باید یک رقم استفاده‌شده را به دلخواه از خانه قبلی حذف کنیم (چون تکرار ارقام غیرمجاز است).



تست با ارقام ۰، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸ چند عدد فرد چهاررقمی می‌توان ساخت؟ (بدون تکرار ارقام)

- ۱۵۰ (۱) ۲۰۰ (۲) ۳۰۰ (۳) ۳۵۰ (۴)

پاسخ گزینه ۳ عددی فرد است که یکانش فرد باشد، پس ابتدا اولین خانه سمت راست را با توجه به این موضوع پر می‌کنیم، سپس به سراغ اولین خانه سمت چپ می‌رویم:




نکته اگر صفر جزء ارقام داده‌شده باشد و بخواهیم عدد زوج یا مضرب ۵ بسازیم و ضمناً تکرار ارقام غیرمجاز باشد، باید دو حالت جداگانه تشکیل دهیم. یکی وقتی که یکان صفر باشد و دیگری وقتی که یکان صفر نباشد.

تست با ارقام ۰, ۲, ۴, ۵, ۶, ۷ چند عدد ۴ رقمی زوج و بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت؟


- ۳۴۰ (۴) ۲۸۲ (۳) ۲۰۴ (۲) ۱۸۴ (۱)

حالت اول



\Rightarrow تعداد عددها = $5 \times 4 \times 3 \times 1 = 60$

حالت دوم




\Rightarrow تعداد عددها = $4 \times 4 \times 3 \times 3 = 144$

طبق اصل جمع \rightarrow تعداد کل عددهای خواسته شده = $60 + 144 = 204$

پاسخ گزینه ۲

طبق نکته گفته شده باید ۲ حالت جداگانه در نظر بگیریم:

تذکره اگر در تست بالا ذکر می‌شد که تکرار رقم‌ها مجاز است نباید هیچ عددی را خط می‌زدیم و فقط با یک حالت به جواب می‌رسیدیم:



\Rightarrow تعداد عددها = $5 \times 6 \times 6 \times 4 = 720$

کنار هم قرار گرفتن چند شیء خاص

گاهی اوقات می‌خواهیم افراد یا اشیاء یا حروف یا ارقام خاصی همیشه کنار هم باشند. در این گونه سؤالات آن اشیاء یا افراد را یک مجموعه به هم چسبیده فرض می‌کنیم؛ یعنی آن‌ها را داخل یک بسته قرار می‌دهیم؛ سپس تعداد اشیای بیرون بسته و خود بسته را شمرده با فاکتوریل می‌نویسیم و آن را در تعداد اشیای داخل بسته با فاکتوریل ضرب می‌کنیم. مثلاً می‌خواهیم با حروف کلمه **mafluk** کلماتی بسازیم که در آن‌ها حروف **m, a** و **a** همواره کنار هم باشند:

$m, a \downarrow$
اشیاء
 $f, l, u, k \Rightarrow$ تعداد کلمات مطلوب = $5! \times 2! = 120 \times 2 = 240$

توجه دارید که بیرون بسته ۴ شیء (۴ حرف) وجود داشت که به همراه خود بسته برابر ۵ شد که با فاکتوریل نوشتیم. سپس تعداد اشیاء (حروف) داخل بسته را شمردیم که ۲ تا بود و نوشتیم ۲!

تست با ارقام ۱, ۲, ۴, ۵, ۶, ۷, ۹ چند عدد ۷ رقمی می‌توان ساخت به طوری که در تمام این اعداد، رقم‌های فرد کنار هم قرار گیرند؟

- ۲۷۶ (۱) ۴۷۶ (۲) (تکرار ارقام مجاز نیست.)
۶۷۶ (۳) ۵۷۶ (۴)

پاسخ گزینه ۱

رقم‌های فرد را کنار هم و در داخل یک بسته قرار می‌دهیم:

$1, 5, 7, 9 \downarrow$
اشیاء
 $2, 4, 6 \Rightarrow$ تعداد عددهای مطلوب = $4! \times 4! = 24 \times 24 = 576$

البته توجه کنید اگر حروف یا ارقام داخل بسته، یکسان بودند نباید اشیای داخل را شمارش کنیم.

تست با حروف کلمه «NAAMDARAAN» چند کلمه ۱۰ حرفی می‌توان ساخت به طوری که در همه آن‌ها حروف یکسان، کنار هم قرار داشته باشند؟

- ۱۲۰ (۱) ۱۸۰ (۲) ۵! × ۵! × ۲! (۳) ۵! × ۴! (۴)

پاسخ گزینه ۱

$AAAAA \downarrow$ $NN \downarrow$
بسته ۱ بسته ۱
 $M D R \Rightarrow$ تعداد کلمات خواسته شده = $5! = 120$

توجه کنید که الان دیگر نباید داخل مستطیل‌ها را بشماریم چون در داخل مستطیل اول، همگی **A** و مستطیل دوم همگی **N** هستند و جابه‌جایی **A**ها با هم و **N**ها با هم، تغییری ایجاد نمی‌کند.

مسائل ترتیب

در نظر بگیرید که n شیء متمایز موجود است و می‌خواهیم r شیء از آن‌ها را به شرطی انتخاب کنیم که ترتیب قرار گرفتن آن‌ها کنار هم، مهم باشد. در این صورت تعداد حالت‌های انتخاب r شیء از n شیء را با $P(n, r)$ نشان داده و آن را ترتیب r شیء از n شیء می‌نامیم و به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad n \geq r$$


تست از بین ۶ کارمند می‌خواهیم نفر اول را به عنوان مدیر، نفر دوم را به عنوان معاون و نفر سوم را به عنوان دفتردار انتخاب کنیم. به چند طریق می‌توان این کار را انجام داد؟

- ۱۸۰ (۴) ۱۴۰ (۳) ۱۲۰ (۲) ۱۰۰ (۱)

پاسخ گزینه ۲ ترتیب انتخاب افراد مهم است، زیرا نفر اول، نفر دوم و نفر سوم هر کدام سمت‌های مختلفی دارند، پس در واقع باید به کمک فرمول بالا، ۳ نفر را از بین ۶ نفر انتخاب کنیم:

$$P(6, 3) = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!} = 120$$

البته به جای استفاده از فرمول $P(n, r)$ می‌توانیم از روش پرکردن خانه‌ها نیز استفاده کنیم:



$$\Rightarrow \text{تعداد حالت‌ها} = 6 \times 5 \times 4 = 120$$

تست تعداد ترتیب‌های n شیء از ۵ شیء برابر است با تعداد ترتیب‌های $(n-1)$ شیء از ۵ شیء، مربع n کدام است؟

- ۲۵ (۴) ۴۹ (۳) ۳۶ (۲) ۱۰۰ (۱)

$$P(5, n) = P(5, n-1) \Rightarrow \frac{5!}{(5-n)!} = \frac{5!}{(5-(n-1))!}$$

$$\Rightarrow \frac{5!}{(5-n)!} = \frac{5!}{(5-n+1)!} \Rightarrow (5-n)! = (5-n)! \Rightarrow (5-n)! = (5-n)(5-n)! \Rightarrow 5-n=1 \Rightarrow n=5 \Rightarrow n^2=25$$

مسائل ترکیب در نظر بگیرید که n شیء متمایز وجود دارد و می‌خواهیم r شیء را از بین آن‌ها انتخاب کنیم به شرطی که ترتیب قرار گرفتن آن‌ها کنار هم مهم نباشد. در این صورت تعداد حالت‌های انتخاب r شیء از n شیء را با $C(n, r)$ یا $\binom{n}{r}$ نمایش داده و آن را ترکیب r شیء از n شیء می‌نامیم و فرمول آن به صورت مقابل است:

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \times r!}, \quad n \geq r$$

تست در یک پرواز داخلی ۴ جای خالی وجود دارد و ۹ نفر در لیست انتظار قرار دارند. به چند حالت می‌توان ۴ نفر را سوار هواپیما کرد؟

- ۱۲۶ (۴) ۱۱۰ (۳) ۱۰۸ (۲) ۱۰۰ (۱)

پاسخ گزینه ۲ در مورد ترتیب انتخاب این ۴ مسافر برای سوار کردنشان به هواپیما تأکیدی نشده پس باید از فرمول ترکیب استفاده کنیم:

$$\text{تعداد حالت‌ها} = \binom{9}{4} = \frac{9!}{(9-4)! \times 4!} = \frac{9!}{5! \times 4!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5! \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$

تست ۷ نقطه روی محیط یک دایره قرار دارند. تعداد چهارضلعی‌هایی که با این ۷ نقطه می‌توان ساخت کدام است؟

- ۶۵ (۴) ۴۰ (۳) ۳۵ (۲) ۳۰ (۱)

پاسخ گزینه ۲ باز هم با یک مسئله ترکیب مواجه‌ایم. چون می‌دانید که چهارضلعی ABCD مثلاً با BCAD فرقی ندارد؛ یعنی وقتی چهار نقطه را به عنوان رأس‌های چهارضلعی انتخاب می‌کنیم، دیگر جابه‌جایی آن‌ها با هم، چهارضلعی جدیدی ایجاد نمی‌کند، لذا خواهیم داشت:

$$\text{تعداد چهارضلعی‌ها} = \binom{7}{4} = \frac{7!}{(7-4)! \times 4!} = \frac{7!}{3! \times 4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{6 \times 4!} = 35$$



تذکره اگر در همین سؤال گفته می‌شد چند وتر می‌توان ساخت، جواب برابر با $\binom{7}{3}$ می‌شد و اگر گفته می‌شد چند مثلث می‌توان ساخت، جواب برابر با $\binom{7}{3}$ می‌شد.

نکته تعداد زیرمجموعه‌های r عضوی از یک مجموعه n عضوی برابر است با $\binom{n}{r}$. در این‌جا از فرمول ترکیب استفاده کرده‌ایم، چون می‌دانیم در مجموعه‌ها جابه‌جایی اعضا با هم تأثیری ندارد و مجموعه جدیدی تشکیل نمی‌شود.

تست مجموعه $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ چند زیرمجموعه ۳ عضوی دارد؟

۱۸ (۱) ۲۰ (۲) ۳۵ (۳) ۴۵ (۴)

پاسخ گزینه ۳ مجموعه A دارای ۷ عضو است، پس تعداد زیرمجموعه‌های ۳ عضوی آن برابر است با:

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{(7-3)! \times 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4! \times 3 \times 2 \times 1} = 35$$

انتخاب اجباری گاهی اوقات مجبوریم ۱ یا چند شیء یا فرد را حتماً جزء انتخابمان قرار دهیم. فرض کنید بخواهیم از بین n شیء متمایز r شیء را انتخاب کنیم به طوری که k شیء به خصوص حتماً انتخاب شوند، تعداد حالت‌های انجام این کار برابر با $\binom{n-k}{r-k}$ می‌باشد. چون واضح است که k شیء قبلاً انتخاب شده‌اند، پس باید $r-k$ شیء باقی‌مانده را از بین $n-k$ شیء انتخاب کرد.

تست تعداد زیرمجموعه‌های ۴ عضوی مجموعه $A = \{m, n, p, z, x, y, f\}$ به شرطی که همه آن‌ها شامل x, y باشند، کدام است؟

۱۸ (۱) ۱۰ (۲) ۱۲ (۳) ۲۰ (۴)

پاسخ گزینه ۲ ۲ انتخاب اجباری x و y داریم، پس خواهیم نوشت:

$$\text{تعداد زیرمجموعه‌ها} = \binom{7-2}{4-2} = \binom{5}{2} = \frac{5!}{(5-2)! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2 \times 1} = 10$$

روش‌های حل سریع ترکیب: در خیلی از موارد نیازی نیست از فرمول ترکیب به شکل $\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$ به طور معمول استفاده کنیم، بدون اثبات از فرمول‌های زیر استفاده می‌کنیم تا سرعت حل کردن مسائل ترکیب را بالا ببریم:

- ۱ اگر در ترکیب $\binom{n}{r}$ اعداد r و n برابر باشند جواب حتماً برابر ۱ است:
- ۲ اگر در ترکیب $\binom{n}{r}$ عدد r برابر صفر باشد جواب حتماً برابر ۱ است:
- ۳ اگر در ترکیب $\binom{n}{r}$ عدد r برابر ۱ باشد جواب خود n است:
- ۴ اگر در ترکیب $\binom{n}{r}$ اختلاف r و n برابر ۱ باشد آن‌گاه جواب برابر n است:
- ۵ اگر ترکیب به شکل $\binom{n}{2}$ باشد، خواهیم داشت:

تست به چند طریق می‌توان از بین ۵ مرد و ۴ زن، ۶ نفر را انتخاب کرد، به طوری که حداقل ۳ زن انتخاب شوند؟

۵۰ (۱) ۶۰ (۲) ۷۵ (۳) ۸۵ (۴)

پاسخ گزینه ۱ کلاً ۴ زن وجود دارند، پس حداقل ۳ زن یعنی باید ۳ زن یا ۴ زن انتخاب شوند. می‌دانید حرف «یا» به معنی استفاده از اصل جمع است:

$$\text{تعداد کل حالت‌ها} = \binom{4}{3} + \binom{4}{4} = 4 \times 1 + 1 \times 1 = 5$$

سعی کنید جواب‌های دو ترکیب $\binom{5}{2}$ و $\binom{5}{3}$ را حفظ کنید، چون با آن‌ها زیاد سروکار داریم (جواب هر دوی آن‌ها به کمک فرمول ترکیب برابر با ۱۰ می‌شود).

اصل جمع - اصل ضرب

۱۰۵۹- از بین ۱۰ کشور اروپایی، ۶ کشور آسیایی و ۳ کشور آمریکای شمالی می‌خواهیم یک کشور را برای سفر به این کشورها انتخاب کنیم. چند حالت برای سفر به این کشور خواهیم داشت؟

- (۱) ۱۱۰ (۲) ۱۸۰ (۳) ۱۹ (۴) ۲۰

۱۰۶۰- فرض کنید یک دانشجو می‌خواهد ۱ درس عمومی از بین ۳ درس عمومی ارائه‌شده و ۱ درس اختصاصی از بین ۴ درس اختصاصی ارائه‌شده انتخاب کند. او به چند طریق می‌تواند این کار را انجام دهد؟

- (۱) ۱۵ (۲) ۷ (۳) ۸ (۴) ۱۲

۱۰۶۱- به چند طریق می‌توانیم فقط یک خودکار یا یک مداد یا یک روان‌نویس از بین ۵ خودکار آبی، قرمز، سبز، مشکی و سفید و ۸ مداد با رنگ‌های متمایز و ۳ روان‌نویس با رنگ‌های مختلف انتخاب کنیم؟

- (۱) ۱۲۰ (۲) ۱۶ (۳) ۱۶۰ (۴) ۱۲

۱۰۶۲- یک کارخانه تولید خودرو، خودروهایی در ۷ رنگ، ۳ حجم موتور، ۲ نوع گیربکس و ۲ نوع مختلف داشبورد تولید می‌کند. یک خریدار برای خرید یک خودرو از این کارخانه چند انتخاب خواهد داشت؟

- (۱) ۱۴ (۲) ۸۴ (۳) ۲۸ (۴) ۱۲۰

۱۰۶۳- یک تاس و ۳ سکه را با هم پرتاب می‌کنیم. تعداد حالت‌هایی که در آن‌ها تاس عدد اول آمده کدام است؟

- (۱) ۴۰ (۲) ۴۸ (۳) ۲۴ (۴) ۸۴

۱۰۶۴- تعداد راه‌های ممکن برای پاسخ‌دادن به تعدادی سؤال ۴ گزینه‌ای برابر $(125)^x$ است. تعداد سؤالات کدام گزینه است؟ (پاسخ‌دادن به سؤالات الزامی نیست.)

- (۱) ۱۶ (۲) ۱۸ (۳) ۲۱ (۴) ۲۸


۱۰۶۵- تعداد حالت‌های پاسخ‌گویی به یک آزمون ۳ سؤالی که هر سؤال ۲ گزینه دارد چند برابر تعداد حالت‌های پاسخ‌گویی به یک آزمون ۳ سؤالی ۴ گزینه‌ای است؟ (پاسخ‌گویی به همه سؤالات الزامی است.)

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) ۴ (۳) $\frac{1}{8}$ (۴) ۸

۱۰۶۶- یک دانش‌آموز در کنکور سراسری رشته انسانی، به ۲۸۰ سؤال موجود در دفترچه‌ها به چند طریق می‌تواند پاسخ دهد؟ (پاسخ‌گویی به همه سؤالات الزامی نیست.)


- (۱) 4^{280} (۲) 280^4 (۳) 5^{280} (۴) 280^5

۱۰۶۷- بین ۴ شهر A, B, C و D مطابق شکل زیر، راه‌های ارتباطی وجود دارد. به چند طریق می‌توانیم از A به D برویم و برگردیم به شرطی که در مسیر رفت از راه‌های دوطرفه و در مسیر برگشت از راه‌های یک‌طرفه استفاده کنیم؟



- (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۶ (۴) ۸

۱۰۶۸- اگر تعداد راه‌ها از شهر A به E را با x و از B به C را با y نمایش دهیم و فردی به ۲۴ حالت مختلف بتواند از A به D سفر کند، حاصل $x + 4y$ کدام است؟



- (۱) ۷ (۲) ۸ (۳) ۹ (۴) ۱۰

فاکتوریل

۱۰۶۹- چه تعداد از روابط زیر، درست هستند؟ (n عدد طبیعی و بزرگ‌تر از ۱ است)

- (الف) $3 \times 4! = 12!$ (ب) $10! - 3! = 7!$

- (پ) $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = n^2 + n$ (ت) $(0!)^2 = (1!)^2$

- (ث) $\sqrt{9!} = 3!$ (ج) $n! = n(n-1)(n-2)!$

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۱۰۷۰- اگر $\frac{(n-1)!}{(n+1)!} = \frac{1}{6}$ باشد حاصل $(n+2)!$ کدام است؟

- (۱) ۱۲۰ (۲) ۶ (۳) ۲۴ (۴) ۷۲۰

۱۰۷۱- اگر $\frac{(x+2)!}{(x+1)!} = 4$ باشد، آن گاه حاصل $2x$ کدام است؟

۸ (۴)	۶ (۳)	۴ (۲)	۲ (۱)
۴ (۴)	۳ (۳)	۲ (۲)	۱ (صفر)
۴ (ریشه ندارد)	۳ (۳ ریشه)	۱ (۲ ریشه)	۲ (۱ ریشه)

جایگشت (ساختن کلمات و اعداد)

۱۰۷۴- چند عدد ۳ رقمی بخش پذیر بر ۵ و متشکل از رقم‌های فرد وجود دارد؟

۲۵ (۴)	۲۴ (۳)	۲۰ (۲)	۱۸ (۱)
--------	--------	--------	--------

۱۰۷۵- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ چند عدد پنج رقمی و بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت؟

۸۰۰ (۴)	۴۰۰ (۳)	۲۰۰ (۲)	۶۰۰ (۱)
---------	---------	---------	---------

۱۰۷۶- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ چند عدد چهار رقمی و فرد بدون تکرار ارقام می‌توان ساخت؟

۹۶ (۴)	۹۲ (۳)	۸۴ (۲)	۴۶ (۱)
--------	--------	--------	--------

۱۰۷۷- چند عدد پنج رقمی زوج با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ می‌توان نوشت؟ (بدون تکرار ارقام)

۴۱۸ (۴)	۳۱۲ (۳)	۲۵۰ (۲)	۱۸۶ (۱)
---------	---------	---------	---------

۱۰۷۸- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ چند عدد چهار رقمی مضرب ۵ می‌توان نوشت؟ (با تکرار ارقام)

۳۰۰ (۴)	۲۰۰ (۳)	۱۸۰ (۲)	۱۲۰ (۱)
---------	---------	---------	---------

۱۰۷۹- با ارقام موجود در مجموعه $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ چند عدد پنج رقمی فرد، بدون تکرار رقم‌ها، می‌توان نوشت؟

۳۰۰ (۴)	۲۴۰ (۳)	۱۸۰ (۲)	۱۲۰ (۱)
---------	---------	---------	---------

۱۰۸۰- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ چند عدد چهار رقمی مضرب ۵ می‌توان ساخت؟ (بدون تکرار ارقام)

۴۲ (۴)	۴۸ (۳)	۳۲ (۲)	۵۴ (۱)
--------	--------	--------	--------

۱۰۸۱- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ چند عدد ۳ رقمی کوچک‌تر از ۴۰۰ بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت؟

۷ (۴)	۱۴ (۳)	۱۵ (۲)	۱۲ (۱)
-------	--------	--------	--------

۱۰۸۲- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ چند عدد چهار رقمی بخش پذیر بر ۵، بدون تکرار رقم‌ها، می‌توان نوشت؟

۱۲۰ (۴)	۱۰۸ (۳)	۹۶ (۲)	۷۲ (۱)
---------	---------	--------	--------

۱۰۸۳- چند عدد ۴ رقمی مضرب ۵ وجود دارد؟ (تکرار ارقام مجاز است.)

۴۴۸ (۴)	۵۰۴ (۳)	۱۸۰۰ (۲)	۹۰۰ (۱)
---------	---------	----------	---------

۱۰۸۴- چند عدد ۴ رقمی مضرب ۵ با ارقام مختلف می‌توان نوشت؟

۹۵۲ (۴)	۸۱۰ (۳)	۵۰۴ (۲)	۲۰۰۰ (۱)
---------	---------	---------	----------

۱۰۸۵- چند عدد سه رقمی با ارقام متمایز وجود دارد؟

۷۲۰ (۴)	۶۴۸ (۳)	۵۰۴ (۲)	۴۵۰ (۱)
---------	---------	---------	---------

۱۰۸۶- چند عدد ۵ رقمی وجود دارد که تمام ارقام آن زوج و غیر صفر است؟

۱۰۲۴ (۴)	۶۲۵ (۳)	۵۱۲ (۲)	۲۵۶ (۱)
----------	---------	---------	---------

۱۰۸۷- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ چند عدد کوچک‌تر از ۷۰۰ می‌توان ساخت؟ (بدون تکرار ارقام)

۶۴ (۴)	۶۰ (۳)	۳۴ (۲)	۴۸ (۱)
--------	--------	--------	--------

۱۰۸۸- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ چند عدد ۵ رقمی و بزرگ‌تر از ۵۰۰۰۰ می‌توان نوشت؟ (بدون تکرار ارقام)

۲۸۰ (۴)	۳۸۰ (۳)	۴۸۰ (۲)	۳۰۰ (۱)
---------	---------	---------	---------

۱۰۸۹- چند عدد ۳ رقمی بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت که رقم دهگان آن، عددی اول باشد؟

۳۳۶ (۴)	۲۵۶ (۳)	۲۲۴ (۲)	۱۹۶ (۱)
---------	---------	---------	---------

۱۰۹۰- عدد ۳۸۵۲۹۴ چند جایگشت دارد به طوری که ارقام فرد همواره کنار هم باشند؟

۱۴۴ (۴)	۱۲۰ (۳)	۱۰۸ (۲)	۹۶ (۱)
---------	---------	---------	--------

۱۰۹۱- با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ چند عدد ۳ رقمی بزرگ‌تر از ۳۳۰ بدون تکرار ارقام می‌توان ساخت؟

۳۲ (۴)	۴۸ (۳)	۲۴ (۲)	۶۰ (۱)
--------	--------	--------	--------

(فارج ۹۱)

(فارج ۹۸)

(سراسری ۹۸)

(فارج ۸۸)

(سراسری ۸۸)

۱۰۹۲- با ارقام ۰, ۱, ۴, ۵, ۸, چند عدد ۳ رقمی مضرب ۱۰ و بزرگ‌تر از ۴۰۰ می‌توان ساخت؟ (بدون تکرار ارقام)

۹ (۱) ۱۲ (۲) ۲۴ (۳) ۶ (۴)

۱۰۹۳- با تمام ارقام فرد طبیعی یک‌رقمی، چند عدد ۵ رقمی مضرب ۵ و بزرگ‌تر از ۷۰۰۰ می‌توان ساخت؟ (بدون تکرار ارقام)

۱۲ (۱) ۲۴ (۲) ۱۸ (۳) ۴۸ (۴)

۱۰۹۴- با ارقام ۰, ۳, ۴, ۵, ۶, ۷, چند عدد چهاررقمی بزرگ‌تر از ۳۰۰۰ و کوچک‌تر از ۶۰۰۰ می‌توان ساخت؟ (تکرار ارقام غیرمجاز است.)

۱۸۰ (۱) ۱۲۰ (۲) ۹۰ (۳) ۸۰ (۴)

۱۰۹۵- چند عدد ۴ رقمی طبیعی فرد وجود دارد که رقم یکان هزار آن‌ها فرد نباشد؟

۱۰۰۰ (۱) ۱۵۰۰ (۲) ۲۰۰۰ (۳) ۲۵۰۰ (۴)

۱۰۹۶- چند عدد چهاررقمی با ارقام ۱, ۲, ۳, ۵, ۶, ۷ می‌توان ساخت به طوری که ارقام ۵ و ۶ در آن‌ها به کار رفته و در کنار هم باشند؟ (بدون تکرار ارقام)

۳۶ (۱) ۱۲ (۲) ۷۲ (۳) ۲۴ (۴)

۱۰۹۷- تعداد جایگشت‌های ۶ حرفی کلمه «Suarez» که در آن‌ها حروف صدادار و بی‌صدا یکی در میان قرار بگیرند کدام است؟ (تکرار حروف غیرمجاز است.)

۴۲ (۱) ۷۲ (۲) ۶۴ (۳) ۸۲ (۴)

۱۰۹۸- ۴ فرد با نام‌های A, B, C و D می‌خواهند به ترتیب در یک همایش سخنرانی کنند به چند حالت امکان پذیر است؟

۱۸ (۱) ۱۲ (۲) ۲۴ (۳) ۴۸ (۴)

۱۰۹۹- با حروف کلمه «تمساح» و بدون تکرار حروف، چند کلمه ۵ حرفی می‌توان نوشت که با «ت» شروع و به «ح» ختم شوند؟

۸ (۱) ۱۰ (۲) ۱۲ (۳) ۶ (۴)

۱۱۰۰- با حروف کلمه «earth» چند کلمه ۴ حرفی می‌توان نوشت که حتماً شامل حرف h باشد؟ (تکرار حروف، غیر مجاز است.)

۳۶ (۱) ۹۶ (۲) ۴۸ (۳) ۱۲۰ (۴)

۱۱۰۱- تعداد جایگشت‌های حروف کلمه «DAMDARAN» به شرط آن‌که حروف یکسان کنار هم قرار گیرند کدام است؟ (سراسری ۸۴)

۱۲۰ (۱) ۱۸۰ (۲) ۲۴۰ (۳) ۳۶۰ (۴)

۱۱۰۲- پلاک اتومبیل سواری در تهران به صورت $\frac{\text{تهران}}{***ب***}$ می‌باشد که هر ستاره، نمایش یک رقم غیر صفر است. در سری «ب» و در تهران چند پلاک می‌توان ساخت که با رقم فرد شروع و به رقم زوج ختم شود؟

۱۱۶۶۴ (۱) ۱۴۵۸۰ (۲) ۱۵۴۸۰ (۳) ۱۸۲۲۵ (۴)

۱۱۰۳- با حروف کلمه «دلبران» چند کلمه ۷ حرفی می‌توان ساخت به طوری که در همه آن‌ها عبارت «دلبر» به همین شکل مطرح شود؟

۹ (۱) ۱۸ (۲) ۲۴ (۳) ۳۶ (۴)

۱۱۰۴- حروف کلمه «ASSIST» را به چند طریق می‌توان بدون توجه به مفهوم کنار هم قرار داد که حروف «S» یک در میان باشند؟

۸ (۱) ۹ (۲) ۱۰ (۳) ۱۲ (۴)

۱۱۰۵- تعداد جایگشت‌های کلمه «MAHSUS» که در آن‌ها بین دو حرف S دقیقاً یک حرف دیگر وجود داشته باشد کدام است؟

۴۸ (۱) ۹۶ (۲) ۱۱۸ (۳) ۲۴۰ (۴)

۱۱۰۶- با حروف کلمه «DANESH» چند رمز عبور چهار حرفی می‌توان ساخت به طوری که حرف S در هر رمز باشد؟ (سراسری ۹۷)

۲۴۰ (۱) ۲۵۰ (۲) ۲۶۰ (۳) ۲۷۰ (۴)

۱۱۰۷- با حروف کلمه «همسر خوب» و بدون تکرار حروف، چند کلمه ۷ حرفی می‌توان نوشت که در آن‌ها دو حرف «س» و «ب» کنار هم نیامده باشند؟

۸۸۰ (۱) ۱۲۰۰ (۲) ۲۵۰۰ (۳) ۳۶۰۰ (۴)

۱۱۰۸- با حروف کلمه «ملک‌پوری» چند کلمه ۴ حرفی (با معنی یا بی‌معنی) می‌توان نوشت به طوری که تمام حروف آن‌ها بدون نقطه باشند و همه آن‌ها به «ر» ختم شوند؟ (تکرار حروف جایز نیست.)

۲۴ (۱) ۱۸ (۲) ۶ (۳) ۸ (۴)

ترتیب و ترکیب

۱۱۰۹- مقدار کدام عبارت زیر با $n!$ برابر است؟

$C(n, 0)$ (۱) $C(n, 1)$ (۲) $P(n, n-1)$ (۳) $P(n, 0)$ (۴)

۱۱۱۰- از ۱۲ نفر دانش‌آموز نمونه، به چند روش می‌توان سه نفر را جهت مشارکت در سه مورد متمایز در امور مدرسه انتخاب کرد؟

۱۳۲۰ (۱) ۶۶۰ (۲) ۳۳۰ (۳) ۲۲۰ (۴)

۱۱۱۱- از ۱۰ کتاب ادبی متفاوت و ۸ کتاب علوم متفاوت، چند دسته ۵ تایی شامل ۲ کتاب ادبی و ۳ کتاب علوم می‌توان انتخاب کرد؟ (سراسری ۸)

۲۴۱۰ (۱) ۲۴۲۰ (۲) ۲۵۲۰ (۳) ۲۵۴۰ (۴)

۱۱۱۲- در جعبه‌ای ۶ مهره قرمز و ۴ مهره آبی وجود دارد به چند طریق می‌توان ۳ مهره از این جعبه خارج کرد؟

- (۱) ۱۰۰ (۲) ۱۲۰ (۳) ۱۸۰ (۴) ۲۱۰

۱۱۱۳- روی محیط یک دایره ۱۰ نقطه وجود دارد. چه تعداد مثلث با این نقاط می‌توان تشکیل داد؟

- (۱) ۶۰ (۲) ۹۰ (۳) ۱۲۰ (۴) ۱۸۰

(سراسری ۹۳)

۱۱۱۴- به چند طریق می‌توان ۶ عدد اسباب‌بازی متمایز را بین سه بچه با تعداد یکسان تقسیم کرد؟

- (۱) ۵۴ (۲) ۶۰ (۳) ۷۲ (۴) ۹۰

۱۱۱۵- در یک دوره بازی فوتبال بین ۸ تیم. بازی‌ها به صورت رفت و برگشت انجام می‌شود. اگر همه تیم‌ها با هم بازی داشته باشند در پایان دوره، چند بازی انجام خواهد شد؟

- (۱) ۵۶ (۲) ۲۸ (۳) ۳۸ (۴) ۴۶

۱۱۱۶- می‌خواهیم از بین ۴ کودک، ۵ نوجوان و ۷ جوان یک گروه سرود ۵ نفره تشکیل دهیم به چند حالت می‌توانیم این کار را انجام دهیم به شرط آن که حداقل ۳ نفر از آن‌ها نوجوان باشند؟

- (۱) ۱۰۸ (۲) ۱۲۰ (۳) ۵۶۰ (۴) ۶۰۶

۱۱۱۷- به چند طریق می‌توان از بین ۵ مرد و ۴ زن، ۶ نفر را انتخاب کرد به طوری که حداکثر ۳ زن انتخاب شوند؟

- (۱) ۲۰ (۲) ۳۰ (۳) ۵۰ (۴) ۷۴

(سراسری ۹۹)

۱۱۱۸- در یک اتومبیل معمولی، ۵ نفر به چند طریق می‌توانند بنشینند به طوری که ۳ نفر آن‌ها مجاز به رانندگی باشند؟

- (۱) ۶۰ (۲) ۷۲ (۳) ۷۵ (۴) ۸۴

۱۱۱۹- دور یک میز گرد، ۶ نفر به چند طریق می‌توانند قرار گیرند به طوری که ۲ فرد موردنظر از آنان، همواره کنار یکدیگر باشند؟

(فارج ۹۹)

- (۱) ۳۶ (۲) ۴۸ (۳) ۹۶ (۴) ۱۲۰

۱۱۲۰- به چند طریق می‌توان از بین ۸ سؤال یک امتحان به ۵ سؤال پاسخ داد به شرط آن که پاسخ به ۲ سؤال اول، اجباری باشد؟

- (۱) ۱۸ (۲) ۲۰ (۳) ۴۲ (۴) ۸۰

۱۱۲۱- مجموعه $A = \{7, 8, 9, 10, 11\}$ مفروض است. مجموعه A چند زیرمجموعه ۴ عضوی و شامل عدد ۹ دارد؟

- (۱) ۶ (۲) ۴ (۳) ۸ (۴) ۱۰

۱۱۲۲- تعداد زیرمجموعه‌های چهارعضوی مجموعه $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ به طوری که شامل g و فاقد عضو f باشند، کدام است؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۱۲ (۳) ۲۴ (۴) ۲۸

۱۱۲۳- از بین ۵ کارمند حسابدار و ۳ کارمند تولیدار به چند طریق می‌توان یک گروه ۳ نفره انتخاب کرد به طوری که رئیس گروه حسابدار باشد؟

- (۱) ۸۵ (۲) ۱۰۵ (۳) ۱۲۰ (۴) ۲۱۰

۱۱۲۴- چندتا از زیرمجموعه‌های ۴ عضوی مجموعه $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ حتماً شامل اعضای ۷ و ۶ هستند؟

- (۱) ۶ (۲) ۸ (۳) ۱۰ (۴) ۱۲

(سراسری ۸۲)

۱۱۲۵- یک مجموعه n عضوی، ۵۵ زیر مجموعه $(n-2)$ عضوی دارد. n کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) ۹ (۳) ۱۰ (۴) ۱۱

۱۱۲۶- اگر $P(n, 2) - C(n, 2) = 36$ باشد حاصل $C(n, 6)$ کدام است؟

- (۱) ۷۲ (۲) ۸۴ (۳) ۹۶ (۴) ۱۰۸

۱۱۲۷- مقدار $\frac{P(n, r)}{P(n+1, r+1)}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{n+1}$ (۲) $\frac{r}{n}$ (۳) $\frac{1}{(n+1)!}$ (۴) $\frac{r+1}{n+1}$

۱۱۲۸- اگر ${}^2C(n, 5) = 3P(n-1, 4)$ باشد، حاصل $!(n-176)$ کدام است؟

- (۱) ۶ (۲) ۲۴ (۳) ۱۲۰ (۴) ۷۲۰

(سراسری ۹۴)

۱۱۲۹- با حروف کلمه «RANGIN» چند کلمه رمز ۳ حرفی می‌توان ساخت؟

- (۱) ۶۰ (۲) ۷۲ (۳) ۸۴ (۴) ۱۲۰

۱۱۳۰- تعداد جایگشت‌های ۵ حرفی کلمه «MANSUR» که دو حرف M و N حتماً در آن‌ها وجود داشته باشد کدام است؟ (بدون تکرار حروف)

- (۱) ۴۸۰ (۲) ۳۶۰ (۳) ۲۰۰ (۴) ۱۱۲

۱۰۶۰- **گزینه ۲** این دانشجو هم می‌تواند درس عمومی بردارد و هم اختصاصی (به طور هم‌زمان) پس از اصل ضرب استفاده می‌کنیم و خواهیم داشت: $۱۲ = ۳ \times ۴ =$ تعداد کل انتخاب‌ها

۱۰۶۱- **گزینه ۲** در صورت مسئله از لفظ «یا» استفاده شده و تأکید شده که فقط یک خودکار یا یک مداد یا یک روان‌نویس می‌تواند انتخاب شود لذا از اصل جمع استفاده می‌کنیم: $۱۶ = ۳ + ۸ + ۵ =$ تعداد انتخاب‌ها

۱۰۶۲- **گزینه ۲** یک مشتری به طور هم‌زمان می‌تواند از بین هر نوع ویژگی خودرو، (رنگ، حجم موتور، گیربکس، داشبورد)، یکی را انتخاب کند، پس باید از اصل ضرب استفاده کنیم: $۸۴ = ۷ \times ۳ \times ۲ \times ۲ =$ تعداد انتخاب‌های مشتری

۱۰۶۳- **گزینه ۲** برای هر سکه ۲ حالت وجود دارد «رو» یا «پشت» پس برای ۳ سکه تعداد حالت‌ها برابر $۲^۳ = ۸$ می‌باشد. از طرفی در تاس، اعداد اول عبارت‌اند از ۲، ۳ و ۵ که تعداد آن‌ها ۳ تا است. لذا طبق اصل ضرب تعداد کل حالت‌ها برابر است با: $۲۴ = ۳ \times ۸ =$

۱۰۶۴- **گزینه ۲** تعداد سؤالات را x فرض می‌کنیم: تعداد سؤالات (۱+تعداد گزینه‌ها) = تعداد حالت‌های پاسخگویی

$$x^x = 18^x \Rightarrow 5^x = (5^3)^x \Rightarrow (4+1)^x = (125)^x \Rightarrow x = 18$$

۱۰۶۵- **گزینه ۳** سؤال داریم که هر سؤال ۲ گزینه دارد پس تعداد حالت‌های پاسخگویی به آن‌ها برابر است با: $۲^۳ = ۸$
 از طرفی به سؤال ۳ با ۴ گزینه به $۶۴ = ۴^۳$ حالت می‌توان جواب داد لذا نسبت خواسته شده برابر است با: $\frac{۱}{۶۴} = \frac{۱}{۸}$

۱۰۶۶- **گزینه ۲** برای هر سؤال ۵ انتخاب وجود دارد، انتخاب یکی از ۴ گزینه و یا حل نکردن سؤال، لذا چون $۲۸^۰$ سؤال داریم تعداد حالت‌ها برابر است با: $۵^{۲۸^۰}$.

۱۰۶۷- **گزینه ۲** در مسیر رفت باید ۳ عمل مختلف را پشت سرهم انجام دهیم یعنی اول از A به B برویم، بعد از B به C و در نهایت از C به D، پس طبق اصل ضرب تعداد حالت‌های هر عمل را در هم ضرب می‌کنیم. در مسیر برگشت هم باید ۳ عمل مختلف را انجام دهیم و از اصل ضرب استفاده می‌کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} \begin{array}{ccc} AB & BC & CD \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ 1 \times 2 \times 1 = 2 \end{array} \\ \begin{array}{ccc} DC & CB & BA \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ 1 \times 2 \times 1 = 2 \end{array} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{رفت و برگشت} = 2 \times 2 = 4$$

۱۰۶۸- **گزینه ۲** برای رفتن از A به D دو مسیر کلی وجود دارد یکی ABCD و دیگری AED:

$$\left. \begin{array}{l} \begin{array}{ccc} AB & BC & CD \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{مسیر ABCD} : 3 \times y \times 4 = 12y \end{array} \\ \begin{array}{ccc} \text{مسیر AED} : x \times 3 = 3x \\ \downarrow & \downarrow \\ AE & ED \end{array} \end{array} \right\}$$

اصل جمع $\rightarrow 3x + 12y = 24$
 حالا تمام جملات رابطه بالا را بر ۳ تقسیم می‌کنیم:

$$3x + 12y = 24 \xrightarrow{\div 3} x + 4y = 8$$

۱۰۵۹- **گزینه ۳** فقط باید یک کشور را از بین ۳ گروه موجود انتخاب کنیم پس متوجه می‌شویم که باید از اصل جمع استفاده کنیم:

$$۱۹ = ۱۰ + ۶ + ۳ =$$
 تعداد حالت‌ها

گزینه ۲ - ۱۰۶۹ در چهار عمل اصلی، نمی‌توانیم حاصل را بدون باز کردن فاکتوریل، به دست آوریم پس روابط (الف)، (ب) قطعاً نادرست هستند. همچنین دقت کنید که نمی‌توانیم از یک عددی که نماد فاکتوریل دارد و زیر رادیکال است بدون محاسبه جذر بگیریم؛ یعنی رابطه $\sqrt{9!} = 3!$ نادرست است. (بدون توجه به فاکتوریل، فقط از ۹ جذر گرفته شده) یعنی ابتدا باید حاصل ۹! را حساب کرد سپس از آن جذر گرفت. روابط (پ) و (ت) را اثبات می‌کنیم:

$$\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = \frac{(n+1)n(n-1)!}{(n-1)!} = (n+1)n = n^2 + n$$

$$\begin{cases} 0! = 1 \\ 1! = 1 \end{cases} \Rightarrow (0!)^2 = (1!)^2$$

قسمت (ج) هم درست است چون می‌دانیم در باز کردن یک عدد که فاکتوریل دارد هر جا متوقف شدیم باید علامت (!) بگذاریم.

گزینه ۲ - ۱۰۷۰ $(n+1)$ از $(n-1)$ بزرگ‌تر است، پس $(n+1)!$ را باز می‌کنیم تا به $(n-1)!$ برسیم:

$$\frac{(n-1)!}{(n+1)n(n-1)!} = \frac{1}{n(n+1)} \Rightarrow n(n+1) = 6 \Rightarrow n^2 + n - 6 = 0$$

$$\xrightarrow{\text{تجزیه می‌کنیم}} (n+3)(n-2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} n = -3 \text{ (غ ق)} \\ n = 2 \text{ (ق ق)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow (n+2)! = (2+2)! = 4! = 24$$

گزینه ۲ - ۱۰۷۱ $(x+2)$ بزرگ‌تر از $(x+1)$ است پس صورت کسر را باز می‌کنیم تا به مخرج برسیم:

$$\frac{(x+2)!}{(x+1)!} = 4 \Rightarrow \frac{(x+2)(x+1)!}{(x+1)!} = 4 \Rightarrow x+2 = 4$$

$$\Rightarrow x = 4 - 2 = 2$$

پس حاصل $2 \times 2 = 4$ برابر است با:

گزینه ۲ - ۱۰۷۲ می‌دانیم $0! = 1$ و $1! = 1$ پس از معادله $(x^2 - 4)! = 1$

$$x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \xrightarrow{\text{جذر}} x = \pm 2$$

$$x^2 - 4 = 1 \Rightarrow x^2 = 5 \xrightarrow{\text{جذر}} x = \pm \sqrt{5}$$

پس معادله مورد نظر، دارای ۴ جواب است.

گزینه ۱ - ۱۰۷۳ می‌دانیم حاصل ۴! برابر با ۲۴ می‌شود پس عبارت داخلی پرانتز باید ۴ شود:

$$x^2 - x + 1 = 4 \Rightarrow x^2 - x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = (-1)^2 - 4(1)(-3) = 1 + 12 = 13$$

دلته مثبت شده است پس معادله بالا ۲ ریشه حقیقی دارد. (نیاز به حل معادله نیست، چون فقط تعداد ریشه‌ها خواسته شده)

گزینه ۲ - ۱۰۷۴ باید با ارقام ۱، ۳، ۵، ۷ و ۹ اعداد سه‌رقمی بخش‌پذیر بر ۵ بسازیم.

فرض بر این است که تکرار ارقام مجاز است (در متن سؤال، محدودیتی ذکر نشده) پس خواهیم نوشت:

$$\Rightarrow \text{تعداد عددهای مطلوب} = 5 \times 5 \times 1 = 25$$

گزینه ۱ - ۱۰۷۵ شرط خاصی در متن سؤال ذکر نشده پس خانه‌ها را از چپ به راست پر می‌کنیم:

$$5 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 600 = \text{تعداد عددهای مطلوب}$$

دقت دارید که در اولین خانه سمت چپ، رقم صفر نمی‌تواند قرار بگیرد چون هیچ عددی با صفر شروع نمی‌شود ولی از صفر در خانه‌های بعدی می‌توان استفاده کرد.

گزینه ۲ - ۱۰۷۶ شرط اصلی در این مسئله، فرد بودن عدد است پس ابتدا اولین خانه سمت راست را پر می‌کنیم و سپس به اولین خانه سمت چپ می‌رویم و بپردازیم:

از چپ به راست ادامه می‌دهیم:

$$96 = 4 \times 4 \times 3 \times 2 = \text{تعداد عددهای خواسته شده} \Rightarrow$$

گزینه ۳ - ۱۰۷۷ چون صفر جزء رقم‌ها است و تکرار ارقام غیرمجاز است باید دو حالت جداگانه برای حل مسئله در نظر بگیریم یکی وقتی که یکان صفر باشد و دیگری وقتی که یکان رقم زوجی به جز صفر باشد:

حالت اول

$$\Rightarrow \text{تعداد عددها} = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

حالت دوم

$$\Rightarrow \text{تعداد عددها} = 4 \times 4 \times 3 \times 2 \times 2 = 192$$

$$\Rightarrow \text{تعداد کل اعداد مطلوب طبق اصل جمع} = 120 + 192 = 312$$

گزینه ۳ - ۱۰۷۸ صفر جزء رقم‌ها است ولی چون تکرار ارقام مجاز است نیازی نیست دو حالت جداگانه در نظر بگیریم، می‌دانیم عددی بر ۵ بخش‌پذیر است که یکان آن صفر یا ۵ باشد پس خواهیم نوشت:

$$\Rightarrow \text{تعداد عددهای مطلوب} = 4 \times 5 \times 5 \times 2 = 200$$

گزینه ۳ - ۱۰۷۹ از خانه‌ای شروع به بزرگ کردن می‌کنیم که محدودیت بیشتری دارد. چون قرار است عدد فرد باشد، پس محدودیت فقط برای رقم یکان است (یکان باید فرد باشد).

در این جا ترتیب پر شدن خانه‌ها به صورت مقابل است: یکان، ده‌ها، صدگان، دهگان، یکی از ارقام ۱ و ۷ باید در یکان باشد، پس یکان ۲ حالت دارد:

$$\frac{2}{یکان} \times \frac{5}{دهگان} \times \frac{5}{صدگان} \times \frac{5}{دهزارگان} \times \frac{2}{ده‌هزارگان}$$


حالا از ۵ عدد باقی‌مانده یکی را در ده‌هزارگان قرار می‌دهیم:

$$\frac{5}{یکان} \times \frac{4}{دهگان} \times \frac{3}{صدگان} \times \frac{2}{دهزارگان} \times \frac{2}{ده‌هزارگان}$$


رقم هزارگان ۴ حالت، رقم صدگان ۳ حالت و رقم دهگان ۲ حالت دارد:

$$\frac{5}{یکان} \times \frac{4}{دهگان} \times \frac{3}{صدگان} \times \frac{2}{دهزارگان} \times \frac{2}{ده‌هزارگان} = 240$$

۱۰۸۵- گزینه ۲ می‌توانیم از تمام ارقام ۰, ۱, ۲, ۳, ..., ۹ استفاده کنیم فقط صفر در اولین خانه سمت چپ نمی‌تواند قرار گیرد. \Rightarrow تعداد عددها = $9 \times 9 \times 8 = 648$



۱۰۸۶- گزینه ۱ باید از ارقام ۲, ۴, ۶, ۸ برای پر کردن خانه‌ها استفاده کنیم ضمناً تکرار ارقام مجاز است چون محدودیتی ذکر نشده است:



\Rightarrow تعداد عددها = $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^5 = (2^2)^5 = 2^{10} = 1024$

۱۰۸۷- گزینه ۲ در صورت سؤال، در مورد چندرقمی بودن عدد مطلوب چیزی گفته نشده، پس خودمان باید حالت‌های مناسب را در نظر بگیریم:


تعداد = ۴ \Rightarrow اعداد یکرقمی همگی کوچکتر از ۷, ۶, ۵, ۴ هستند.

تعداد = ۱۲ \Rightarrow اعداد دورقمی هم همگی کوچکتر از ۷۰۰ هستند.

تعداد = ۱۸ \Rightarrow اعداد سترقمی اگر بخواهند کوچکتر از ۷۰۰ باشند، نباید با ۷ شروع شوند.


تعداد = ۳۴ \Rightarrow طبق اصل جمع $4 + 12 + 18 = 34$

۱۰۸۸- گزینه ۲ با توجه به شرایط مسئله، پر کردن خانه‌ها را از چپ به راست انجام می‌دهیم:



توجه کنید که پس از پر کردن هر خانه، وقتی به سراغ خانه بعدی رفته‌ایم یک رقم دلخواه از خانه قبلی را خط زده‌ایم. مثلاً در خانه دوم از چپ، به دلخواه عدد ۸ را که در خانه اول از چپ استفاده شده خط زده‌ایم. شما به جای ۸ می‌توانید ۵ یا ۶ یا ۷ را خط بزنید هیچ فرقی ندارد.

۱۰۸۹- گزینه ۳ ابتدا باید خانه دهگان را پر کنیم چون شرط اصلی سؤال در مورد آن است سپس خانه سمت چپ و در نهایت خانه سمت راست را پر می‌کنیم:



\Rightarrow تعداد عددهای مطلوب = $8 \times 4 \times 8 = 256$



۱۰۹۰- گزینه ۱ ارقام فرد عبارتند از ۳, ۵, ۷, ۹ و چون می‌خواهیم همیشه کنار هم باشند آن‌ها را داخل یک بسته قرار می‌دهیم. پس خواهیم داشت:

تعداد جایگشت‌ها = $4! \times 3! = 24 \times 6 = 144$

یک شیء

۱۰۹۱- گزینه ۳ باید دو حالت جداگانه برای حل این سؤال در نظر بگیریم یکی وقتی که اولین خانه سمت چپ ۳ باشد و دیگری وقتی اولین خانه سمت چپ ۴ یا ۵ باشد.

۱۰۸۰- گزینه ۱ صفر جزء رقم‌ها است و تکرار ارقام، غیرمجاز است پس باید دو حالت جداگانه برای حل در نظر بگیریم یکی حالتی است که یکان صفر باشد و دیگری حالتی است که یکان ۵ باشد:



۱۰۸۱- گزینه ۱ می‌خواهیم عدد موردنظر کوچکتر از ۴۰۰ باشد پس اولین رقم سمت چپ، نمی‌تواند ۴ یا ۷ یا ۹ باشد زیرا اعداد حاصل، بزرگتر از ۴۰۰ می‌شوند پس اولین رقم سمت چپ، فقط می‌تواند ۲ باشد (یعنی عدد حاصل می‌شه دو رقمی و فردی) پس نحوه پر کردن خانه‌ها از چپ به راست و به شکل مقابل است:

تعداد عددها = $1 \times 4 \times 3 = 12$

۱۰۸۲- گزینه ۳ یکان عددی که بر ۵ بخش پذیرند، صفر یا ۵ است. تعداد آن‌ها را در دو حالت حساب و با هم جمع می‌کنیم. در هر دو حالت زیر، ترتیب پر کردن خانه‌ها به صورت زیر است:

یکان، هزارگان، صدگان، دهگان


یکان = 1 دهگان = 3 صدگان = 4 هزارگان = 5

یکان می‌تواند باشد ۵ و نمی‌تواند باشد ۰



یکان = 1 دهگان = 3 صدگان = 4 هزارگان = 5

پس در کل $48 + 60 = 108$ عدد با این ویژگی می‌توان نوشت.


۱۰۸۳- گزینه ۲ ارقام ۰, ۱, ۲, ۳, ..., ۹ را در نظر می‌گیریم، تکرار ارقام مجاز است پس مسئله فقط با یک حالت حل می‌شود:





۱۰۸۴- گزینه ۱ ارقام ۰, ۱, ۲, ۳, ..., ۹ را در نظر می‌گیریم. چون تکرار ارقام غیرمجاز است و در بین رقم‌ها صفر نیز وجود دارد باید دو حالت جداگانه برای اعداد مضرب ۵ در نظر بگیریم:




حالت اول



حالت دوم




کلماتی که با حروف بی صدا شروع می شوند:



تعداد کل کلمات مطلوب = $36 + 36 = 72$

۱۰۹۸- گزینه ۳ روش اول ترتیب انتخاب افراد مهم است پس از فرمول $n!$ استفاده می کنیم. $n! = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ تعداد حالتها




۱۰۹۹- گزینه ۲ چون کلمه «تمساح» فارسی است بهتر است خانهها را از راست به چپ پُر کنیم:




تعداد کلمات مطلوب = $1 \times 1 \times 2 \times 3 \times 1 = 6$

۱۱۰۰- گزینه ۲ ابتدا فرض می کنیم حرف h در اولین جایگاه سمت چپ قرار داشته باشد، ضمناً تکرار حروف غیرمجاز است؛ لذا خواهیم داشت:




ولی حرف h در جایگاههای دیگر هم می تواند قرار گیرد؛ یعنی h می تواند در هر ۴ خانه قرار گیرد، پس داریم: $24 \times 4 = 96$ تعداد کل کلمات مطلوب

۱۱۰۱- گزینه ۱ حرفهای D را کنار هم و حرفهای A را نیز کنار هم قرار می دهیم و آنها را داخل بستههایی قرار می دهیم سپس هر بسته را ۱ شیء در نظر می گیریم:




توجه کنید که دیگر داخل بستهها را نمی شماریم چون حروف داخل بسته، یکسان هستند و جابه جایی آنها با هم کلمه جدیدی ایجاد نمی کند.

۱۱۰۲- گزینه ۲ به جای ستارهها، خانه رسم می کنیم اولین رقم سمت چپ باید فرد باشد (۱, ۳, ۵, ۷, ۹) ولی اولین رقم سمت راست باید زوج باشد (۲, ۴, ۶, ۸) بقیه خانهها




تعداد کلمات = $5 \times 9 \times 9 \times 9 \times 4 = 14580$

۱۰۹۲- گزینه ۱ عددی بر ۱۰ بخش پذیر است که یکان آن صفر باشد از طرفی عدد موردنظر باید از ۴۰۰ بزرگتر باشد پس صدگان آن باید ۴ به بالا باشد، لذا خواهیم نوشت:




تعداد عددهای مطلوب = $3 \times 3 \times 1 = 9$

۱۰۹۳- گزینه ۱ ارقام فرد طبیعی یکرقمی عبارتند از ۱, ۳, ۵, ۷, ۹ ضمناً اولین خانه سمت چپ فقط می تواند ۷ یا ۹ باشد، پس خواهیم داشت:




تعداد عددهای مطلوب = $2 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 = 12$

۱۰۹۴- گزینه ۱ برای آن که عدد مطلوب بین ۳۰۰۰ و ۶۰۰۰ باشد، رقم یکان هزار آن فقط می تواند ۳ یا ۴ یا ۵ باشد؛ لذا به شکل زیر عمل می کنیم:



جواب = $3 \times 5 \times 4 \times 3 = 180$


۱۰۹۵- گزینه ۲ اولاً یکان عدد باید از بین ارقام ۱, ۳, ۵, ۷, ۹ انتخاب شود تا عدد، فرد محسوب شود. ثانیاً در رقم یکان هزار، باید از ارقام ۲, ۴, ۶, ۸ استفاده کنیم. برای دهگان و صدگان محدودیتی ذکر نشده، پس می توانند از بین ارقام صفر تا ۹ انتخاب شوند (توجه کنید که تکرار ارقام مجاز است؛ چون در متن سؤال، چیزی در این مورد گفته نشده است).



جواب = $4 \times 10 \times 10 \times 5 = 2000$

۱۰۹۶- گزینه ۲ رقمهای ۵ و ۶ را چسبیده به هم فرض می کنیم. حال

ممکن است ۵ و ۶ در رقمهای اول و دوم یا دوم و سوم یا سوم و چهارم به کار روند. فقط کافی است جواب یک حالت را به دست آورده و در عدد ۳ ضرب کنیم (چون ۳ حالت داریم):



تعداد عددها = $2 \times 1 \times 4 \times 3 = 24$

تعداد کل عددهای مطلوب = $24 \times 3 = 72$

۱۰۹۷- گزینه ۲ تعداد حروف صدادار = $3 \leftarrow (u, a, e)$



تعداد حروف بی صدا = $3 \leftarrow (s, r, z)$

دو حالت خواهیم داشت:

کلماتی که با حروف صدادار شروع می شوند:

۱۱۰۳- گزینه ۳ عبارت «دلبر» را یک بسته فرض می‌کنیم و حواسمان هست که حروف موجود در «دلبر» نمی‌توانند با هم جابه‌جا شوند، پس خواهیم داشت: $4! = 24$ = تعداد کلمات مطلوب \Rightarrow «دلبر» آن ه ۱ شیء

۱۱۰۴- گزینه ۴ حالت ۲ وجود دارد. کلماتی که با S شروع می‌شوند و کلماتی که با S شروع نمی‌شوند:




۱۱۰۵- گزینه ۲ ابتدا باید جایگاه دو حرف S را در کلمات مختلفی که

ساخته می‌شود مشخص کنیم:

۱	S	۴	S	۳	۲	۱
۲	۴	S	۳	S	۲	۱
۳	۴	۳	S	۲	S	۱
۴	۴	۳	۲	S	۱	S

پس Sها چهار حالت مختلف خواهند داشت و جواب نهایی برابر می‌شود با: $4 \times 4! = 96$ = تعداد کل کلمات مطلوب \Rightarrow

۱۱۰۶- گزینه ۱ ابتدا فرض می‌کنیم اولین حرف سمت چپ، حرف S باشد:



ولی S می‌تواند در خانه‌های دیگر هم باشد پس در کل S می‌تواند در هر یک از ۴ خانه قرار گیرد لذا جواب به دست آمده را در عدد ۴ ضرب می‌کنیم: $60 \times 4 = 240$ = تعداد کل کلمات خواسته شده

۱۱۰۷- گزینه ۴ ابتدا تعداد کل کلمات ۷ حرفی که با حروف داده شده


می‌توان ساخت به دست می‌آوریم: $7! = 5040$ = تعداد کل کلمات حالا تعداد کلماتی را می‌بایم که در آن‌ها «س» و «ب» کنار هم باشند:

$6! \times 2! = 720 \times 2 = 1440$ = تعداد کلمات \Rightarrow هم رخ و س ب \downarrow اشیء

اگر جواب‌های دو حالت بالا را از هم کم کنیم، تعداد کلماتی به دست می‌آید که در آن‌ها «س» و «ب» کنار هم نیستند (در واقع از روش متمم‌گیری استفاده کرده‌ایم). $5040 - 1440 = 3600$ = تعداد کلمات مطلوب

۱۱۰۸- گزینه ۱ حروف بدون نقطه عبارتند از: م، ل، ک، ر، و.

ولی توجه کنید که حرف آخر باید «ر» باشد. هم‌چنین می‌دانید «ی» هر جای کلمه (به جز آخر کلمه) استفاده شود، نقطه‌دار خواهد بود؛ پس «ی» کلاً حذف می‌شود. حرف «پ» هم که نقطه‌دار است و کنار می‌رود. لذا داریم:




۱۱۰۹- گزینه ۳ $C(n,0) = \frac{n!}{(n-0)! \times 0!} = \frac{n!}{n!} = 1$

۱۱۱۰- گزینه ۲ $C(n,1) = \frac{n!}{(n-1)! \times 1!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n$

۱۱۱۱- گزینه ۳ $P(n, n-1) = \frac{n!}{(n-(n-1))!} = \frac{n!}{1!} = \frac{n!}{n!} = 1$

۱۱۱۲- گزینه ۴ $P(n,0) = \frac{n!}{(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$

۱۱۱۰- گزینه ۱ چون گفته شده این سه نفر باید در سه مورد متمایز



۱۱۱۱- گزینه ۳ باید از فرمول ترکیب استفاده کنیم چون پس از انتخاب

کتاب‌ها، جابه‌جایی آن‌ها مهم نیست:

تعداد حالت‌ها $= \binom{10}{2} \times \binom{8}{3} = \frac{10!}{2! \times 8!} \times \frac{8!}{3! \times 5!} = \frac{10!}{2! \times 3! \times 5!} = 120$

۱۱۱۲- گزینه ۲ وقتی ۳ مهره را انتخاب کنیم دیگر جابه‌جایی آن‌ها با هم

اهمیتی ندارد یعنی ترتیب در این مسئله مهم نیست لذا از فرمول ترکیب بهره می‌گیریم، تعداد کل مهره‌ها برابر $4 + 6 = 10$ تا است پس در واقع می‌خواهیم ۳ مهره را از بین ۱۰ مهره انتخاب کنیم:

تعداد حالت‌ها $= \binom{10}{3} = \frac{10!}{3! \times 7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$

۱۱۱۳- گزینه ۳ با هر ۳ نقطه که روی محیط یک دایره باشند یک مثلث

ساخته می‌شود از طرفی مثلثی مثل ABC فرقی با BAC و CAB ندارد؛ یعنی جابه‌جایی سه رأس یک مثلث با هم، مثلث جدیدی ایجاد نمی‌کند پس باید از ترکیب استفاده کنیم:

تعداد مثلث‌ها $= \binom{10}{3} = \frac{10!}{3! \times 7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$

۱۱۱۴- گزینه ۴ ترتیب پخش اسباب‌بازی بین بچه‌ها مهم نیست؛ پس از

ترکیب استفاده می‌کنیم. به بچه اول ۲ اسباب‌بازی از بین ۶ اسباب‌بازی می‌دهیم که تعداد حالت‌های این کار $\binom{6}{2}$ است. حالا به سراغ بچه دوم می‌رویم. الان باید از بین ۴ اسباب‌بازی ۲ تا را انتخاب کنیم که به $\binom{4}{2}$ طریق امکان‌پذیر است. در نهایت ۲ اسباب‌بازی باقی ماند که باید به بچه سوم داده شود؛ یعنی به $\binom{2}{1}$ حالت این کار هم انجام می‌شود. لذا طبق اصل ضرب خواهیم داشت:

تعداد حالت‌ها $= \binom{6}{2} \times \binom{4}{2} \times \binom{2}{1} = 15 \times 6 \times 1 = 90$

۱۱۱۵- **گزینه ۱** تعداد حالت‌هایی که دو تیم را از بین ۸ تیم برای بازی رفت

با هم می‌توان انتخاب کرد عبارت‌اند از:

$$\binom{8}{2} = \frac{8!}{6! \times 2!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{6! \times 2} = 28$$

پس ۲۸ بازی در مرحله رفت انجام می‌شود. از طرفی می‌دانیم تعداد بازی‌ها در مرحله برگشت با مرحله رفت مساوی است پس در مرحله برگشت هم ۲۸ بازی انجام می‌شود و در کل $28 + 28 = 56$ بازی صورت می‌گیرد.

۱۱۱۶- **گزینه ۲** باید از فرمول ترکیب استفاده کنیم چون بعد از انتخاب افراد

موردنظر، جابه‌جایی آن‌ها با هم هیچ تأثیری ندارد و گروه جدیدی ایجاد نمی‌کند:

انتخاب ۲ نفر از ۱۱ کودک و جوان بین ۵ نوجوان
انتخاب ۳ نفر از ۵ نوجوان = $\binom{11}{2} \times \binom{5}{3}$

انتخاب ۵ نفر از ۱۱ کودک و جوان بین ۵ نوجوان
انتخاب ۴ نفر از ۵ نوجوان = $\binom{11}{5} + \binom{5}{4}$

$$= \frac{5!}{2! \times 3!} \times \frac{11!}{9! \times 2!} + 5 \times 11 + 1$$

$$= \frac{5 \times 4 \times 3!}{2 \times 3!} \times \frac{11 \times 10 \times 9!}{9! \times 2} + 55 + 1 = 10 \times 55 + 55 + 1 = 606$$

۱۱۱۷- **گزینه ۲** پس از این‌که این ۶ نفر را انتخاب کنیم، جابه‌جایی آن‌ها با

هم، گروه جدیدی ایجاد نمی‌کند. پس از فرمول ترکیب استفاده می‌کنیم. حداکثر ۳ زن، یعنی ۳ زن یا ۲ زن یا ۱ زن یا هیچ زن. ولی اگر هیچ زنی انتخاب نشود، باید هر ۶ نفر مرد باشند که غیرممکن است (چون کلاً ۵ مرد وجود دارد).

۵ مرد و ۱ زن یا ۴ مرد و ۲ زن یا ۳ مرد و ۳ زن

تعداد حالت‌ها = $\binom{4}{3} \times \binom{5}{3} + \binom{4}{2} \times \binom{5}{2} + \binom{4}{1} \times \binom{5}{1}$

$$= (4 \times 10) + (6 \times 5) + (4 \times 1) = 74$$

۱۱۱۸- **گزینه ۲** ابتدا باید راننده را از بین ۳ نفر که مجاز به رانندگی

هستند، انتخاب کنیم:

$$= \binom{3}{1} = 3$$

اکنون ۴ نفر دیگر باید به ۴! طریق کنار هم بنشینند، لذا طبق اصل ضرب داریم: $3 \times 4! = 3 \times 24 = 72$ تعداد کل حالت‌ها

۱۱۱۹- **گزینه ۲**

نکته تستی تعداد جایگشت‌های n شخص، دور یک میز دایره‌ای برابر با (n-1)! است؛ چون مکان نشستن نفر اول مهم نیست.

دو نفری که قرار است کنار هم قرار بگیرند (مثلاً A و B) را در یک بسته قرار می‌دهیم:

A, B, C, D, E, F

۱ شیء

پس می‌توان فرض کرد ۵ نفر داریم که می‌خواهیم آن‌ها را دور یک میز گرد قرار دهیم. این کار به (5-1)!, یعنی ۴! حالت امکان‌پذیر است. ولی خود A و B هم می‌توانند به ۲! طریق با هم جابه‌جا شوند؛ لذا طبق اصل ضرب داریم: $2! \times 4! = 2 \times 24 = 48$ تعداد کل حالت‌ها

۱۱۲۰- **گزینه ۲** دو انتخاب اجباری وجود دارد، پس خواهیم داشت:

$$= \binom{8-2}{5-2} = \binom{6}{3} = \frac{6!}{3! \times 3!} = 20$$

۱۱۲۱- **گزینه ۲** با یک انتخاب اجباری مواجه‌ایم چون می‌خواهیم عدد ۹

حتماً انتخاب شود لذا خواهیم داشت:

$$= \binom{5-1}{4-1} = \binom{4}{3} = 4$$

در درس‌نامه گفتیم که: $\binom{n}{n-1} = n$ مثلاً: $\binom{9}{8} = 9$ و $\binom{11}{10} = 11$

۱۱۲۲- **گزینه ۱** عضو f را از مجموعه A کنار می‌گذاریم که در این صورت

۶ عضو باقی می‌ماند عضو g قبلاً انتخاب شده، پس باید از بین ۵ عضو باقی‌مانده ۳ عضو انتخاب کنیم:

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2} = 10$$

۱۱۲۳- **گزینه ۲** رئیس گروه باید حسابدار باشد، پس باید از بین ۵

حسابدار انتخاب شود که تعداد حالت‌های آن $\binom{5}{1}$ می‌باشد، پس از انتخاب رئیس گروه، ۲ نفر بعدی را می‌توانیم از بین ۷ نفر (۴ حسابدار باقی‌مانده و

۳ تحویلدار) انتخاب کنیم، که تعداد حالت‌های آن $\binom{7}{2}$ است. طبق اصل ضرب خواهیم داشت:

$$= \binom{5}{1} \times \binom{7}{2} = \frac{5!}{4! \times 1!} \times \frac{7!}{5! \times 2!} = 5 \times 21 = 105$$

۱۱۲۴- **گزینه ۳** با یک انتخاب اجباری مواجه‌ایم؛ یعنی از ۴ عضوی که

می‌خواهیم انتخاب کنیم، ۲ تا قبلاً انتخاب شده‌اند (اعضای ۶ و ۷)، پس حالا باید ۲ عضو باقی‌مانده را از بین اعضای {۱, ۲, ۳, ۴, ۵} انتخاب کنیم:

$$= \binom{5}{2} = \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2} = 10$$

۱۱۲۵- **گزینه ۲** می‌دانیم تعداد زیرمجموعه‌های ۲ عضوی از یک مجموعه

n عضوی برابر با $\binom{n}{r}$ است، پس با توجه به اطلاعات مسئله خواهیم داشت:

$$\binom{n}{n-2} = 55 \xrightarrow{\text{امتحان کردن اعداد گزینه‌ها}} n = 11$$

فقط اگر n = 11 باشد، حاصل $\binom{n}{n-2}$ برابر ۵۵ می‌شود، زیرا:

$$\binom{n}{n-2} = \binom{11}{11-2} = \binom{11}{9} = \frac{11!}{2! \times 9!} = \frac{11 \times 10 \times 9!}{2 \times 9!} = 55$$

۱۱۲۶- **گزینه ۲** الان مجبوریم معادله داده شده را حل کنیم، چون مقدار

n خواسته نشده که از گزینه‌ها استفاده کنیم:

$$P(n, 2) - C(n, 2) = 36 \Rightarrow \frac{n!}{(n-2)!} - \frac{n!}{(n-2)! \times 2!} = 36$$

$$\Rightarrow \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!} - \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)! \times 2!} = 36$$

$$\Rightarrow \frac{n(n-1)}{1} - \frac{n(n-1)}{2} = 36$$


ضرب دو طرف در ۲

$$\Rightarrow 2n(n-1) - n(n-1) = 72$$

جواب خواهیم رسید:

$$\Delta! \times \binom{4}{3} = 120 \times 4 = 480$$

۱۱۳۱- گزینه ۳ باید ۳ حالت مختلف در نظر بگیریم:



۲ حرف S دو بار تکرار شود:

حروف E, R, H, T

$$= \binom{4}{1} \times \frac{3!}{2!} = 4 \times 3 = 12$$

تعداد کلمات

۳ حرف E دو بار تکرار شود:

حروف S, R, H, T

$$= \binom{4}{1} \times \frac{3!}{2!} = 12$$

تعداد کلمات

$$\Rightarrow \text{تعداد کل کلمات مطلوب} = 60 + 12 + 12 = 84$$

۱۱۳۲- گزینه ۳ حرف S انتخاب شده‌اند، پس ۲ حرف دیگر از بین

حروف E, I, N, U, B انتخاب می‌شوند، لذا خواهیم داشت:

$$\text{تعداد کلمات مطلوب} = \binom{5}{2} \times \frac{5!}{3!} = 10 \times 5 \times 4 = 200$$

شاید بپرسید کسر $\frac{5!}{3!}$ از کجا آمده؟ جواب این است که می‌خواهیم کلمات ۵ حرفی بسازیم پس تعداد آن‌ها برابر ۵! است ولی ۳ حرف تکراری وجود داد (حرف S سه بار تکرار شده) پس باید ۵! را بر ۳! تقسیم کنیم.

۱۱۳۳- گزینه ۲ می‌دانید که جمع دو عدد وقتی فرد است که یکی از

آن‌ها زوج و دیگری فرد باشد. ضمناً از ۱ تا ۲۰ تعداد اعداد فرد برابر ۱۰ و تعداد اعداد زوج هم برابر ۱۰ می‌باشد، لذا:

زوج فرد

$$\text{تعداد حالت‌ها} = \binom{10}{1} \times \binom{10}{1} = 10 \times 10 = 100$$

۱۱۳۴- گزینه ۴ می‌دانیم هر مثلث با داشتن ۳ رأس و هر چهار ضلعی با

داشتن ۴ رأس آن ساخته می‌شود، لذا داریم:

مثلث زیر وتر مثلث بالای وتر

$$\text{تعداد مثلث‌ها و چهارضلعی‌ها} = \binom{7}{3} \binom{5}{4} + \binom{5}{3} \binom{7}{4} = 35 \times 5 + 10 \times 35 = 525$$

چهارضلعی بالای وتر چهارضلعی زیر وتر

۱۱۳۵- گزینه ۳ ابتدا باید ۳ مدرسه از ۵ مدرسه را انتخاب کنیم. چون

ترتیب انتخاب‌ها مهم نیست، از فرمول ترکیب استفاده می‌کنیم. لذا تعداد

حالت‌های این مرحله برابر $\binom{5}{3}$ است. حال باید از هر یک از مدارس انتخاب‌شده، فقط ۱ نفر را انتخاب کنیم که برابر می‌شود با $\binom{4}{1} \times \binom{4}{1} \times \binom{4}{1}$

پس طبق اصل ضرب خواهیم داشت:

$$\text{تعداد انتخاب‌ها} = \binom{5}{3} \times \binom{4}{1} \times \binom{4}{1} \times \binom{4}{1} = 10 \times 4 \times 4 \times 4 = 640$$

انتخاب مدارس انتخاب دانش‌آموزان

$$\Rightarrow \underbrace{n^2 - n - 72 = 0}_{\text{تجزیه می‌کنیم}} \Rightarrow (n-9)(n+8) = 0 \Rightarrow \begin{cases} n=9 \text{ (ق ق)} \\ n=-8 \text{ (غ ق)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow C(n, 6) = C(9, 6) = \frac{9!}{3! \times 6!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6!}{3 \times 2 \times 1 \times 6!} = 84$$

۱۱۳۷- گزینه ۱ روش اول حل معمولی:

$$\frac{P(n, r)}{P(n+1, r+1)} = \frac{\frac{n!}{(n-r)!}}{\frac{(n+1)!}{((n+1)-(r+1))!}} = \frac{\frac{n!}{(n-r)!}}{\frac{(n+1)!}{(n-r)!}}$$

$$= \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{n!}{(n+1) \times n!} = \frac{1}{n+1}$$

یک مرحله
بازش می‌کنیم

روش دوم عددگذاری: n و r را دو عدد طبیعی دلخواه فرض می‌کنیم ولی

توجه کنید که r کوچک‌تر از n باشد، مثلاً r را ۲ و n را ۳ فرض می‌کنیم:

$$\frac{P(n, r)}{P(n+1, r+1)} = \frac{P(3, 2) \frac{2!}{1!}}{P(4, 3) \frac{3!}{1!}} = \frac{3!}{4!} = \frac{3!}{4 \times 3!} = \frac{1}{4}$$

حالا در گزینه‌ها نیز عددگذاری را انجام می‌دهیم تا به جواب $\frac{1}{4}$ برسیم:

۱ همین گزینه درست است.

$$\frac{1}{n+1} = \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}$$

۱۱۳۸- گزینه ۲ می‌دانیم که:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} \text{ و } C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

حالا به کمک دو فرمول بالا عبارت‌های داده‌شده در متن معادله را باز می‌کنیم:

$${}^2C(n, 5) = {}^2P(n-1, 4) \Rightarrow 2 \times \frac{n!}{(n-5)! 5!} = 3 \times \frac{(n-1)!}{(n-1-4)! 4!}$$

$$\Rightarrow \frac{2(n)(n-1)!}{(n-5)! 5!} = \frac{3(n-1)!}{(n-5)! 4!} \Rightarrow \frac{2n}{5!} = 3$$

$$\Rightarrow 2n = 3 \times 5! \Rightarrow 2n = 3 \times 120 \Rightarrow n = \frac{3 \times 120}{2} = 180$$

$$\Rightarrow (n-176)! = (180-176)! = 4! = 24$$

۱۱۳۹- گزینه ۲ دو حالت خواهیم داشت:

۱ کلماتی که سه حرف آن‌ها متمایزند که تعدادشان برابر است با:

R, A, N, G, I

$$\Rightarrow 60$$

۲ کلماتی که شامل ۲ حرف N هستند در این صورت ۱ حرف دیگر از

بین ۴ حرف R, A, G, I انتخاب می‌شود. تعداد این کلمات برابر است با:

$$\binom{4}{1} \times \frac{3!}{2!} = 4 \times 3 = 12 \Rightarrow \text{تعداد کل کلمات مطلوب} = 60 + 12 = 72$$

۱۱۳۰- گزینه ۱ دو حرف M و N به همراه ۳ حرف دیگر، کلمات ۵ حرفی

تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها برابر ۵! است. از طرفی ۳ حرفی که در مورد

آن‌ها صحبت شد باید از بین ۴ حرف انتخاب شوند (S, A, U و R) که

این کار به $\binom{4}{3}$ حالت مختلف انجام می‌گیرد. در نهایت طبق اصل ضرب به