



مشاوره تحصیلی هپوا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ثبت نام مدارس ، برنامه ریزی درسی و آمادگی
برای امتحانات مدارس

برای ورود به صفحه مشاوره مدارس کلیک کنید

برای ورود به صفحه نمونه سوالات امتحانی کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی مدارس

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹

تماس از تلفن ثابت



جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

معاونت دانش پژوهان جوان

مبارزه علمی برای جوانان، زنده کردن روح جست و جو و کشف واقعیت هاست. «امام خمینی (ره)»



مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان
و دانش پژوهان جوان

اینجانب (شرکت کننده) این دفترچه را به صورت کامل (۲۴ برگه با احتساب جلد) دریافت نمودم امضاء

اینجانب (منشی حوزه) تعداد برگه (با احتساب جلد) دریافت نمودم امضاء

چهاردهمین دوره المپیاد نجوم و اختر فیزیک

تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۱۴ - ساعت: ۱۴:۰۰ مدت: ۲۴۰ دقیقه

نام و نام خانوادگی :

استان:

شماره پرونده:

منطقه:

کد ملی:

پایه تحصیلی:

نام پدر:

شماره صندلی

نام مدرس:

حوزه:

توضیحات مهم

استفاده از هر نوع ماشین حساب مجاز است

- ۱- این پاسخ نامه به صورت نیمه کامپیوتراست تصحیح می شود، بنابراین از مقاله و کثیف کردن آن جداً خودداری نمایید.
- ۲- مشخصات خود را با اطلاعات بالای هر صفحه تطبیق دهید. در صورتی که حتی یکی از صفحات پاسخ نامه با مشخصات شما همخوانی ندارد، بلافضلله مراقبین را مطلع نمایید.
- ۳- پاسخ هر سوال را در محل تعیین شده خود بنویسید. چنانچه همه یا قسمتی از جواب سوال را در محل پاسخ سوال دیگری بنویسید، به شما نمره ای تعلق نمی گیرد.
- ۴- با توجه به آنکه برگه های پاسخ نامه به نام شما صادر شده است، امکان ارائه هیچگونه برگه اضافه وجود نخواهد داشت. لذا توصیه می شود ابتدا سوالات را در برگه چرک نویس، حل کرده و آنگاه در پاسخنامه پاکنویس نمایید.
- ۵- عملیات تصحیح توسط مصححین، پس از قطع سربرگ، به صورت ناشناس انجام خواهد شد. لذا از درج هرگونه نوشته یا علامت مشخصه که نشان دهنده صاحب برگه باشد، خودداری نمایید. در غیر این صورت تقلب محسوب شده و در هر مرحله ای که باشد از ادامه حضور در المپیاد محروم خواهد شد.
- ۶- از مخدوش کردن دایره ها در چهار گوشه صفحه و بارکدها خودداری کنید، در غیر این صورت برگه شما تصحیح نخواهد شد.
- ۷- همراه داشتن هرگونه کتاب، جزو، یادداشت و لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه، ساعت هوشمند و لپ تاپ منوع است. همراه داشتن این قبیل وسایل حتی اگر از آن استفاده نکنید یا خاموش باشد، تقلب محسوب خواهد شد.
- ۸- شرکت کنندگان در دوره تابستان از بین دانش آموزان پایه دهم و یازدهم انتخاب می شوند.
- ۹- علاوه بر نوشتن پاسخ تشریحی در دفترچه آزمون، وارد کردن پاسخ های نهایی در پاسخ برگ ارائه شده (صفحه ۱ الی ۶) الزامی است. در صورت عدم انتقال پاسخ های نهایی به پاسخ برگ، برگ شما تصحیح نخواهد شد.


هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

6.67×10^{-11}	$N m^r kg^{-2}$	ثابت جهانی گرانش	G
5.67×10^{-8}	$W m^{-2} K^{-4}$	ثابت استفان-بولتزمن	σ
7.56×10^{-16}	$J m^{-2} K^{-4}$	ثابت تابش	$a = \epsilon \sigma/c$
1.38×10^{-23}	$J K^{-1}$	ثابت بولتزمن	k_B
6.63×10^{-34}	$J.s$	ثابت پلانک	h
۳۶۵.۲۵	day	سال	year
9.1×10^{-31}	kg	جرم الکترون	m_e
1.67×10^{-27}	kg	جرم اتم هیدروژن	m_H
3.00×10^8	m/s	سرعت نور	c
3.09×10^{16}	m	پارسک	pc
1.50×10^{11}	m	واحد نجومی	$r_{earth}=AU$
9.46×10^{15}	m	سال نوری	Ly
6.96×10^8	m	شعاع خورشید	R_{sun}
1.99×10^{30}	kg	جرم خورشید	M_{sun}
6.38×10^6	m	شعاع زمین	R_{earth}
5.97×10^{24}	kg	جرم زمین	M_{earth}
۵۰	AU	شعاع منظومه شمسی	$R_{solars\ sys}$
.۱۰۸		ضریب کارایی چشم انسان	ε
۵۰	kpc	فاصله‌ی ابر مازلاني بزرگ	R_{LMC}
۶۰	kpc	فاصله‌ی ابر مازلاني کوچک	R_{SMC}
.۰۰۷		ضریب بازتاب سطح ماه	A_{moon}
1.60×10^{-19}	J	الکترون ولت	eV
۴	Gpc	ابعاد کیهان	D_{cosmos}
۱۳۶	eV	انرژی حالت پایه اتم هیدروژن	$E.$
۶۸	(km/s)/Mpc	ثابت هابل	$H.$
1.37×10^3	Wm^{-2}	ثابت خورشیدی	f_{sun}
3.85×10^{26}	W	درخشندگی خورشید	L_{sun}
۴۷۲		قدر مطلق خورشید	M_{sun}
-۲۶.۷		قدر ظاهری خورشید	m_{sum}
۲۳/۴۵	Degree	زاویه تمایل محور دوران زمین	
۶۵		حد قدری چشم انسان	
۶	mm	قطر مردمک چشم انسان	D_{pupil}
۱۵۹	ltr	حجم یک بشکه	$Barrel$
5.0×10^{-3}	kg/m^3	چگالی متوسط زمین	ρ_{earth}
1.60×10^{-19}	C	بار الکترون	e

نام :


نام خانوادگی :

کد ملی :



علاوه بر نوشتن پاسخ تشریحی در دفترچه آزمون وارد کردن پاسخ‌های نهایی در پاسخ‌برگ ارائه شده (صفحه ۱ الی ۶) الزامی است. در صورت عدم انتقال پاسخ‌های نهایی به پاسخ‌برگ، برگه شما تصحیح نخواهد شد.

۱ - سوال اول:



۲ - سوال دوم :


الف) L_1, L_2, L_3		
الف) L_4, L_5		
ب) نسبت به فاصله زمین تا خورشید:		ب) فاصله بر حسب متر:

$L_1:$	(ج)
$L_2:$	(ج)
$L_3:$	(ج)

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



۳- سوال سوم:

(الف)
$m =$
$L_{\text{star}} / L_{\text{sun}} =$
$M_{\text{star}} / M_{\text{sun}} =$

۴- سوال چهارم:


الف) واحد اندازه‌گیری α در دستگاه SI
$[\alpha] =$
ب) بیشترین طول موج
$\lambda =$
ج) شعاع ابر $H \parallel$
$R_{H \parallel} =$

ردۀ طیفی ستاره مرکزی	$N (s^{-1})$	$R_{H \parallel} (pc)$	فاصله (pc)
O Δ V	3×10^{49}	(د)	(ه)
B \cdot V	4×10^{46}		
G Σ V	1×10^{39}		

نام:


نام خانوادگی:

کد ملی:




۵- سوال پنجم:

(الف) کمترین طول سایه



(الف) بیشترین طول سایه



ج) میل خورشید

$a =$

ب) عرض جغرافیایی ناظر

$\Phi =$

د) طول سایه:


$L =$

(د)

نام:

نام خانوادگی:

کد ملی:



۶- سوال ششم:

(الف)

$$R_{hm} / R_{hl} =$$

ب) رابطه:

$$R_{hm} / R_{hl} =$$

ب) مقدار:

$$R_{hm} / R_{hl} =$$

ج) توجیه نتایج بالا در ۳ سطر

۷- سوال هفتم:

رابطه

$$r =$$


مقدار

$$r =$$

نام :


نام خانوادگی :

کد ملی :



۸- سوال هشتم:


$E_{\text{tot}} =$	(الف)
$E_1 =$	(ب)
$E_r =$	(ج)
$E_{\nu} =$	(د)
$N_v =$	(ه)
$n =$	(و)



نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز علمی پژوهشی شهادتی دینشان
و دانش پژوهان جوان

۹- سوال نهم:

$r =$	(الف)
$(M/L)(r) =$	(ب)
$(M/L) =$	(ج)


۱۰- سوال دهم:

$m_r =$	(الف)	
$a_{m_1} =$	(ب)	
$r =$	$V_{cm} =$	(ج)

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



- ۱- برای حجم یک حوزه نفتی در جنوب کشور ۴۰ میلیون بشکه نفت تخمین زده می شود. این حوزه نفتی در عمق یک کیلومتری ($d=1 \text{ km}$) از سطح زمین قرار گرفته است.
- یکی از روش هایی که به اکتشاف منابع نفتی منجر می شود اندازه گیری شتاب گرانش است. چگالی نفت خام برای نفت سبک و سنگین به ترتیب ۸۷۰ و ۹۲۰ کیلو گرم بر متر مکعب است.
- الف) شکل شماتیکی از مسئله ترسیم کنید. فرض کنید مخزن نفتی به صورت کروی باشد.
- ب) تغییرات نسبی شتاب گرانش را برای نقطه نصب دکل نفتی به صورت پارامتری به دست آورید.
- ج) مقدار عددی تغییرات نسبی شتاب گرانش را محاسبه کنید.
- د) دقت در اندازه گیری شتاب گرانش دست کم چقدر باید باشد تا از اندازه گیری شتاب گرانش بتوانیم به سبک یا سنگین بودن نفت پی ببریم. (۲۰ نمره)

در صورت لزوم از این قسمت

به عنوان چرگ نویس

استفاده کنید


مطلوب این قسمت

تحت هیچ شرایطی

تصحیح نخواهد شد




هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور



نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش، تحقیق و توانمند سازی در زبان
و دانش پژوهان جوان

پاسخ سوال ۱

از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد




هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :


کد ملی :



مرکز ملی پژوهش و تحقیق دین اسلام
و داستان پژوهیان جوان

ادامه پاسخ سوال ۱ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد


هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور



نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش، تئوری و ادبی دینخان
و دانش پژوهان جوان

ادامه پاسخ سوال ۱ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد


(Large blank area for writing the answer to Question 1.)



نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



۲- پتانسیل گرانشی را در اطراف یک سامانه دوتایی (مثل خورشید(M)-زمین(m)) به فاصله d از یکدیگر را ترسیم می‌کنیم.


این سامانه با سرعت زاویه‌ای ω حول مرکز خود در حال دوران است. نقاط L_1 تا L_5 به نقاط لاگرانژ موسوم هستند. اگر جسم سومی با جرمی بسیار کوچکتر از این دو جرم $[M < m]$ در نقاط لاگرانژ قرار گیرد، موقعیت آن نسبت به جرم‌های m و M همواره ثابت خواهد ماند.

این نقاط مکان‌های مناسبی برای قرارگیری ماهواره‌های تحقیقاتی هستند. ماهواره تحقیقاتی SOHO در نقطه L_1 قرار گرفته و تلسکوپ فضایی جیمز وب JWST در نقطه L_2 نصب خواهد شد چرا که همواره در سایه زمین نسبت به خورشید قرار خواهد داشت.

(الف) با توجه به شکل، مشخصه‌های نقاط لاگرانژ از دید تعادل و پایداری را در دو دسته (L_1, L_2, L_3) و (L_4, L_5) بنویسید.

(ب) فاصله خورشید از مرکز جرم مشترک سیستم خورشید زمین را بر حسب متر محاسبه کرده و نسبت آن را به فاصله زمین تا خورشید به دست آورید.

(ج) با یک تقریب خوب می‌توانیم فرض کنیم که مرکز جرم زمین-خورشید در مرکز خورشید قرار گرفته باشد. سه معادله برای محاسبه x_1 (فاصله نقطه L_1 از مرکز خورشید)، x_2 (فاصله نقطه L_2 از مرکز خورشید) و x_3 (فاصله نقطه L_3 از مرکز خورشید) بدست آورید که با حل آنها بتوان مقادیر فوق را محاسبه کرد. (۲۰ نمره)



هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش و تعدادی درخواست
و داشت پژوهش جوان

از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

پاسخ سوال ۲




هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش، تئوری و ارزشان
و دانش پژوهان عجوان

ادامه پاسخ سوال ۲ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

(Large rectangular area for writing the answer to question 2.)




هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش، تئوری و دینامیک
و دانش پژوهان جوان


ادامه پاسخ سوال ۲ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

(Large blank area for writing the answer to Question 2)

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



۳- یک منجم آماتور می‌خواهد رصدہای خود را با دقت بیشتری ساماندهی کند. به یک سایت رصدی خوب (حد قدری ۶,۵ می‌رود. ضریب کارایی چشم انسان در حدود ۸٪ است. در همین شرایط از یک تلسکوپ ۸ اینچی (قطر شیئی ۲۰ سانتیمتر) و یک دوربین با ضریب کارایی ۹۰٪ برای تصویر برداری استفاده می‌کند و تصویر دریافتی را روی مونیتور لپ تاپ خود مشاهده می‌کند.

الف) رابطه قدر ظاهری- قدر مطلق را با وجود خاموشی بنویسید.

ب) قدر کم نورترین ستاره‌ای را که روی مونیتور لپ تاپ خود مشاهده می‌کند محاسبه کنید.

ج) یکی از این کم نورترین ستاره‌ها در فاصله ۴ کیلوپارسکی از ما (لبه بالج کهکشان) قرار گرفته است. ضریب خاموشی نیز ۱ قدر بر کیلوپارسک است. درخشندگی ستاره را بر حسب درخشندگی خورشید به دست آورید.

د) اگر از رابطه $L \propto M^3$ استفاده کنیم، مقدار جرم ستاره را بر حسب جرم خورشید محاسبه کنید. (۲۵ نمره)

در صورت لزوم از این قسمت

به عنوان چرگ نویس

استفاده کنید

مطلوب این قسمت

تحت هیچ شرایطی

تصحیح نخواهد شد

هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش شهادتی درخواست
و داشت پژوهش جوان

پاسخ سوال ۳

از نوشتمن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد


(Large blank area for writing answers to other questions)

هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش، تئوری و اندیشه دینی
و دانش پژوهان جوان

ادامه پاسخ سوال ۳ از نوشتمن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد


(Large empty rectangular box for writing the answer to question 3.)

هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :




مرکز ملی پژوهش، تئوری و دینامیک
و دانش پژوهان جوان

ادامه پاسخ سوال ۳ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

نام:

نام خانوادگی:

کد ملی:



-۴ ابرهای گازی یونیزه (H_{II}) شمعهای استاندارد برای اندازه‌گیری فاصله هستند. چرا که منطقه‌ای را به صورت کروی شکل در داخل یک ابر گازی تک اتمی یونیزه می‌کند. شعاع کره توسط کمیت‌های قابل رصد محاسبه می‌شود و از طرفی قطر زاویه‌ای این کره نیز بر حسب ثانیه قوس قابل اندازه‌گیری است. در ابرهای گازی تک اتمی مثل سحابی سراسب یا سحابی اتا شاه تخته چنین پدیده‌ای دیده می‌شود. ستاره‌ای پر جرم و آبی رنگ فوتون‌های فرابنفش قابل توجهی تولید می‌کنند که این فوتون‌ها قادر به یونیزاسیون اتم‌های هیدروژن موجود در ابر هستند. بنابراین توسط این فوتون‌های پر انرژی کسری از اتم‌ها یونیزه شده و الکترون‌های آزاد تولید می‌کنند. الکترون‌های آزاد شده برای بازترکیب نیاز به برخورد با هیدروژن‌های یونیزه یا همان پروتون‌ها دارند. آهنگ بازترکیب در واحد حجم با حاصلضرب چگالی الکترونی (n_e) و چگالی پروتونی (n_p) متناسب است ($\text{Rate} = \alpha n_e n_p$): ضریب بازترکیب است. تعداد فوتون‌های تابشی در واحد زمان از ستاره مرکزی که قادر به یونیزاسیون گاز هیدروژن موجود هستند برابر N است (اعداد مورد نیاز در جدول زیر موجود است):

الف) واحد اندازه‌گیری α را در دستگاه SI به دست آورید.

ب) بیشترین طول موج فوتون‌های لازم برای یونیزه کردن یک اتم هیدروژن از حالت پایه را محاسبه کنید.

ج) شعاع ابر H_{II} ایجاد شده را بر حسب n_e , n_p و α محاسبه کنید.

د) اگر $n_e = 10^7$ و $n_p = 10^{-19}$ هر دو در دستگاه SI باشند، شعاع ابر H_{II} ($R_{H_{II}}$) برای ستاره‌های مرکزی داده شده را محاسبه کنید.

ه) اگر قطر زاویه‌ای این ابرهای گازی در حدود یک ثانیه قوسی باشد فاصله این ابرهای گازی داده شده در قسمت د را محاسبه کنید. (۲۵ نمره)

رده طیفی ستاره مرکزی	$N (s^{-1})$
O5V	3×10^{49}
B · V	4×10^{46}
G2V	1×10^{39}




هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور



نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



از نوشتمن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

پاسخ سوال ۴

(This large rectangular area contains 20 horizontal dotted lines for writing the answer to Question 4.)




هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش های دینی
و دانش پژوهان جوان

ادامه پاسخ سوال ۴ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

(Large empty rectangular area for writing the answer to question 4.)




۵۰ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

نام:

نام خانوادگی :

کد ملی:




مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان
و داشتگی‌های جوان

ادامه پاسخ سوال ۴ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



۵- شخصی یک ساعت آفتابی با شاخصی به طول یکصد سانتیمتر می‌سازد. در یک روز مشخص وقتی انتهای سایه را روی سطح زمین علامت می‌زند، این علامت‌ها یک شکل بسته را تشکیل می‌دهد. کوتاهترین طول سایه ۱۷۳ سانتیمتر و بلندترین طول سایه ۵۶۷ سانتیمتر است. (۲۵ نمره)

(الف) ترکیب قرارگیری خورشید، زمین و شاخص را برای بیشترین و کمترین طول سایه ترسیم کنید.

(ب) عرض جغرافیایی ناظر را به دست آورید.

(ج) میل خورشید را به دست آورید.

(د) این پدیده در چه تاریخی یا تاریخ‌هایی رخ می‌دهد؟

۶ ساعت پس از کوتاهترین سایه، طول سایه چند سانتیمتر خواهد بود؟

در صورت لزوم از این قسمت

به عنوان چرگ نویس

استفاده کنید

مطلوب این قسمت

تحت هیچ شرایطی

تصحیح نخواهد شد




هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

نام:

نام خانوادگی :

کد ملی:



از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد.

پاسخ سوال ۵




هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

نام:

نام خانوادگی :

کد ملی:



مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان
و داشتگی‌های جوان

ادامه پاسخ سوال ۵ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد





هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

نام:

نام خانوادگی :

کد ملی:




مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان
وداشی شروهان جوان

ادامه پاسخ سوال ۵ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



۶- در یک خوش ستاره ای فرض کنید دو نوع ستاره با جرم های $m_2 = 1 \cdot M_{\text{sun}}$ و $m_1 = 10 \cdot M_{\text{sun}}$ وجود دارد و چگالی عددی آنها به این صورت با شعاع تغییر می کند $n_2(r) = n_1(r) / r^2$. از رابطه $L \propto M^3$ استفاده کنید. شعاع های نیمه جرم (R_{hm}) و نیمه درخشندگی (R_{hl}) به شعاع هایی گفته می شود که به ترتیب نیمی از جرم خوش و نیمی از درخشندگی خوش در آن وجود داشته باشد.

الف) فرض کنید هر دو نوع ستاره تا شعاع R توزیع شده باشند. نسبت شعاع نیمه جرم به شعاع نیمه درخشندگی را به دست آورید.

ب) می دانیم در اثر تحول دینامیکی به مرور زمان ستاره های سنگین تر به نواحی درونی تر خوش هدایت می شوند و تجمع آنها در نواحی مرکزی تر خوش بیشتر می شود. به این پدیده جداسازی جرمی (mass segregation) گفته می شود.

پس از جداسازی جرمی، ستاره های m_2 تا شعاع $R/2$ توزیع شده و ستاره های m_1 در همان وضعیت قبلی باقی می مانند. رابطه ای نسبت شعاع نیمه جرم و شعاع نیمه جرم روشنایی را برای این حالت به دست آورده و مقدار عددی این نسبت را به ازای $n_1 = 10n_2$ محاسبه کنید.

ج) با مقایسه حالت های الف و ب در حداقل ۳ خط، نتایج بالا را توجیه کنید. (۲۵ نمره)

در صورت لزوم از این قسمت

به عنوان چرگ نویس

استفاده کنید

مطلوب این قسمت

تحت هیچ شرایطی

تصحیح نخواهد شد




هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

نام:

نام خانوادگی :

کد ملی:



مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان
و دانشجویان نوجوان

پاسخ سوال ۶


از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصریح نخواهد شد

هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش های دینی
و دانش پژوهان جوان

ادامه پاسخ سوال ۶ از نوشتمن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد




هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

نام:

نام خانوادگی :

کد ملی:




مرکز ملی پرورش استعدادهای دخانی
و دانشجویان جوان

ادامه پاسخ سوال ۶ از نوشتمن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



۷- سیارکی در صفحه دایره البروج در مداری دایروی به دور خورشید در حرکت است. سفینه‌ای بر روی این سیارک فرود می‌آید و با مرکز فرماندهی بر روی زمین با ارسال یک سیگنال رادیویی تماس می‌گیرد. سفینه هرگاه که سیگنالی از زمین دریافت می‌کند، فوراً به آن پاسخ می‌دهد. می‌دانیم که وقتی سیارک در وضعیت تربیع قرار می‌گیرد، فاصله زمانی بین ارسال سیگنال و دریافت مجدد آن توسط مرکز فرماندهی در مرکز زمین به مقدار $c\Delta t = 775.68$ طولانی‌تر از حالتی است که سیارک در وضعیت مقابله قرار گرفته باشد. فرض کنید مدار زمین به دور خورشید دایره‌ای به شعاع a_E است. شعاع مداری سیارک، a ، را بر حسب c (سرعت نور) و Δt به دست آورده و مقدار عددی آن را محاسبه کنید. (۰۰ نمره)

در صورت لزوم از این قسمت

به عنوان چرک نویس

استفاده کنید

مطلوب این قسمت

تحت هیچ شرایطی

تصحیح نخواهد شد




هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



پاسخ سوال ۷

از نوشتمن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

(This large rectangular area contains 20 horizontal dotted lines for writing the answer to question 7.)




هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش، تحقیق و توانمندی در تحقیقات
و دانش پژوهان ایران

ادامه پاسخ سوال ۷ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

--

هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش، تئوری و تحقیق
و دانش پژوهان جوان


ادامه پاسخ سوال ۷ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

(Large blank area for writing the answer to Question 7)

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



- ۸- رمبش شدید گرانشی ستاره‌ای به جرم $M = 1 \cdot M_{\text{sun}}$ در مراحل پایانی عمر خود، منجر به یک انفجار شدید ابرنواختر می‌شود؛ به گونه‌ای که هسته ستاره که کوتله‌ای سفیدی بوده، تبدیل به یک ستاره نوترونی می‌شود و مابقی ستاره به صورت یک پوش به بیرون پرتاب می‌شود. جرم کوتله سفید تقریباً $M_C = 1,4 M_{\text{sun}}$ ، شعاع آن به اندازه شعاع زمین و شعاع ستاره نوترونی تقریباً ۲۰ km است.

الف) مقدار کل انرژی آزاد شده در فرایند رمبش گرانشی چند ژول است؟

انرژی آزاد شده به سه قسمت تبدیل می‌شود: انرژی جنبشی پوش (E_1)، انرژی تابشی (E_2) و انرژی نوتروینوهای آزاد شده (E_3).

ب) در اثر انرژی آزادشده پوش، لایه اطراف هسته رمبنده با سرعتی زیاد به بیرون پرتاب می‌شود. پهن شدگی خطوط جذبی در طیف مشاهده شده ابرنواختر، برابر $\Delta\lambda/\lambda = 0,033^3$ است. انرژی جنبشی آزاد شده در ابرنواختر را بر حسب ژول به دست آورید. این انرژی چند درصد از انرژی کل آزاد شده در قسمت الف است؟

ج) در طول انفجار ابرنواختری که به مدت ۲ ماه به طول می‌انجامد، ابر نواختر با قدر مطلق متوسط $M_v = 1$ می‌درخشد. این مقدار انرژی را بر حسب ژول به دست آورید. این انرژی تقریباً چند درصد از شکل انرژی تابشی فوتون‌ها است؟

د) مقدار انرژی آزاد شده توسط نوتروینوهای آزاد شده بر حسب ژول به دست آورید. این انرژی تقریباً چند درصد از کل انرژی آزاد شده است؟

ه) اگر انرژی متوسط نوتروینوهای آزاد شده برابر $E_v = 5 \text{ MeV}$ باشد، تعداد نوتروینوهای آزاد شده را به دست آورید.

و) اگر این ستاره در ابر مازلانی بزرگ واقع شده باشد، تعداد نوتروینوهای عبوری از سطح مقطع بدن هر یک از انسان‌ها (تقریباً ۵,۰ متر مربع) ناشی از این انفجار ابرنواختری چقدر خواهد بود؟ (۰۳۳ نمره)

در صورت لزوم از این قسمت به عنوان چرگ نویس

استفاده کنید مطالب این قسمت


تحت هیچ شرایطی تصحیح نخواهد شد

هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش و تحقیقات آموزشی و پژوهشی
و دانش پژوهان جوان

از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

پاسخ سوال ۸


(Large empty rectangular box for writing the answer to question 8.)

هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش و تحقیقات دین اسلام
و دانش پژوهان جوان

ادامه پاسخ سوال ۸ از نوشتمن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

(Large blank area for writing answers to question 8)




۵۰ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

نام:

نام خانوادگی :

کد ملی:




مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان
و دانش رشوهای جوان

ادامه پاسخ سوال ۸ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



۹- یکی از روش‌های فاصله یابی کهکشان‌ها استفاده ازتابع توزیع درخشندگی خوشه‌های ستاره‌ای درون آنهاست. تابع توزیع تعداد خوشه‌ها بر حسب درخشندگی، یک تابع تپه‌ای شکل بوده، که بیشینه آن در قدر مطلق $M_v = -7,7$ است (یعنی بیشترین فراوانی خوشه‌ها مربوط به خوشه‌های کروی با قدر مطلق $-7,7$ می‌باشد). این موضوع برای همه کهکشان‌ها تقریباً یکسان است. اخیراً گروهی به رهبری پیتر وان داکوم در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ مقاله‌ای در مجله نیچر به چاپ رسانده‌اند که در آن خوشه‌های ستاره‌ای موجود در کهکشان کوتوله NGC1052-DF2 را مورد بررسی قرار داده‌اند. فاصله این کهکشان کوتوله از روش دیگری (روش نوسانات روشنایی سطحی) اندازه‌گیری شده و مقدار آن $D = 20 \text{ Mpc}$ به دست آمده است. نکته عجیبی که گزارش شده این است که محل بیشینه تابع توزیع درخشندگی خوشه‌های کروی در این کهکشان برخلاف همه کهکشان‌های دیگر در قدر مطلق $M_v = -9,1$ است.

(الف) با توجه به مقدار قدر مطلق خوشه‌های کروی با بیشترین فراوانی ($M_v = -9,1$) فاصله کهکشان کوتوله NGC1052-DF2 را به دست آورید.

وان داکوم و همکاران، مقدار جرم این کهکشان کوتوله را از روی سرعت خوشه‌های ستاره‌ای که درون کهکشان در حال چرخش هستند به دست آوردن. مقدار سرعت چرخشی در این کهکشان تقریباً $3,2 \text{ km/s}^5$ و مقدار جرم لازم برای ایجاد چنین سرعت‌هایی برابر $10^8 M_{\text{sun}}$ محاسبه می‌شود. همچنین با توجه به درخشندگی اندازه‌گیری شده که برابر است با $L_{\text{sun}} = 10^8 L_{\text{sun}}$ نسبت جرم به درخشندگی این کهکشان برابر ۲ ($M/L = 2M_{\text{sun}}/L_{\text{sun}}$) محاسبه شده است؛ و از آن نتیجه گرفته‌اند که این کهکشان فاقد ماده تاریک است.

(ب) با توجه به این که جرم کهکشان بر اساس شعاع کهکشان و نیز سرعت حرکت ستاره‌ها و خوشه‌های ستاره‌ای در آن تعیین می‌شود، مقدار M/L را بر حسب فاصله ناظر از کهکشان D به دست آورید.

(ج) اگر قبول کنیم که آنها در تخمین فاصله ذکر شده در قسمت الف مرتکب اشتباه شده باشند، مقدار M/L واقعی کهکشان را بر حسب $M_{\text{sun}}/L_{\text{sun}}$ به دست آورید. (۲۵ نمره)

در صورت لزوم از این قسمت به عنوان چرگ نویس

استفاده کنید مطالب این قسمت

تحت هیچ شرایطی تصحیح نخواهد شد




هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

پاسخ سوال ۹

Large rectangular area for writing the answer to question 9.






۵۰ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

نام:

نام خانوادگی :

کد ملی:



مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان
وداشی شروهان جوان

ادامه پاسخ سوال ۹ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد




هیوا تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

نام:

نام خانوادگی :

کد ملی:




مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان
و داشتگی‌های جوان

ادامه پاسخ سوال ۹ از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :




- ۱- یک منظومه دوتایی رصد شده و میل مداری آن دقیقا صفر است یعنی صفحه مدارشان عمود بر راستای دید ناظر است. همچنین مدار دو ستاره دایروی است. ستاره کم جرم تر (m_1) این منظومه یک ستاره خورشیدگون است. تلسکوپ در مدت زمان ۲ سال تصویر زیر را از رد دو ستاره در آسمان ثبت کرده است. داده برداری از دو ستاره هر ۰.۱ روز یکبار انجام شده است. (محورهای تصویر، بر حسب ثانیه قوسی است) موقعیت دو ستاره در لحظه ای اول نیز نشان داده شده است. (۲۵ نمره)

الف) جرم ستاره بزرگتر چقدر است؟

ب) شعاع مداری هر کدام از ستارگان چند است؟

ج) فاصله ای منظومه از ما و سرعت مرکز جرم سیستم چقدر است؟






هیو تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

نام:

نام خانوادگی :

کد ملی:



مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان
و دانشجویان نوجوان

پاسخ سوال ۱

از نوشتن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد.




هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



ادامه پاسخ سوال ۱۰ از نوشتمن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

(Large rectangular area for writing the answer to question 10.)





هیوا تخصصی تربیت سایت مشاوره کشور

نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :



مرکز ملی پژوهش و تحقیقات علمی و فناوری
و اداره پژوهش و تحقیقات جوانان

ادامه پاسخ سوال ۱۰ از نوشتمن جواب سوالات دیگر در قسمت تعیین شده برای این سوال خودداری کنید در غیر این صورت، پاسخ داده شده تصحیح نخواهد شد

(Large empty rectangular area for writing the answer to question 10.)

