



مشاوره تحصیلی هیوا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ثبت نام مدارس ، برنامه ریزی درسی و آمادگی
برای امتحانات مدارس

برای ورود به صفحه مشاوره مدارس کلیک کنید

برای ورود به صفحه نمونه سوالات امتحانی کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی مدارس

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹



تماس از تلفن ثابت

به نام او

راه حل سؤالات مرحله دوم بیست و دومین دوره المپیاد ریاضی، ۱۳۸۳

۱. BI نیم‌ساز زاویه B است، بنابر قضیه‌ی نیم‌سازها داریم:

$$\frac{DI}{IA} = \frac{BD}{AB}, \quad \frac{DI}{IA} = \frac{I_a D}{I_a A}$$

در نتیجه داریم:

$$\frac{AB}{BD} = \frac{I_a A}{I_a D} = \frac{AD}{I_a D} + 1$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin(45^\circ) = \frac{BH}{AB} \leq \frac{BD}{AB}$$

بنابرای کافی است نشان دهیم $\frac{BD}{AB} \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ ، داریم

که در آن H پای عمود وارد از B بر AD می‌باشد و در نتیجه طول آن از طول BD بیش‌تر نیست، بنابراین حکم ثابت می‌شود.

۲. فرض کنید $x \leq y$ ، باید نشان دهیم $f(x) - x^2 - x \leq f(y) - y^2 - y$. بنابر فرضیات مسئله داریم:

$$f(x) - 3x \leq f(y) - 3y, \quad f(x) - x^2 \leq f(y) - y^2$$

پس

$$f(y) - f(x) \geq 3y - 3x, \quad f(y) - f(x) \geq y^2 - x^2$$

حال اگر نشان دهیم $f(y) - f(x) \geq y^2 + y - x - x^2$ ، حکم ثابت می‌شود. برای این کار کافی است نشان دهیم $y^2 + y - x - x^2$ از حداقل یکی از دو عبارت $3y - 3x$ و $y^2 - x^2$ کوچک‌تر یا مساوی است، فرض کنید مطلب اخیر درست نباشد، در این صورت

$$y^2 + y - x^2 - x > 3y - 3x, \quad y^2 + y - x^2 - x > y^2 - x^2$$

پس

$$(y-x)(y+x+1) > 3(y-x), \quad (y-x)(y+x+1) > (y-x)(y^2+xy+x^2)$$

که با توجه به مثبت بودن $y-x$ داریم:

$$x+y+1 > 3, \quad y+x+1 > y^2+xy+x^2$$

اگر بگیریم $S = x+y$ و $P = xy$ ، نتایج بالا به شکل زیر در می‌آیند:

$$S > 2, \quad S+1 > S^2 - P$$

از طرفی با استفاده از نامساوی حسابی‌هندسی می‌توان دید که $\frac{S^2}{4} \geq P$ ، با استفاده از این رابطه و دو رابطه‌ی بالا داریم:

$$S + \frac{S^2}{4} + 1 > S + P + 1 > S^2$$

در نتیجه $4 < 3S^2 - 4S - 4$ که این مطلب با توجه به این‌که $S > 2$ غلط می‌باشد. تناقض حاصل نشان می‌دهد $y^2 + y - x^2 - x$ از حداقل یکی از دو عبارت $3y - 3x$ و $y^2 - x^2$ کم‌تر یا مساوی است و این مطلب حکم را ثابت می‌کند.

۳. در صورت مسئله باید یک تصحیح به این شکل انجام شود که ((هر شرکت وظیفه‌ی مرمت ۳۰ جاده از بین آن‌هایی که در هر دو سرش نمایندگی دارد را به عهده گرفته است.)) حال به حل مسئله می‌پردازیم. اگر فرض کنیم یک شرکت در n شهر نمایندگی دارد، آن‌گاه حداکثر $\binom{n}{2}$ جاده را می‌تواند مرمت کند. بنابراین باید داشته باشیم $\binom{n}{2} \geq 30$ ، که این رابطه نشان می‌دهد $n \geq 9$ ، یعنی هر شرکت حداقل در ۹ شهر نمایندگی دارد.

بنابراین حداقل $720 = 80 \times 9$ نمایندگی در شهرها وجود دارد، پس شهری وجود دارد که در آن حداقل

$$\left\lceil \frac{720}{80} \right\rceil = 8$$

نمایندگی وجود دارد.

۴. اگر قرار دهیم $m = n$ ، داریم $2n | 2f(n)$ پس $f(n) | n$. در نتیجه به ازای هر عدد طبیعی n باید $f(n) \leq n$. حال فرض کنید m عدد طبیعی دل‌خواهی باشد، در این صورت چون تعداد اعداد اول نامتناهی است پس عدد اول $P > m$ وجود دارد، حال به جای n در رابطه‌ی اصلی $P - m$ را قرار می‌دهیم. در این صورت داریم:

$$f(m) + f(P - m) | P \Rightarrow f(m) + f(P - m) = P$$

اما چون $f(m) \leq m$ و $f(P - m) \leq P - m$ پس با توجه به رابطه‌ی بالا در هر دو نامساوی اخیر تساوی برقرار است. پس $f(m) = m$ برای هر عدد طبیعی برقرار است. این مطلب نشان می‌دهد که تنها تابع مورد نظر تابع همانی است.

۵. در مسئله چهار نقطه‌ی A, B, C, X و Y روی یک دایره قرار دارند. (توجه کنید که چون AD نیم‌ساز است، پس دو کمان MB و MC روی دایره‌ی محیطی با هم برابر هستند، در نتیجه $MB = MC$. پس دایره‌ی به مرکز M و شعاع MB از C هم می‌گذرد.) پس داریم:


$$BD \times DC = DX \times DY$$

از طرفی چهار نقطه‌ی A, B, C, M نیز روی دایره‌ی محیطی قرار دارند. پس

$$AD \times DM = BD \times DC$$

با استفاده از روابط فوق داریم:

$$AD \times DM = DX \times DY$$



پس چهارضلعی $AXMY$ محاطی است، در نتیجه $\angle XYM = \angle XAM$ ، $\angle YXM = \angle YAM$. با توجه به روابط اخیر و این که مثلث XYM متساوی الساقین است (M مرکز دایره‌ای است که از X و Y می‌گذرد). داریم $\angle YAM = \angle MAX$ که همان حکم مسئله می‌باشد.

۶. اگر در هر ستون یک مهره‌ی تمساح قرار دهیم تمام خانه‌ها تهدید می‌شوند، یعنی با n تمساح تمام صفحه تهدید می‌شود. نشان می‌دهیم که این کار با کم‌تر از n تمساح امکان‌پذیر نیست. فرض کنید α_i ($1 \leq i \leq n$) نشان‌دهنده‌ی تعداد تمساح‌ها در ستون i ام باشد. اگر تعداد مهره‌ها در ستون‌های i_1, i_2, \dots, i_k صفر باشد، باید داشته باشیم:

$$\alpha_{i_1-1} + \alpha_{i_1+1} \geq m$$

$$\alpha_{i_2-1} + \alpha_{i_2+1} \geq m$$

⋮

$$\alpha_{i_k-1} + \alpha_{i_k+1} \geq m$$

دلیل این مطلب این است که اگر در یک ستون تعداد مهره‌ها صفر باشد چون هر کدام از خانه‌های این ستون باید تهدید شود، باید در دو ستون مجاور آن حداقل m تمساح وجود داشته باشد. (اگر ستون اول و یا آخر مهره نداشته باشد تنها یک ستون مجاور دارد و باید در همه‌ی خانه‌های آن ستون تمساح باشد). اگر همه‌ی این نامساوی‌ها را جمع کنیم، نتیجه می‌شود جمع همه‌ی آن‌ها بزرگ‌تر یا مساوی mk است. پس حداقل یکی از نامساوی‌های زیر برقرار است:

$$\sum_{j=1}^k \alpha_{i_j-1} \geq \frac{mk}{2}, \quad \sum_{j=1}^k \alpha_{i_j+1} \geq \frac{mk}{2}$$

(منظور از α و یا α_{n+1} در صورت نیاز صفر است.)

بنابراین k تا از α_i ها موجود هستند که مجموع آنها بزرگتر یا مساوی $\frac{mk}{2}$ است. (توجه کنید که اگر ستون اول یا آخر تعداد مهره‌هایش صفر باشد، آن‌گاه ممکن است که $k-1$ تا از α_i ها مجموعشان بزرگتر یا مساوی $\frac{mk}{2}$ باشد که این مطلب در تخمین ما به‌تر خواهد بود.)

حال در عبارت $\sum_{i=1}^n \alpha_i$ که نشان‌دهنده‌ی تعداد مهره‌ها است، k جمله برابر صفر است و مجموع حداکثر k جمله‌ی دیگر حداقل $\frac{mk}{2}$ است و $n-2k$ جمله‌ی دیگر هم هر کدام حداقل یک هستند. پس

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \geq \frac{mk}{2} + (n-2k)$$

چون $m \geq 4$ داریم $\frac{mk}{2} \geq 2k$ پس

$$\frac{mk}{2} + (n-2k) \geq n$$

بنابراین حداقل به m تمساح نیاز داریم و این مطلب اثبات را تمام می‌کند.