

کد کنترل

526

E

526E

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۴۰۱

صبح پنج شنبه
۱۴۰۱/۰۲/۲۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

علوم زمین (کد ۱۴۰۱)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۷۰

جدول مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۳۰	۱	۳۰
۲	رسوب‌شناسی و پترولولوژی سنگ‌های رسوبی	۲۰	۳۱	۵۰
۳	آب‌های زیرزمینی	۲۰	۵۱	۷۰
۴	زمین‌شناسی ایران	۲۰	۷۱	۹۰
۵	زمین‌شناسی نفت	۲۰	۹۱	۱۱۰
۶	ژئوشیمی	۲۰	۱۱۱	۱۳۰
۷	سنگ‌شناسی	۲۰	۱۳۱	۱۵۰
۸	دیرینه‌شناسی	۲۰	۱۵۱	۱۷۰
۹	زمین‌شناسی مهندسی	۲۰	۱۷۱	۱۹۰
۱۰	زمین‌شناسی ساختماری	۲۰	۱۹۱	۲۱۰
۱۱	چینه‌شناسی	۲۰	۲۱۱	۲۳۰
۱۲	زمین‌شناسی اقتصادی	۲۰	۲۳۱	۲۵۰
۱۳	زمین‌شناسی زیست محیطی	۲۰	۲۵۱	۲۷۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غایبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینچنان با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤال‌ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤال‌ها و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the blank. Then mark the correct choice on your answer sheet.

- 1- The rising death toll is ----- largely to the growing number of elderly people, who are especially vulnerable to the flu.
1) attributed 2) converted 3) debilitated 4) transferred
- 2- The couple were finally ----- by the landlord after not paying their rent for six months.
1) extended 2) elicited 3) evicted 4) evacuated
- 3- We have a ----- clientele in our language program, with students from Asia, Europe and South America.
1) complex 2) diverse 3) symmetrical 4) haphazard
- 4- But the possibility of these adversaries acting like friends, despite their long-standing ----- and mutual dislike, is on the horizon.
1) rivalry 2) advocacy 3) inclination 4) justification
- 5- Debating that aliens exist cannot be deemed an ----- truth as we have yet to see proof of their existence.
1) unintelligible 2) insensitive 3) unforeseeable 4) incontrovertible
- 6- The girls wanted to set the table, but they were more of a ----- than a help.
1) compliment 2) hindrance 3) thrill 4) pretension
- 7- The government is to consult the attorney general on whether the enacting of such a law would be in ----- of the constitution.
1) provenance 2) rationalization 3) breach 4) caprice
- 8- Someone once joked that man blames most accidents on -----, but feels a more personal responsibility when he makes a hole-in-one on the golf course.
1) legality 2) verdict 3) charge 4) fate
- 9- The trial collapsed when it became clear that the main witness for the prosecution was not -----.
1) credible 2) singular 3) subjective 4) conjectural
- 10- The rising number of minority inmates in prison only goes to ----- the stereotype that members of minority groups are bad people.
1) overlook 2) downplay 3) belie 4) perpetuate

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Fuel cell electric vehicles emit only water vapor and warm air, (11) ----- no tailpipe emissions. Similar to electricity, hydrogen is an energy carrier that can be produced from various feedstocks. These feedstocks and production methods should be considered when (12) -----.

Argonne National Laboratory's (ANL) report, *Fuel Choices for Fuel Cell Vehicles: Well-to-Wheels Energy and Emission Impacts*, analyzed greenhouse gas (GHG) (13) ----- 10 of the most common hydrogen production and distribution pathways. ANL found that gaseous hydrogen produces (14) ----- GHGs than liquid hydrogen in most cases. ANL also investigated hydrogen's effects on petroleum use and found that using hydrogen as a fuel (15) ----- petroleum use by nearly %100 regardless of fuel production pathway.

- | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 11- 1) produce | 2) that produces | 3) to produce | 4) producing |
| 12- 1) to evaluate hydrogen emissions | 2) evaluating hydrogen emissions | 3) hydrogen emissions evaluated | |
| 3) for hydrogen emissions to evaluate | | | |
| 13- 1) emissions for | 2) it is emitted as | 3) is emitted for | 4) to be emitted |
| 14- 1) less of | 2) as little | 3) fewer | 4) fewer of |
| 15- 1) reduction | 2) reduced | 3) that reduces | 4) to reduce |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Researchers have discovered geologic evidence that unusually large earthquakes and tsunamis from the Tokyo region – located near tectonic plate boundaries that are recognized as a seismic hazard source – may be traceable to a previously unconsidered plate boundary. The team, headed by Simon Fraser University Earth scientist Jessica Pilarczyk, has published its research today in *Nature Geoscience*. The team's ground-breaking discovery represents a new and unconsidered seismic risk for Japan with implications for countries lining the Pacific Rim, including Canada.

In 2011, eastern Japan was hit with a massive magnitude 9 quake – creating the largest rupture area of any earthquake originating from the Japan Trench. It triggered the Fukushima Daiichi nuclear disaster and a tsunami that travelled thousands of miles away – impacting the shores of British Columbia, California, Hawaii, and Chile.

For the past decade, Pilarczyk and an international team of collaborators have been working with the Geological Survey of Japan to study Japan's unique geologic history. Together, they uncovered and analyzed sandy deposits from the Boso Peninsula region (50 km east of Tokyo) that they attribute to an unusually large tsunami that occurred about 1,000 years ago.

Until now, scientists did not have historical records to ascertain if a portion of the Philippine Sea/Pacific plate boundary near the Boso Peninsula was capable of generating large tsunamis similar in size as the Tohoku event in 2011.

16- Which of the following best describes the main idea of the passage?

- 1) Researchers identify a new source for earthquakes and tsunamis in the Tokyo region
- 2) Tectonic plate boundaries in Japan
- 3) An earthquake of great magnitude originating from the Japan Trench
- 4) The Philippine Sea/Pacific plate boundary near the Boso Peninsula

17- The word “its” in paragraph 1 refers to -----.

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1) the team | 2) Nature Geoscience |
| 3) Simon Fraser University | 4) ground-breaking discovery |

18- The word “triggered” in paragraph 2 is similar in meaning to -----.

- 1) caused
- 2) adapted
- 3) preceded
- 4) restrained

19- The tsunami mentioned in the passage, impacted the shores of all of the following areas EXCEPT -----.

- 1) Hawaii
- 2) Oregon
- 3) Chile
- 4) California

20- Where does the following sentence best fit into the passage?

Pilarczyk points to low-lying areas like Delta, Richmond and Port Alberni as potentially vulnerable to tsunamis originating from this region.

- 1) End of paragraph 1
- 2) End of paragraph 2
- 3) End of paragraph 3
- 4) End of paragraph 4

PASSAGE 2:

A new study led by the University of Colorado Boulder reveals the complex history behind one of the Grand Canyon's most well-known geologic features: A mysterious and missing gap of time in the canyon's rock record that covers hundreds of millions of years. The research comes closer to solving a puzzle, called the “Great Unconformity,” that has perplexed geologists since it was first described nearly 150 years ago.

Think of the red bluffs and cliffs of the Grand Canyon as Earth's history textbook, explained Barra Peak, lead author of the new study and a graduate student in geological sciences at CU Boulder. If you scale down the canyon's rock faces, you can jump back almost 2 billion years into the planet's past. But that textbook is also missing pages: In some areas, more than 1 billion years' worth of rocks have disappeared from the Grand Canyon without a trace. Geologists want to know why. “The Great Unconformity is one of the first well-documented geologic features in North America,” Peak said. “But until recently, we didn't have a lot of constraints on when or how it occurred.”

Now, she and her colleagues think they may be narrowing in on an answer in a paper published this month in the journal *Geology*. The team reports that a series of small yet violent faulting events may have rocked the region during the breakup of an ancient supercontinent called Rodinia.

The team's findings could help scientists fill in missing pieces of what happened during this critical period for the Grand Canyon – today one of North America's foremost natural wonders. “We have new analytical methods in our lab that allow us

to decipher the history in the missing window of time across the Great Unconformity,” said Rebecca Flowers, coauthor of the new study and a professor of geological sciences. “We are doing this in the Grand Canyon and at other Great Unconformity localities across North America.”

- 21- Which of the following is the best title for the passage?**
- 1) Digging into Grand Canyon’s Mysterious Gap in Time
 - 2) A New Study Led by the University of Colorado Boulder
 - 3) The Red Bluffs and Cliffs of the Grand Canyon
 - 4) Scaling down the Grand Canyon’s Rock Faces
- 22- The word “perplexed” in paragraph 1 is similar in meaning to -----.**
- 1) motivated
 - 2) scared
 - 3) puzzled
 - 4) exposed
- 23- The underlined “it” in paragraph 2 refers to -----.**
- 1) that textbook
 - 2) the Grand Canyon
 - 3) a trace
 - 4) the Great Unconformity
- 24- The word “decipher” in paragraph 4 is similar in meaning to -----.**
- 1) display
 - 2) decode
 - 3) detect
 - 4) distort
- 25- Where does the following sentence best fit into the passage?**
- The resulting havoc likely tore up the earth around the canyon, causing rocks and sediment to wash away and into the ocean.**
- 1) End of paragraph 1
 - 2) End of paragraph 2
 - 3) End of paragraph 3
 - 4) End of paragraph 4

PASSAGE 3:

As a young research assistant, Charles Francis Richter made his name early when he began a decades-long collaboration with Beno Gutenberg, who was then the director of Seismological Laboratory in Pasadena. In the early 1930s, the pair was one of several groups of scientists around the world who were trying to establish a standard way to measure and compare earthquakes. The seismological laboratory at Cal Tech was planning to issue regular reports on southern California earthquakes, so the Gutenberg-Richter study was especially important. They needed to be able to catalog several hundred quakes a year with an objective and reliable scale.

At the time, the only way to rate shocks was a scale developed in 1902 by the Italian priest and geologist Giuseppe Mercalli. The Mercalli scale classified earthquakes from 1 to 12, depending on how buildings and people responded to the tremor. A shock that set chandeliers swinging might rate as a 1 or 2 on this scale, while one that destroyed huge buildings and created panic in a crowded city might count as a 10. The obvious problem with the Mercalli scale was that it relied on subjective measures of how well a building had been constructed and how used to these sorts of crises the population was. The Mercalli scale also made it difficult to rate earthquakes that happened in remote, sparingly populated areas.

The scale developed by Richter and Gutenberg, which became known by Richter’s name only, was instead an absolute measure of an earthquake’s intensity. Richter used a seismograph—an instrument generally consisting of a constantly unwinding roll of paper, anchored to a fixed place, and a pendulum or magnet suspended with a marking device above the roll—to record actual earth motion during an earthquake. The scale

takes into account the instrument's distance from the epicenter, or the point on the ground that is directly above the earthquake's origin. Richter chose to use the term "magnitude" to describe an earthquake's strength because of his early interest in astronomy; stargazers use the word to describe the brightness of stars. Gutenberg suggested that the scale be logarithmic, so that a quake of magnitude 7 would be ten times stronger than a 6, a hundred times stronger than a 5, and a thousand times stronger than a 4.

26- Which of the following statements is true?

- 1) Gutenberg-Richter was the only group in the world trying to establish a standard way to measure and compare earthquakes.
- 2) The seismological laboratory at Cal Tech insisted that the new scale be known by Richter's name only.
- 3) As a young research assistant, Richter was the director of Seismological Laboratory in Pasadena.
- 4) Richter made his name early when he began a decades-long collaboration with Beno Gutenberg.

27- All of the following are true about the Mercalli scale EXCEPT that it -----.

- 1) classified earthquakes from 1 to 12
- 2) relied on objective measures
- 3) was developed by an Italian priest and geologist
- 4) was developed in 1902

28- The word "sparsely" in paragraph 2 is similar in meaning to -----.

- 1) thinly
- 2) densely
- 3) internally
- 4) externally

29- Which of the following statements is true?


- 1) Richter's scale takes into account the seismograph's distance from the farthest cities.
- 2) Gutenberg insisted that a pendulum rather than a magnet be used in the seismograph.
- 3) Richter coined the term "magnitude" in collaboration with stargazers.
- 4) Richter had an early interest in astronomy.

30- According to Gutenberg's logarithmic scale, a quake of magnitude 7 would be -----.

- 1) a hundred times stronger than a 4
- 2) a hundred times stronger than a 6
- 3) ten times stronger than a 6
- 4) a thousand times stronger than a 5

رسوب‌شناسی و پetroلیوژی سنگ‌های رسویی:

۳۱- اگر نمودار تجمعی احتمالی به صورت زیر باشد، آستانه اندازه ذرات برای حمل به صورت تعليق دائم چند phi است؟



- | | | | |
|---|---|--|--|
| - | | | |
| -۳۲- میزان کدام مورد در تعیین بلوغ بافتی رسوبات از الویت بالاتری برخوردار است؟ | | | |
| | (۱) خمیره
(۲) گردشده
(۳) کرویت
(۴) جورشدگی | | |
| -۳۳- با توجه به تقسیم‌بندی زایشی از رسوبات / سنگ‌های رسوبی کدامیک جزو رسوبات سیلیسی آواری است؟ | | | |
| | (۱) Marl
(۲) Calcilutite
(۳) Carbonate Sedimentary Lithic Arenite | | |
| -۳۴- در صورتی که متوسط اندازه رسوبی در حد ۴/۵ فی باشد، این رسوب دقیقاً در چه رده‌ای قرار می‌گیرد؟ | | | |
| | (۱) سیلت متوسط
(۲) سیلت درشت
(۳) ماسه بسیار ریز
(۴) سیلت ریز | | |
| -۳۵- کدام مورد عامل اصلی رنگ تیره در رسوبات است؟ | | | |
| | (۱) فراوانی کانی‌های تیره (Opaque)
(۲) فراوانی کانی‌های رسی گروه ۱:۱
(۳) فراوانی کانی‌های رسی گروه ۲:۱
(۴) کدامیک از مجموعه رسوبات زیر جور شده‌تر است؟ | | |
| -۳۶- لایه‌بندی مسطح (Plain Bedding) در رسوبات دانه‌ریز مربوط به جریان با عدد فرود است. | | | |
| | (۱) ۱-۲ تا ۵ فی
(۲) ۳-۵ تا ۹ فی
(۳) ۵ تا ۱۵ فی
(۴) صفر تا ۵ فی | | |
| -۳۷- لایه‌بندی مسطح (Plain Bedding) در رسوبات دانه‌ریز مربوط به جریان با عدد فرود است. | | | |
| | (۱) خیلی کمتر از یک
(۲) اندکی بیشتر از یک
(۳) خیلی بیشتر از یک
(۴) کدامیک از ریپل‌های نامتقارن، نشانگر جریان با سرعت بیشتری است؟ | | |
| -۳۸- لایه‌بندی مسطح (Plain Bedding) در رسوبات دانه‌ریز مربوط به جریان با عدد فرود است. | | | |
| | (۱) سینوسی
(۲) قله موجی
(۳) قله مستقیم
(۴) زبانه‌ای | | |
| -۳۹- در لایه میانی کدام کانی رسی یون‌های K^+ همراه با مقادیری $Fe.OH$ و Mg وجود دارد؟ | | | |
| | (۱) Montmorillonite
(۲) Illite
(۳) Chlorite
(۴) Kaolinite | | |
| -۴۰- کدام ذره رسوبی در شرایط یکسان هوازدگی، پایداری کمتری نشان می‌دهد؟ | | | |
| | (۱) HM Calcite
(۲) LM Calcite
(۳) Calcite
(۴) Aragonite | | |
| -۴۱- با فرض یکسان بودن مسافت و شرایط حاکم بر محیط حمل و نقل کدام ذره کرویت کمتری پیدا می‌کند؟ | | | |
| | (۱) Compact Platy (CP)
(۲) Very Compact (VC)
(۳) Bladed Elongate (BE)
(۴) Platy Compact (PC) | | |
| -۴۲- کدام گزینه علاوه بر مشخصات بافتی، اطلاعاتی در مورد ترکیب رسوب، سنگ رسوبی نیز به دست می‌دهد؟ | | | |
| | (۱) شیل
(۲) گل
(۳) ماسه
(۴) گراول گلی ماسه‌دار | | |
| -۴۳- کدام گروه از رسوبات سنگ‌های رسوبی، دارای تنوع کانی‌شناختی بیشتری است؟ | | | |
| | (۱) آواری
(۲) کربناتی
(۳) خشکی‌زاد
(۴) آذرآواری | | |
| -۴۴- تشکیل کدام گرهک در درون سنگ‌های دانه‌ریز در شرایط اکسیدان (نزدیک سطح زمین) متداول‌تر است؟ | | | |
| | (۱) سیدریت
(۲) چرت
(۳) پیریت
(۴) سلینیت | | |
| -۴۵- همراهی کدام نوع خاک با رسوبات غنی از ماده آلی (زغال‌سنگ‌ها) متداول‌تر است؟ | | | |
| | (۱) Seatearth
(۲) Calcrete
(۳) Silcrete
(۴) Ferrocrete | | |
| -۴۶- کدام مورد برای تعیین میزان جورشدگی رسوب دقیق‌تر است؟ | | | |
| | (۱) کشیدگی منحنی فراوانی
(۲) پهن‌شدگی منحنی فراوانی
(۳) شب منحنی تجمعی
(۴) فاصله قطر بشینه و قطر کمینه | | |

- ۴۷- در مطالعه کانی‌های سنگین برای تشخیص خاستگاه سنگ‌های رسوبی، کدامیک از کانی‌های زیر موید سنگ مادر آذربین هستند؟

- (۱) روتیل، تورمالین و آپاتیت
- (۲) مگنتیت، اپیدوت و گارنت
- (۳) استارولیت، روتیل و مگنتیت
- (۴) پیریت، زیرکن و کلریت

- ۴۸- در تقسیم‌بندی بافت رسوبات در مثلث فولک (۱۹۷۴)، اگر مخلوط گل و سیلت و ماسه در نمونه‌ای وجود داشته باشد و میزان رس کمتر از ۱۵ درصد و میزان سیلت و رس برابر باشد، نام مناسب برای این نمونه کدام است؟

- (۱) ماسه گلی
- (۲) رس ماسه‌ای
- (۳) گل
- (۴) سیلت ماسه‌ای

- ۴۹- در ترسیم داده‌های رسوب‌شناسی در کدامیک از اشکال زیر همیشه داده‌های مد (Mode)، میانگین (Mean) و میانه (Median)، با هم برابر و بر روی هم منطبق می‌شوند؟

- (۱) زنگوله‌ای
- (۲) هیستوگرام
- (۳) مثلثی
- (۴) تجمعی

- ۵۰- کدامیک معرف تخلخلی است که دارای حفره‌های عدسی شکل یا منظم است و با از دست دادن آب بین ذره‌ای و تخمیر جلبک‌ها در محیط‌های جزر و مدی تشکیل می‌شود؟

- (۱) Intercrystalline
- (۲) Fenestral
- (۳) Intraparticle
- (۴) Interparticle

آب‌های زیرزمینی:

- ۵۱- هر چقدر قابلیت انتقال آبخوان بیشتر باشد، در اطراف چاه پمپاژ کدام مورد مشاهده می‌شود؟

- (۱) شیب هیدرولیکی بیشتر
- (۲) عمق مخروط افت بیشتر
- (۳) شعاع تأثیر بزرگ‌تر
- (۴) شعاع تأثیر کوچک‌تر

- ۵۲- در یک آبخوان، با استفاده از کدام موارد می‌توان نقشه تغییرات سطح ایستابی را تهیه کرد؟

- (۱) دو نقشه همتراز آب زیرزمینی در دو زمان متفاوت

(۲) یک نقشه همتراز آب زیرزمینی و یک نقشه گرادیان هیدرولیکی در یک زمان مشخص

(۳) یک نقشه همتراز آب زیرزمینی و یک نقشه هم‌عمق آب زیرزمینی در دو زمان متفاوت

(۴) یک نقشه همتراز آب زیرزمینی و یک نقشه هم‌عمق آب زیرزمینی در یک زمان مشخص

- ۵۳- همه موارد جزو فرایندهای تکمیل و تجهیز چاه محسوب می‌شوند، به جز:

- (۱) توسعه طبیعی چاه با پمپاژ پله‌ای

(۲) توسعه چاه با هوای فشرده کمپرسور

(۳) ریختن فیلتر شنی (Gravel pack) در داخل لوله جدار

(۴) انتخاب اسکرین مناسب با ضریب یکنواختی رسوبات آبخوان

- ۵۴- کدام عامل محدودکننده مکان‌یابی طرح تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی به روش پخش سیلاب است؟

- (۱) وجود لایه غیراشباع دانه‌درشت


(۲) زیاد بودن تبخیر و تعرق و بارش کم

(۳) ضخامت کم لایه غیراشباع دانه درشت

(۴) استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای تغذیه

- ۵۵- در چاه مشاهده‌ای در آبخوان غیرمحبوس که به فاصله ۶۰ متری چاه پمپاژ قرار دارد، میزان افت یک متر است. در صورتی که افت نهایی و تراز بار هیدرولیکی در چاه پمپاژ پس از ۳ روز از پمپاژ به ترتیب ۱۱ و ۷۵ متر باشد، سطح استاتیک در چاه مشاهده‌ای در چه تراز ارتفاعی است؟

-۵۶- در نیمرخ آبخوان آزاد مطابق شکل زیر (جريان افقی است)، به ترتیب از راست به چپ بار کل، بار فشار و بار ارتفاع در نقطه C چند متر است؟



(۱) ۵, ۲, ۳/۵

(۲) ۸, ۵, ۲, ۶/۵

(۳) ۲, ۵/۵, ۶/۵

(۴) ۲, ۶/۵, ۸/۵

-۵۷- مقدار تخلخل و نگهداشت ویژه مواد یک آبخوان آزاد به ترتیب ۲۰ و ۸ درصد است. در صورت نفوذ ۱۲ میلی‌متر بارش به آبخوان، سطح ایستابی چند میلی‌متر بالا می‌آید؟


(۱) ۱۵۰ (۴)

(۲) ۱۳۴ (۳)

(۳) ۱۰۰ (۲)

(۴) ۷۶

-۵۸- در شکل زیر میزان تغذیه آبخوان نشتی از طریق آبخوان آزاد بالای $\frac{1}{2}$ متر در سال است. هدایت هیدرولیکی عمودی لایه نشت‌گننده (aquitard) چند متر در سال است؟



(۱) ۰/۰۵

(۲) ۰/۰۸

(۳) ۰/۲

(۴) ۰/۵

-۵۹- در معادله دارسی، گرادیان هیدرولیکی معرف کدام مورد است؟

(۱) افت بار کل در واحد طول مسیر جريان

(۲) مجموع افت بار فشار و بار سرعت در واحد طول مسیر جريان

(۳) مجموع افت بار فشار و بار ارتفاع در واحد طول مسیر جريان

(۴) مجموع افت بار سرعت و بار ارتفاع در واحد طول مسیر جريان

-۶۰- در صورتی که یک آبخوان آزاد برای مدتی طولانی پمپاز شود، آب خروجی چاه از کدام مورد تأمین می‌شود؟

(۱) انبساط آب

(۲) تراکم آبخوان

(۳) مرز مخروط افت

(۴) آبدهی تاخیری

-۶۱- یک آبخوان آبرفتی از یک بخش سیلتی پایینی و یک بخش سنی بالایی تشکیل شده است. نسبت هدایت هیدرولیکی این دو بخش برابر $1/1$ است. در صورت وقوع جريان افقی در این آبخوان، گرادیان هیدرولیکی چگونه است؟

(۱) در بخش سیلتی کمتر از بخش سنی است.

(۲) در بخش سیلتی برابر با بخش سنی است.

(۳) در بخش سیلتی بیشتر از بخش سنی است.

(۴) نسبت آن در دو بخش سیلتی و سنی برابر $1/1$ است.

-۶۲- کدام بخش از چرخه آب جزء آب‌های جوان محسوب می‌شود؟

(۱) برف در ارتفاعات

(۲) بارش ابتدای فصل

(۳) آب ماقمایی

(۴) آب‌های فسیلی

-۶۳- نسبت ناهمسویی در یک آبخوان آبرفتی $2/1$ است. در صورتی که هدایت هیدرولیکی آبخوان ۵ متر بر روز باشد، دبی ویژه در جهت افقی تحت گرادیان هیدرولیکی واحد چند متر بر روز است؟

(۱) ۵

(۲) ۱۵

(۳) ۲۰

(۴) ۲۵

- ۶۴- در نقطه A از یک آبخوان آزاد، ردیاب اورانین تزریق شده است. پس از ۶۶ روز ردیاب در چشمه‌ای با فاصله ۱۰۰ متری پایین دست نقطه A در نقطه B دریافت شده است. تراز آب زیرزمینی در نقطه A برابر ۱۵۰ متر و در نقطه B برابر ۱۴۹۵ متر بالاتر از سطح آزاد دریا بوده است. سرعت جریان آب و هدایت هیدرولیکی آبخوان به ترتیب چند متر بر روز بوده است؟

(۴) ۵۰ °

(۳) ۲۵ °

(۲) ۱۵ °

(۱) ۱۵ °

- ۶۵- کدام مورد در رابطه با معادله سه بعدی زیر درست است؟

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k_x \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k_y \frac{\partial h}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k_z \frac{\partial h}{\partial z} \right) = S \frac{\partial h}{\partial t}$$

(۲) ناهمسانگرد، غیرهمگن، ناپایدار

(۱) همسانگرد، غیرهمگن، ناپایدار

(۴) ناهمسانگرد، همگن، پایدار

(۳) ناهمسانگرد، همگن، ناپایدار

- ۶۶- فراوان‌ترین آنیون در آب‌های زیرزمینی کدام است؟

(۴) بی‌کربنات

(۳) سولفات

(۲) نیترات

(۱) کلراید

- ۶۷- کدام‌یک از روش‌های ژئوفیزیک، برای مطالعه آب‌های زیرزمینی کاربرد بیشتری دارد؟

(۴) مغناطیس‌سنجدی

(۳) ژئوالکتریک

(۲) لرزه‌سنجدی

(۱) ثقل‌سنجدی

- ۶۸- ظرفیت ویژه (Specific Capacity) یک چاه پمپاژ، بیانگر کدام نسبت است؟

(۲) افت چاه به دبی چاه

(۱) دبی چاه به افت چاه

(۴) قطر چاه به دبی چاه

(۳) قطر چاه به دبی چاه

- ۶۹- بر روی نمودار لگاریتمی افت - زمان یک چاه مشاهده‌ای به‌ازای هر سیکل لگاریتمی $\frac{2}{3}$ متر افت مشاهده شده است. اگر دبی پمپاژ ۳۱۴ متر مکعب بر روز باشد، مقدار قابلیت انتقال آبخوان چند متر مربع بر روز است؟

(۴) ۲۵ °

(۳) ۱۵ °

(۲) ۴۵ °

(۱) ۲۵ °

- ۷۰- در یک آبخوان محبوس با قابلیت انتقال ۱۰۰ متر مربع بر روز یک چاه مشاهده‌ای در فاصله ۱۰۰ متری از چاه پمپاژ قرار گرفته است. یک ساعت پس از شروع پمپاژ، افت سطح آب در چاه مشاهده‌ای شروع شده است. ضریب ذخیره آبخوان چقدر است؟

(۴) ۰,۰۰۲۵

(۳) ۰,۰۰۱۵

(۲) ۰,۰۰۰۹

(۱) ۰,۰۰۱

زمین‌شناسی ایران:

- ۷۱- کدام، واحدهای سنگی دارای قابلیت مخزنی هستند؟

(۲) داریان، سروک، گرو

(۱) گوری، دلان، فهلیان

(۴) آسماری، سورگاه، تله زنگ

(۳) جهرم، شهریار، گدوان

- ۷۲- روند کدام گسل با بقیه متفاوت است؟

(۴) تالش

(۳) کازرون

(۲) نایبند

(۱) دشت بیاض

- ۷۳- همه سازندها معرف رخساره پلازیک منطقه زاگرس هستند، به جز:

(۴) گرو

(۳) کردمی


(۲) ساچون

(۱) سورگاه

- ۷۴- تشكیل کدام واحد سنگی با کدام رخداد زمین ساختی درست آمده است؟
- ۱) کنگلومرای کرمان - آتیکن
 - ۲) کنگلومرای فجن - سابه‌رسی‌نین
 - ۳) سازند گند - پیرئن
 - ۴) سازند شوریجه - لارامید
- ۷۵- افیولیت‌های پالئوزوئیک ایران در کدام منطقه بروند دارند؟
- ۱) نهیندان
 - ۲) جنوب باختری مشهد
 - ۳) نواحی جندق - انارک
 - ۴) تکاب
- ۷۶- همهٔ فعالیت‌ها نتیجه تأثیر رخداد زمین ساختی سیمیرین میانی هستند، به جز:
- ۱) دگرگونی گروه شمشک
 - ۲) کانی‌زایی قلع در گرانیت شاه‌کوه
 - ۳) ترزیق توده نفوذی گرانوپوریتی کلاه‌قاضی
 - ۴) تغییر شرایط رسوب‌گذاری و زمین ساختی منطقه زاگرس
- ۷۷- کدام عبارت درست نیست؟
- ۱) البرز خاوری لرزه‌خیزتر از البرز باختری است.
 - ۲) گسل عطاری نتیجه عملکرد رژیم زمین ساخت کششی است.
 - ۳) در بخش میانی زون سنتنچ-سیرجان، کانی‌سازی اصلی شامل کروم و آهن است.
 - ۴) بلوک طبیعی در باختر و خاور، به ترتیب، توسط گسل‌های ناییند و کلمرد-کوهبنان محدود شده است.
- ۷۸- قدیمی‌ترین سنگ‌های پرکامبرین ایران مربوط به کدام زمان هستند؟
- ۱) آرکئن میانی
 - ۲) پالئوپروتروزوئیک
 - ۳) نشوپروتروزوئیک
 - ۴) آرکئن پسین
- ۷۹- در کدام مورد سن نسبی واحدهای لیتوستراتیگرافی، به ترتیب، از قدیم به جدید درست است؟
- ۱) سیاهو، سرچاهان، زکین، سلطان‌میدان
 - ۲) گوش‌کمر، لایه‌های جلفا، آغار، خلیج
 - ۳) افق‌گونیاتیتی ۱، افق‌موش، علن، گچال
 - ۴) افق‌موش، افق‌گونیاتیتی ۲، لایه‌های جلفا، سفیدار
- ۸۰- کدام رخساره در ژوراسیک زاگرس مرتفع دیده شده است؟
- ۱) تبخیری
 - ۲) کربناته
 - ۳) ژرف کربناته - رادیولاریتی
- ۸۱- کدام گزینه درباره زون مکران درست است؟
- ۱) چین‌ها روند تقریباً شرقی - غربی دارند.
 - ۲) پوشش رسوبی روی پی‌سنگ از جنوب به شمال جوان‌تر می‌شود.
 - ۳) چین‌خوردگی در آن از کرتاسه آغاز شد و در میوسن پایان یافت.
 - ۴) علیرغم پایان فرورانش در میوسن، در حال حاضر نیز توان لرزه‌خیزی بالایی دارد.
- ۸۲- کدام واحد سنگی معرف قدیمی‌ترین سنگ‌های پرکامبرین منطقه ساغند - پشت‌بادام به شمار می‌رود؟
- ۱) مجموعه بنده‌شورو
 - ۲) سازند تاشک
 - ۳) مجموعه چاپدونی
 - ۴) کمپلکس پشت‌بادام
- ۸۳- همهٔ عبارت‌ها معرف ویژگی‌های گروه مگو البرز هستند، به جز:
- ۱) مرز زیرین آن با گروه شمشک تدریجی است.
 - ۲) عموماً از نهشته‌های دریایی فسیل‌دار تشكیل شده است.
 - ۳) عموماً ستبرای آن، در مقایسه با سنگ‌های گروه شمشک، بسیار کمتر است.
 - ۴) مرزهای پایین و بالای آن، به ترتیب، با رخدادهای سیمیرین میانی و پسین مشخص می‌شوند.

- ۸۴ - کدام گزینه درباره سازند لالون درست است؟
- (۱) معرف نهشته‌های پلاتفرمی اوایل کامبرین پیشین است.
 - (۲) معرف سنگ‌های کامبرین پوشش پلاتفرم شمال ایران است.
 - (۳) مرزهای زیرین و بالای آن، به ترتیب، با فازهای فرسایشی زریگانین و میلانین مشخص می‌شوند.
 - (۴) حاصل تخریب و فرسایش سنگ‌های آذربین-دگرگونی پرکامبرین میانی و رسوب‌گذاری در شرایط اکسیدان است.
- ۸۵ - کدام سازند معرف رخساره‌های آواری-تبخیری اوایل پالئوزوئیک بالایی است؟
- (۱) نیور پادها
 - (۲) زکین گچال
- ۸۶ - کدام واحد سنگی فقط در دامنه شمالی البرز دیده شده است؟
- (۱) سازند نسن شیسته‌های گرگان
 - (۲) سازند خوش‌بیلاق
- ۸۷ - رخساره کدام سازند با بقیه تفاوت دارد؟
- (۱) الیکا خانه‌کت
 - (۲) سینا جهرم
- ۸۸ - در دور پلیوسن، وضعیت کدام منطقه با بقیه متفاوت بوده است؟
- (۱) البرز جنوبی البرز شمالی
 - (۲) ایران مرکزی کپه‌داغ
- ۸۹ - کدام عبارت درست است؟
- (۱) Orbitolina مهم‌ترین فونای توالی‌های کرتاسه مناطق مختلف ایران است.
 - (۲) توالی‌های کرتاسه ایران معرف رسوب‌گذاری در حوضه‌های رسوبی مشابه هستند.
 - (۳) رخساره پلاژیک سازنده‌ای سروک و ایلام از شمال غرب زاگرس گزارش شده است.
 - (۴) ناپیوستگی‌های متعدد در توالی‌های کرتاسه بالایی البرز، به عملکرد فاز استرین نسبت داده شده‌اند.
- ۹۰ - کدام عبارت درست است؟
- (۱) تقسیم‌بندی آبرفت‌های کواترنری تهران براساس داده‌های سن مطلق امکان‌پذیر است.
 - (۲) در سازند کهریزک مقادیر قابل توجهی استخوان، چوب، سفال و لایه ذغال یافت شده است.
 - (۳) دگرشیبی فرآگیر قاعده کواترنری معرف خروج از آب به صورت گستردگی در همه جای ایران و نتیجه رخداد آلپ پایانی است.
 - (۴) ناپیوستگی قاعده کواترنری در مناطق وسیعی از البرز و کپه‌داغ به عملکرد رخداد پیرنتن نسبت داده شده است.
- زمین‌شناسی نفت:
- ۹۱ - کدام نمودار برای محاسبه فشار منفذی سازند، کاربرد فراوانی دارد؟
- (۱) صوتی پرتوی گاما
 - (۲) مقاومت الکتریکی فاکتور فوتولکترویک

۹۲- با توجه به نمودار تاریخچه تدفین شکل زیر و با در نظر گرفتن دمای سطح ۲۴ درجه سانتی‌گراد و شیب زمین‌گرمایی ۳ درجه سانتی‌گراد بهازای هر ۱۰۰ متر، کدام مورد درست است؟



- (۱) لایه‌های ماسه‌ای و آهکی به پنجره نفت‌زایی رسیده‌اند و در حال تولید نفت هستند.
- (۲) لایه شیلی در ۳۰ میلیون سال پیش به پنجره تولید نفت رسیده است، در حال حاضر هم در پنجره نفت‌زایی قرار دارد و در حال تولید نفت است.
- (۳) لایه آهکی در ۳۰ میلیون سال پیش به پنجره تولید نفت رسیده است، ولی در حال حاضر به علت بالاًمدگی از پنجره نفتی خارج شده است.
- (۴) لایه شیلی در ۳۰ میلیون سال پیش به پنجره تولید نفت رسیده است، در حال حاضر به علت بالاًمدگی از پنجره نفتی خارج شده است.


۹۳- کدام عبارت درست است؟

- (۱) مخازن نفت‌دوست، راندمان تولید بالایی دارند.
- (۲) مخازن آبدوست، راندمان تولید بالاتری دارند.
- (۳) تولید از مخزن ربطی به ترشوندگی ندارد و تخلخل و تراویی کنترل‌کننده تولید هستند.
- (۴) مخازن با زاویه ترشوندگی برابر ۹۰ درجه دارای بیشترین فشار مویینگی و توان تولید هستند.

کدامیک از محیط‌های رسویی زیر به ترتیب برای تشکیل سنگ مخزن و پوش‌سنگ مناسب هستند؟

- (۱) ماوس بار دلتا، پوینت بار
- (۲) لاجون، پهنه‌های جذر و مدب
- (۳) دریاچه، پوینت بار
- (۴) جزایر سدی (شول)، سابخا

۹۵- مطابق شکل زیر، نفت در چه نوع ساختاری تشکیل شده است؟



- (۱) نفت‌گیر چینه‌ای - گسلی
- (۲) نفت‌گیر گسلی
- (۳) نفت‌گیر تاقدیسی ساده
- (۴) نفت‌گیر ترکیبی گسل رشدی و تاقدیس غلطشی

۹۶- قرائت کدام نمودارها به هم نزدیک شوند، تراویده گل، عمق نفوذ جانبی بیشتری به داخل سازند دارد و در نتیجه تراوایی سازند بیشتر است؟

- (۱) LLD و LLS
- (۲) MSFL و LLD
- (۳) MSFL و LLS
- (۴) LLD و LLS

- ۹۷- کدام عبارت درست است؟

۱) تراوایی افقی به موازات مرز لایه‌بندی بیشتر است و بالا بودن نسبت تراوایی افقی به عمودی بیانگر وجود گسل در سازند است.

۲) تراوایی افقی به موازات مرز لایه‌بندی بیشتر است و بالا بودن نسبت تراوایی عمودی به افقی بیانگر وجود شکستگی در سازند است.

۳) تراوایی عمودی به موازات صفحه گسل‌ها بیشتر است و بالا بودن نسبت تراوایی افقی به عمودی بیانگر وجود شکستگی در سازند است.

۴) تراوایی افقی به موازات مرز لایه‌بندی بیشتر است و پایین بودن نسبت تراوایی عمودی به افقی بیانگر وجود شکستگی در سازند است.

- ۹۸- بخش عمده میادین نفت و گاز خاورمیانه در کدام بخش از حوضه رسویی زاگرس واقع شده‌اند؟

(۱) زاگرس مرتفع (HZ)

(۲) زاگرس چین‌خورده ساده (ZSFB)

(۳) فارس ساحلی

- ۹۹- مهم‌ترین سنگ مخزن‌های گازی کپه‌داغ کدام هستند؟

(۱) شمشک، شاتلیک، تیرگان

(۲) سوریجه و مزدوران

(۳) مزدوران، مبارک، چمن‌بید

- ۱۰۰- نسبت شوری گل حفاری به شوری آب سازند کدام باشد، نمودار SP سیگنال قوی‌تری تولید می‌کند؟

(۱) برابر

(۲) خیلی کمتر

(۳) خیلی بیشتر

- ۱۰۱- اگر پایه گل حفاری، روغنی (مانند گازوئیل) باشد، کدام رابطه در مورد نمودارهای مقاومت الکتریکی درست است؟

(۱) LLD > LLS > MSDL

(۲) MSFL > LLS > LLD

(۳) LLD > LLS = MSDL

(۴) MSFL = LLS > LLD

- ۱۰۲- اگر در آزمایش اندازه‌گیری فشار مویینگی برای چهار نمونه پلاگ A، B، C و D به ترتیب مقدار فشار مویینگی در اشباع ۳۵٪ از جیوه برابر ۵۰، ۴۷۰، ۴۷۰ و ۳۵۰ پیاس آی به دست آید، کدام نمونه دارای شعاع گلوگاه‌های تخلخل بزرگ‌تری است؟

D (۶) C (۳) B (۲) A (۱)

- ۱۰۳- منظور از فشار مخزن، کدامیک از فشارهای زیر است؟

(۱) روباره

(۲) هیدروستاتیک


- ۱۰۴- شکل مقابل چه نوع نفت‌گیری را نشان می‌دهد؟

(۱) نفت‌گیر چینه‌ای از نوع تغییر دیازنزی

(۲) نفت‌گیر چینه‌ای از نوع تغییر رخساره‌ای

(۳) نفت‌گیر توپوگرافی مدفون

(۴) نفت‌گیر چینه‌ای از نوع روی سطح ناپیوستگی




- با فرض یکسان بودن نوع سنگ، تراوایی، ضخامت و حجم به ترتیب مخزنی با کدام میزان درصد تخلخل و درصد آب اشباع شدگی و نوع ترشوندگی ارزش اقتصادی بیشتری دارد؟

- (۱) ۱۵، ۴۰، آب‌دوست
 (۲) ۱۵، ۴۰، نفت‌دوست
 (۳) ۵، ۲۰، آب‌دوست
 (۴) ۵، ۲۰، نفت‌دوست

- نفت در کدام جهت تنفس تکتونیکی مهاجرت می‌کند؟

- (۱) افقی بیشینه (σ_3)
 (۲) افقی کمینه (σ_2)
 (۳) عمودی (σ_1)
 (۴) زاویه ۴۵ درجه بین تنفس افقی کمینه و بیشینه

- گسل نشان داده شده در نقشه UGC زیر که باعث ایجاد فاصله بین خطوط تراز ساختمانی شده است، کدام نوع است؟



- (۱) قائم
 (۲) معکوس
 (۳) نرمال
 (۴) امتداد لغز

- در نقشه تراز ساختمانی مربوط به یک نفت‌گیر، قله تاقدیس، آخرین خط ترازی که هنوز به گسل نرسیده و آخرین خط تراز بسته ساختمانی به ترتیب در عمق‌های ۲۸۰۰ متر، ۲۹۵۰ متر و ۲۹۸۰ متر از زیر سطح آب دریا واقع شده‌اند. مقدار کلوژور این نفت‌گیر چند متر است؟

- (۱) ۳۰
 (۲) ۱۵۰
 (۳) ۱۸۰
 (۴) ۲۹۵۰

- در کدام حالت از نفت‌گیرهای گسلی، نفت‌گیری بیشتری حاصل می‌شود؟

- (۱) گسل نرمال، شیب لایه در جهت شیب گسل، ضخامت لایه‌ها بیشتر از جابجایی قائم
 (۲) گسل نرمال، شیب لایه جهت شیب گسل، ضخامت لایه‌ها بیشتر از جابجایی قائم
 (۳) گسل معکوس، شیب لایه در مخالف شیب گسل، جابجایی قائم کمتر از ضخامت لایه‌ها
 (۴) گسل نرمال، شیب لایه مخالف شیب گسل، جابجایی قائم بیشتر از ضخامت لایه‌ها

- نفت‌گیرهای «گند نمکی، کانالی، زیرسطح نایپوستگی، دیاژنزی» به ترتیب جزء کدام دسته از نفت‌گیرها هستند؟

- (۱) چینه‌ای، ساختمانی، ساختمانی، چینه‌ای
 (۲) ساختمانی، ساختمانی، چینه‌ای، چینه‌ای ثانویه
 (۳) ساختمانی، چینه‌ای اولیه، چینه‌ای، چینه‌ای ثانویه
 (۴) چینه‌ای، ساختمانی، چینه‌ای اولیه، چینه‌ای ثانویه

زئوشیمی:

- نسبت $_{\text{Pb}}^{204}/_{\text{Pb}}^{206}$ در کدام گروه از شاخانه‌ها کمتر است؟


- (۱) آهنجی
 (۲) سنگی - آهنجی
 (۳) کندrit‌ها
 (۴) آکندریت‌ها

- ۱۱۲- با توجه به ترکیب متوسط کندریت‌ها کدام کانی فراوان‌تر است؟
 ۱) الیوین ۲) پلازیوکلاز
 ۳) تروولیت ۴) پیژونیت
- ۱۱۳- فراوانی کیهانی کدام عنصر کمتر است?
 ۱) H ۲) He ۳) Fe ۴) Li
- ۱۱۴- تبدیل کدام ساختار، می‌تواند دلیل افزایش سریع چگالی و سرعت امواج لرزه‌ای در عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتری زمین باشد?
 ۱) گارنت به ایلمنیت
 ۲) گارنت به پروفسکیت
 ۳) الیوین فاز بتا به اسپینل
 ۴) الیوین به الیوین فاز بتا
- ۱۱۵- حضور روبيدیم، باریم و سرب در کانی‌های پتابسیم‌دار به ترتیب از راست به چه چگونه است?
 ۱) اسیر شده، اسیر شده، پذیرفته شده
 ۲) پذیرفته شده، اسیر شده، اسیر شده
 ۳) اسیر شده، پذیرفته شده، اسیر شده، پذیرفته شده
 ۴) پذیرفته شده، اسیر شده، اسیر شده، پذیرفته شده
- ۱۱۶- ترکیب میانگین پوسته ارائه شده توسط کلارک و واشنگتن کدام عناصر را نسبت به مطالعات رونوف و روشفسکی کمتر دارد?
 ۱) سدیم و پتابسیم ۲) کلسیم و منیزیم ۳) کلسیم و پتابسیم
 ۴) منیزیم و پتابسیم
- ۱۱۷- غلظت کدام عنصر در پوسته نسبت به گوشه کاهش زیادی نشان می‌دهد?
 ۱) آلومینیم ۲) سیلیسیم ۳) منیزیم
 ۴) منگنز
- ۱۱۸- عامل اصلی تعیین کننده ماهیت ژئوشیمیایی عناصر کدام است?
 ۱) فراوانی آنها در کیهان
 ۲) آرایش الکترونی اتم‌ها
 ۳) شرایط محیط شیمیایی
 ۴) نوع کانی‌هایی که تشکیل می‌دهند.
- ۱۱۹- آنتالیی با استفاده از کدام قانون ترمودینامیک و در کدام شرایط به دست می‌آید?
 ۱) قانون اول، فشار ثابت
 ۲) قانون اول، دما و فشار ثابت
 ۳) قانون سوم، دما و فشار ثابت
- ۱۲۰- در اعمق کم اگر SiO_2 یک سنگ متخلک از کلینوانتاسیتیت، آلبیت و ارتوکلاز به تدریج کاهش یابد، نخستین واکنشی که صورت می‌گیرد کدام است?
 ۱) آلبیت به نفلین
 ۲) ارتوکلاز به نفلین
 ۳) ارتوکلاز به لئوسیت
- ۱۲۱- عدد کئوردیناسیونی Si در کانی‌های استیشویت و کریستوبالیت به ترتیب از راست به چه چگونه است?
 ۱) ۴ و ۶ ۲) ۶ و ۴ ۳) ۶ و ۴ ۴) ۶ و ۴
- ۱۲۲- کدام عناصر با توجه به شباهت پتابسیل یونی به آلومینیم می‌توانند در بوکسیت جمع شوند?
 ۱) کوارتز ۲) کوئیزیت ۳) تریدیمیت ۴) کریستوبالیت
 ۱) Sc و Sr ۲) Sc و Ba ۳) Ga و Be ۴) Ga و Ba
- ۱۲۳- حضور کدام کانی در یک سنگ آذرین درونی، نشان‌دهنده تبلور ماقما در دمای زیر ۸۶۷ درجه سانتی‌گراد است?
 ۱) کوارتز ۲) کوئیزیت ۳) تریدیمیت ۴) کریستوبالیت
- ۱۲۴- در کدام شرایط محلول جامد کامل بین $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ و KAlSi_3O_8 به وجود می‌آید?
 ۱) دمای کم ۲) دمای بالا ۳) فشار کم ۴) فشار بالا
- ۱۲۵- مقدار منگنز در کدامیک از کانی‌های گروه الیوین بیشتر است?
 ۱) الیوین ۲) فایالیت ۳) فورستریت ۴) مونتی‌سیلیت

- ۱۲۶- در کدام شرایط از pH، انحلال پذیری آلومینیم زیاد ولی انحلال پذیری سیلیسیم کم است؟
 ۱) کمتر از ۴ ۲) ۸ تا ۱۰ ۳) ۱۰ تا ۱۲ ۴) ۴ تا ۸
- ۱۲۷- در شرایط بسیار اکسایشی، کدام فاز در تمام محدوده pH پایدار است?
 Mn_۳O_۴ (۴) MnO_۲ (۳) MnOOH (۲) Mn(OH)_۲ (۱)
- ۱۲۸- تمایل ۱۳C برای انباشت در کدام ترکیبات کربن - اکسیژن بیشتر است?
 ۱) زغال سنگ ۲) نفت دریابی ۳) نفت غیردریابی ۴) کربنات‌های دریابی
- ۱۲۹- کدام گازهای آتش‌نشانی در اوایل تشکیل زمین و هنگام تعادل با آهن آزاد غالباً بوده‌اند?
 H_۲, H_۲O, CO (۲) H_۲, N_۲, SO_۲ (۱)
 H_۲, H_۲O, SO_۲ (۴) H_۲, CO_۲, SO_۲ (۳)
- ۱۳۰- انباشت کدام عنصر طی تغليظ شیمیایی فرایندهای بیولوژیکی از آب دریا در گونه‌های میورکس (Murex) قابل ملاحظه است?
 Cu (۴) Br (۳) V (۲) I (۱)

سنگ‌شناسی:

- ۱۳۱- پارامترهای زیر مربوط به کدام دیاگرام دگرگونی است:
 Al_۲O_۳ + Fe_۲O_۳ - (Na_۲O + K_۲O)
 CaO - ۲/۳P_۲O_۵
 MgO + MnO + FeO
 A'FM (۴) AFK (۳) AFM (۲) ACF (۱)
- ۱۳۲- احتمال تشکیل کانی‌های کوئزیت و استیشوئیت از یک ماسه سنگ کوارتزدار در کدام نوع دگرگونی بیشتر است?
 ۱) پویا ۲) ضربه‌ای ۳) مجاورتی ۴) تدفینی
- ۱۳۳- شرایط لازم برای تشکیل اسکارن‌ها با کدام مورد مطابقت دارد?
 ۱) دمای کم، سیالات گرمابی، سنگ میزبان مارنی ۲) دمای کم، سیالات جوشی، سنگ میزبان رسی
 ۳) دمای متوسط، سیالات جوشی، سنگ میزبان رسی ۴) دمای زیاد، سیالات گرمابی، سنگ میزبان کربناتی
- ۱۳۴- ایزوگراد دگرگونی چیست?
 ۱) مرز بین زون‌ها و درجات دگرگونی ۲) بیشترین درجه دگرگونی در یک سرزمهین
 ۳) سنگ‌های هم‌ترکیب با درجه دگرگونی یکسان
- ۱۳۵- سنگی دارای لیناسیون است، در زیر میکروسکوپ (در مقطع نازک)، مشاهده کدام بافت در آن محتمل‌تر است?
 ۱) لپیدوبلاستیک ۲) گرانوبلاستیک ۳) نماتوبلاستیک ۴) پوئیکلوبلاستیک
- ۱۳۶- کدام نوع دگرگونی در بستر دریاباها عمومی‌تر است?
 ۱) همبری ۲) دینامیکی ۳) گرمابی ۴) تدفینی
- ۱۳۷- همه کانی‌ها در کالک سیلیکات‌ها معمول است، به جز:
 ۱) کیانیت ۲) اپیدوت ۳) کلسیت ۴) دیوپسید



۱۳۸- نام بافت سنگ آذرین در شکل کدام است؟

- ۱) اورتوفیری
- ۲) ویتروفیری
- ۳) اکسیولیتی
- ۴) واریولیتی

۱۳۹- ترکیب پوسته قاره‌ای و پوسته اقیانوسی به ترتیب بیشتر از کدام نوع و با کدام ماهیت هستند؟

- ۱) گرانیت آلکالن، بازالت کالکوآلکالن
- ۲) گرانودیوریت کالکوآلکالن، گابروی آلکالن
- ۳) تونالیت کالکوآلکالن، بازالت تولنیتی
- ۴) گرانودیوریت آلکالن، پریدوتیت آبیسال آلکالن

۱۴۰- مناسب‌ترین روش طبقه‌بندی سنگ‌های آتشفسانی کدام است؟

- ۱) مودال
- ۲) بافتی
- ۳) شیمیابی
- ۴) کانی‌شناسی

۱۴۱- در کدام‌یک از حالات، اختلاط دو ماقما آسان‌تر است؟

- ۱) اسیدی، بازی
- ۲) حد واسط، حد واسط
- ۳) اسیدی، اسیدی
- ۴) بازی، بازی

۱۴۲- سنگ‌هایی با ترکیب $\text{Al}_2\text{O}_3 < \text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} < \text{CaO}$ چه قربانی دارند؟

- ۱) متاآلومین
- ۲) پرآلومین
- ۳) ساب آلومین
- ۴) پرآلکالن

۱۴۳- در ذوب جزء به جزء (Fractional Melting) لرزولیت (lherzolite)، تغییرات به چه صورت خواهد بود؟

- ۱) کلینوپیروکسنیت → پیروکسن گابرو → دیوریت
- ۲) لرزولیت → پیروکسنیت → دیوریت
- ۳) لرزولیت → پیروکسنیت → گابرو
- ۴) کلینوپیروکسنیت → اورتوپیروکسنیت → دونیت

۱۴۴- به شیشه سنگ غنی از SiO_2 با بیش از ۱۰٪ آب چه اطلاق می‌شود؟

- ۱) پرلیت
- ۲) ابسیدین
- ۳) پیچستون
- ۴) تاکیلیت

۱۴۵- گسترش تخلخل شبکه‌ای (Fenestral) در کدام گروه از سنگ‌های رسوبی زیر متدائل‌تر است؟

- ۱) میکریت‌های محیط لagon
- ۲) گل سنگ‌های منطقه بین کشندي
- ۳) شیل‌های محیط پاشنه دلتا
- ۴) گل سنگ‌های محیط فراکشنده

۱۴۶- یک توالی قائم از سنگ‌های رسوبی خشکی‌زاد شامل کنگلومرا، ماسه سنگ خیلی درشت، ماسه سنگ درشت و ماسه سنگ متوسط (به ترتیب از پایین به بالا) در دسترس است. در صورت یکسان‌بودن سایر مشخصه‌های بافتی تغییرات تخلخل کل اولیه در طول این توالی چگونه است؟

- ۱) از پایین به بالا افزایش می‌یابد.
- ۲) از پایین به بالا کاهش می‌یابد.
- ۳) تغییرات تخلخل ماهیت سینوسی دارد.
- ۴) در طول توالی تقریباً یکسان است.

۱۴۷- کدام جزء سنگ رسوبی خشکی‌زاد در تعیین خاستگاه نقش بیشتری دارد؟

- ۱) ترکیب شیمیابی
- ۲) ترکیب کانی‌شناسی
- ۳) مشخصات بافتی
- ۴) ساختهای رسوبی اولیه

- ۱۴۸- موضوع علم پترولوزی سنگ‌های رسوبی کدام است؟
- (۱) نحوه تشکیل، حیات و ممات سنگ
 - (۲) مطالعه سیمان، چارچوب و خمیره
 - (۳) بررسی بافت، ساخت و ترکیب
 - (۴) علم پترولوزی مختص سنگ‌های آذرین و دگرگونی است.
- ۱۴۹- کدام گزینه برای سنگ‌های رسوبی مت Shank از ذرات درشت تر از ۲ میلی‌متر مناسب تر است؟
- (۱) گراولستون
 - (۲) برش
 - (۳) کنگلومرا
 - (۴) روداسه
- ۱۵۰- با فرض ناچیز بودن عوارض دیاژتیک (سیمانی شدن، انحلال، تراکم و ...) کدام گروه از سنگ‌های زیر شرایط مستعدتری برای سنگ مخزن نفت دارند؟
- (۱) کوارتز ارتایت
 - (۲) پاراکنگلومرا
 - (۳) ارتوکنگلومرا
 - (۴) آركوز

دیرینه‌شناسی:

- ۱۵۱- کدام گروه برای تعیین سن رسوبات اردوبیین مناسب تر هستند؟
- (۱) آمونوئیدها
 - (۲) اسکلراکتینیدها
 - (۳) تریلوبیت‌ها
 - (۴) گاستروپودا
- ۱۵۲- کدام ویژگی در اسفنج‌ها، آرکتوسیاتا و نیداریا شبیه است؟
- (۱) دیس اپیمنت
 - (۲) سپتا
 - (۳) دیواره منفذدار
 - (۴) حفره مرکزی
- ۱۵۳- منقار یا نوک، مشخص کننده کدام است؟
- (۱) موقعیت عقبی صدف پلسی‌پودا
 - (۲) بخش جلویی صدف پلسی‌پودا
 - (۳) موقعیت عقبی صدف برآکیوپودا
 - (۴) بخش جلویی صدف برآکیوپودا
- ۱۵۴- کدام تریلوبیت‌ها ایزوپیج (Isopygous) هستند؟
- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Phacops, Ectillaneous</i> (۲) | <i>Calymene, Olenus</i> (۱) |
| <i>Phillipsia, Agnostus</i> (۴) | <i>Paradoxides, Olenelus</i> (۳) |
- ۱۵۵- کدام ویژگی در *Neocomites* و *Oppelia* مشابه است؟
- (۱) خط درز از نوع آمونیتی
 - (۲) تزئینات بسیار برجسته از نوع ریب
 - (۳) مقطع پیچش از نوع اکسی‌کن
 - (۴) فقدان keel
- ۱۵۶- در کدام زمان آمونوئیدها بیشترین تنوع را داشتند؟
- (۱) کربنیfer
 - (۲) تریاس
 - (۳) ژوراسیک
 - (۴) پالئوسن
- ۱۵۷- کدامیک، بهترین راه تشخیص *Echinolampas* از *Schizaster* است؟
- (۱) موقعیت دهان و تحدب سطح دهانی
 - (۲) شکل مناطق اینترامبولاکرایی و صفحات آکولار
 - (۳) موقعیت مخرج و شکل کرونا
 - (۴) پری‌پروکت و موقعیت صفحه مادرپوریت
- ۱۵۸- کدامیک برای مطالعه و تشخیص جنس‌های استراکد به کار می‌رود؟
- (۱) کاراپاس کامل
 - (۲) برش‌های میکروسکوپی کاراپاس
 - (۳) برش‌های طولی و محوری کاراپاس
 - (۴) برش‌های عرضی و استوایی کاراپاس
- ۱۵۹- کدام گروه برای مطالعه و تعیین سن رسوبات دریایی دونین مناسب تر است؟
- (۱) استراکدها
 - (۲) دیاتومه‌ها
 - (۳) کالپیونلیدها
 - (۴) کنودونتها

- ۱۶۰- کدام گروههای فسیلی در محیط آب شیرین نیز حضور داشتند؟
- (۱) رادیولرها، روزن‌داران
 - (۲) دیاتومه‌ها، استراکدها
 - (۳) کوکولیتوفرها، کنودونت‌ها
 - (۴) جلبک‌های سبز، کنودونت‌ها
- ۱۶۱- بقایای فسیلی کدام گروه به عنوان بخش کوچکی از سیستم تغذیه جاندار به شمار می‌روند؟
- (۱) الیگوسترینید
 - (۲) داینوفلازله
 - (۳) کنودونت
 - (۴) کیتینوزوا
- ۱۶۲- کدام گروههای فسیلی در مناطق عمیق دریابی نیز مشاهده می‌شوند؟
- (۱) الیگوسترینیدها، کنودونت‌ها
 - (۲) رادیولرها، روزن‌داران
 - (۳) رادیولرها، جلبک‌های قرمز
 - (۴) کنودونت‌ها، استراکدها
- ۱۶۳- کدام روزن‌داران شاخص‌تر بوده و محدوده سنی کوتاه‌تری دارند؟
- | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <i>Orbitolina</i> (۴) | <i>Earlandia</i> (۳) | <i>Dictyoconus</i> (۲) | <i>Textularia</i> (۱) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
- ۱۶۴- کدام مورد برای تفکیک جنس‌های روزن‌داران در زیر راسته فوزولینینا از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
- (۱) دهانه و پیچش
 - (۲) دهانه و ترکیب شیمیایی دیواره
 - (۳) ساختار دیواره و ساختمان داخلی
 - (۴) ترکیب شیمیایی دیواره و ساختمان داخلی
- ۱۶۵- جنس‌های روزن‌داران با پوسته آگلوتینه کدام زمان، برای تعیین سن، از اهمیت بیشتری برخوردارند؟
- (۱) کربونیفر
 - (۲) پرمین
 - (۳) کرتاسه
 - (۴) نئوزن
- ۱۶۶- برای تشخیص، کدام جنس از روزن‌داران نیاز به بررسی ساختمان داخلی است؟
- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| <i>Orbitoides</i> (۴) | <i>Orbulina</i> (۳) | <i>Hedbergella</i> (۲) | <i>Nodosaria</i> (۱) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
- ۱۶۷- دهانه برای تفکیک و تشخیص بین کدام دو روزن‌دار نقش کلیدی دارد؟
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Climacammina, Deckerella</i> (۲) | <i>Assilina, Nummulites</i> (۱) |
|-------------------------------------|---------------------------------|
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Schwagerina, Endothyra</i> (۴) | <i>Orbitolina, Dictyoconus</i> (۳) |
|-----------------------------------|------------------------------------|
- ۱۶۸- کدام روزن‌دار در مجموعه *Omphalocyclus, Orbitoides, Siderolites, Involutina* نایرجا است؟
- | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Omphalocyclus</i> (۴) | <i>Siderolites</i> (۳) | <i>Orbitoides</i> (۲) | <i>Involutina</i> (۱) |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
- ۱۶۹- کدام روزن‌داران شناور و غالباً فاقد پیچش هستند؟
- | | |
|------------------------------------|--|
| <i>Textularia, Heterohelix</i> (۲) | <i>Heterohelix, Pseudotextularia</i> (۱) |
|------------------------------------|--|
- | | |
|--|--|
| <i>Pseudotextularia, Earlandia</i> (۴) | <i>Hedbergella, Pseudotextularia</i> (۳) |
|--|--|
- ۱۷۰- کدام مجموعه از ویزگی‌ها، برای شناسایی *Globigerina* از اهمیت بیشتری برخوردارند؟
- (۱) دهانه، سپتوم، خط درز
 - (۲) پیچش، دهانه، شکل حجرات
 - (۳) تزئینات، پیچش، حجره اولیه
 - (۴) شکل پوسته، تزئینات، دهانه
- زمین‌شناسی مهندسی:
- ۱۷۱- اگر بر یک توده اشباع خاک ریزدانه (مثلاً رس) تنش جدیدی وارد شود، بلافاصله فشار آب حفره‌ای و تنش مؤثر به ترتیب چگونه تغییر می‌کنند؟
- (۱) کم - زیاد
 - (۲) زیاد - کم
 - (۳) کم - کم
 - (۴) زیاد - بدون تغییر

- کدام مورد، درست است؟ ۱۷۲

- ۱) خاک باقیمانده برای ساخت‌وساز جاده و راه‌آهن مناسب نیست.
- ۲) خاک آبرفتی به طور این‌می‌تواند پی ساختمان‌ها یا سدها را تشکیل دهد.
- ۳) خاک‌های باقیمانده و آبرفتی را می‌توان پس از اتخاذ تدبیر مناسب براساس نیازهای طراحی برای ساخت راه‌ها، خطوط ریلی، باند فرودگاه‌ها و سدها استفاده کرد.
- ۴) خاک باقیمانده با پلاستیسیته متوسط و نفوذپذیری زیاد، شرایط پی مطلوبی را برای یک سد خاکی فراهم می‌کند.

- در آزمایش سه محوری CD، مقدار $\frac{\sigma_3}{\sigma_1}$ به ترتیب در شروع آزمایش و در خاتمه (هنگام گسیختگی) برابر با کدام است؟ ۱۷۳

$$\tan^2(45 - \frac{\Phi}{2}) \quad (2)$$

$$1 + \sin \varphi \quad (4)$$

$$\tan^2(45 + \frac{\Phi}{2}) \quad (1)$$

$$\tan^2(45 - \frac{\Phi}{2}) \quad (3)$$

- کدام مصالح به ترتیب از راست به چپ برای احداث پوسته، هسته و فیلتر سدهای خاکی الویت دارند؟ ۱۷۴

CL.GW.SM (۴) SM,CL.GW (۳) GW,CL.SM (۲) GW.SM,CL (۱)

- دو خاک اشباع ماسه‌ای SP به ترتیب با مقدار نسبت پوکی $e_1 = 0/8$ و $e_2 = 0/3$ و چگالی ذرات $G_{s1} = 2/7 \frac{g}{cm^3}$ و $G_{s2} = 2/45 \frac{g}{cm^3}$ در دست است. در شرایط یکسان احتمال وقوع پدیده جوشش (Boiling) در کدام خاک بیشتر است؟ ۱۷۵

(۲) خاک ۲

(۱) خاک ۱

(۴) اطلاعات کافی نیست.

(۳) بستگی به ساختمان خاک دارد.

- همه موارد برای بررسی مصالح قرضه کاربرد دارد، به جز:

(۱) درصد آب جذب شده، دانه‌بندی

(۳) مقاومت فشاری، شاخص سطح ذرات

(۲) مقاومت سه محوری، سرعت موج

(۴) سایش لوس‌آنجلس، شاخص ارزش ماسه‌ای

- مهم‌ترین مزایای استفاده از سدهای زیرزمینی نسبت به سدهای معمولی کدام است؟ ۱۷۶

- ۱) عدم نیاز به نگهداری، هزینه کمتر
- ۲) کاهش میزان تبخیر، آلودگی کمتر آب ذخیره شده
- ۳) کاهش تبخیر، حجم ذخیره زیاد
- ۴) هزینه کمتر، مناسب برای تمامی شرایط زمین‌شناسی

- همه سدها برای مناطق لرده خیز مناسب هستند، به جز:

(۱) سنگریزهای

(۲) خاکی

(۳) لاستیکی

(۴) بتنی وزنی

- مسئله روانگرایی در محل احداث همه سدها مطرح است، به جز:

(۱) سنگریزهای

(۲) خاکی

(۳) قوسی

(۴) وزنی

- درخصوص نمونه خاکی معرف (Representative) کدام عبارت درست است؟ ۱۸۰

- ۱) اندازه دانه‌های چسبنده همانند نمونه واقعی باشد.
- ۲) محتويات مواد آلی معرف توده خاک محلی باشد.
- ۳) اندازه دانه‌های غیرچسبنده همانند نمونه واقعی باشد.
- ۴) دست‌خورده یا دست‌نخورده آن معرف توده خاک محلی باشد.

- ۱۸۱ - ۱۰۰ گرم ماسه خشک داخل پیکنومتری قرار داده شده و پیکنومتر با آب پر می‌شود. جرم پیکنومتر پر شده با آب و خاک

۷۰۰ گرم است. چنانچه جرم پیکنومتر پر شده با آب ۶۳۷ گرم باشد، چگالی دانه‌های جامد ماسه چند $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ است؟

(۱) ۲/۷۰ (۲) ۲/۶۰ (۳) ۲/۵۰ (۴) ۲/۴۰

- ۱۸۲ - کدام عبارت، علت خاصیت خمیری خاک‌های رسی را توضیح می‌دهد؟

(۱) کوچک بودن سطح مخصوص دانه‌های رس و قطبی بودن مولکول‌های آب

(۲) بزرگ بودن سطح مخصوص دانه‌های رس و قطبی بودن مولکول‌های آب

(۳) بزرگ بودن سطح مخصوص دانه‌های رس و تمرکز یون‌های مثبت در سطح کانی‌ها

(۴) کوچک بودن سطح مخصوص دانه‌های رس و تمرکز یون‌های مثبت در سطح کانی‌ها

- ۱۸۳ - کدامیک از روابط درست است؟

$$\gamma_w G_s e = \gamma_d n \quad (۲) \quad \gamma_d = \frac{\gamma_s}{1+n} \quad (۱)$$

$$A = n(1 - S_f) \quad (۴) \quad \gamma_{sat} = \gamma_d + e\gamma_w \quad (۳)$$

- ۱۸۴ - چگالی خاکی در حالت طبیعی $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} ۱/۵$ است. در اثر بارندگی رطوبت خاک ۵۰% نسبت به رطوبت اولیه افزایش

یافته و در این حالت چگالی خاک به $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} ۲$ رسیده است. رطوبت اولیه خاک چند درصد بوده است؟


(۱) ۱۶ (۲) ۱۸ (۳) ۲۰ (۴) ۲۲

- ۱۸۵ - در یک خاک با $G_s = ۲/۵$ و رطوبت ۲۰ درصد، حداقل چگالی خشک خاک که طی عمل تراکم و بدون تغییر


در میزان رطوبت حاصل می‌شود، چند تن بر مترمکعب است؟ (چگالی آب را یک تن بر مترمکعب در نظر بگیرید).

(۱) ۱/۶۶ (۲) ۱/۷۵ (۳) ۱/۸۶ (۴) ۱/۹۵

- ۱۸۶ - منحنی دانه‌بندی یک نمونه خاک مطابق شکل زیر است. اگر حد روانی و نشانه خمیری بخش ریزدانه خاک به ترتیب برابر ۴۰ و ۲۰ باشند، در آن صورت نام خاک طبق سیستم طبقه‌بندی متعدد کدام است؟



۱۸۷- منحنی دانه‌بندی دو نمونه خاک ماسه‌ای نسبتاً یکنواخت در شکل زیر نشان داده شده است. نفوذپذیری خاک (یک) تقریباً چند برابر نفوذپذیری خاک (دو) است؟




- ۱) $\frac{1}{16}$
- ۲) $\frac{1}{4}$
- ۳) 4
- ۴) 16

۱۸۸- فشار آب منفذی در نقطه A شکل زیر چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی آب را 1 g/cm^3 در نظر بگیرید).

$$\left(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}, H = 10 \text{ m}, L = 6 \text{ m}, B = 0.4 \text{ m} \right)$$

- ۱) ۴۹
- ۲) ۶۹
- ۳) ۹۹
- ۴) ۱۰۹



۱۸۹- تغییرات نسبت تخلخل، درصد رطوبت، درجه اشباع و چگالی خشک خاک در حین آزمایش تحکیم یک بعدی به ترتیب چگونه است؟

- ۱) کاهشی - ثابت - افزایشی - کاهشی
- ۲) کاهشی - افزایشی - ثابت - افزایشی
- ۳) کاهشی - افزایشی - ثابت - کاهشی
- ۴) ثابت - کاهشی - کاهشی - افزایشی

۱۹۰- اگر مقاومت فشاری محصور نشده برای یک خاک رس معادل 150 کیلوپاسکال باشد، زمانی که این خاک در شرایط آزمایش سه محوری تحکیم نیافته زهکش نشده با فشار همه‌جانبه 250 کیلوپاسکال قرار گیرد، با چه تنش قائمی بر حسب کیلوپاسکال گسیخته خواهد شد؟

- ۱) ۱۰۰
- ۲) ۲۰۰
- ۳) ۳۰۰
- ۴) ۴۰۰

زمین‌شناسی ساختاری:

۱۹۱- ضخامت بیرون‌زدگی لایه‌های سنگی بر روی نقشه‌ای از سطح زمین بدون پستی و بلندی به کدام ویژگی لایه بستگی دارد؟

(۲) مقدار شیب

(۴) ضخامت در راستای شاقول

(۱) شیب توپوگرافی

(۳) جهت شیب

۱۹۲- کدام عبارت، چین نوع Overturned را معرفی می‌کند؟


(۱) دو یال آن در جهت خلاف هم شیب دارند.

(۲) الزاماً دو یال آن به موازات همدیگر هستند.

(۳) دو یال آن به سمت مشابهی شیب دارند.

(۴) الزاماً امتداد دو یال آن متقطع باشد.

۱۹۳- در شکل زیر، کدام نوع سازوکار چین خوردگی را نشان می‌دهد؟



(۱) غلتیده

(۲) برشی

(۳) خمشی برشی

(۴) خمشی لغزشی

۱۹۴- چنانچه ریک بردار لغزش یک گسل ۴۵ درجه باشد، کدام عبارت درست است؟

(۱) گسل شیب لغز بوده و از نوع نرمال است.

(۲) مؤلفه جابه‌جایی افقی گسل بزرگتر از مؤلفه شیب لغز است.

(۳) گسل مورب لغز بوده و مؤلفه امتداد لغز و مؤلفه شیب لغز آن با هم برابر است.

(۴) چون جهت زاویه ریک مشخص نشده است، شناسایی امکان‌پذیر نیست.

۱۹۵- در طبقه‌بندی چین‌ها بر مبنای خطوط هم شیب (dip isogon) کدام رده را چین‌های موازی گویند؟

(۴) ۳


(۳) ۱۰

(۲) ۲

(۱) ۱b

۱۹۶- در نقشه مقابله موقعیت فضایی (Attitude) لایه N برابر است با :

(جهت شمال به سمت بالای نقشه و مقیاس نقشه ۱:۲۰۰۰۰ است.)



(۱) 50,15 NW

(۲) 100,15 NE

(۳) 050,90 NW

(۴) 100,90 NE

۱۹۷- با توجه به نوع ارتباط کلیواز اسلیتی با ساخت منطقه‌ای، اگر شیب سطح لایه‌بندی و کلیواز در جهت عکس یکدیگر

باشند، به ترتیب نوع لایه‌بندی و جهت محور ناویدیس کدام خواهند بود؟


(۲) برگشته، عکس شیب لایه‌ها

(۱) عادی، شیب لایه‌ها

(۴) برگشته، شیب لایه‌ها

(۳) عادی، عکس شیب لایه‌ها

- ۱۹۸- نقشه زمین‌شناسی زیر، وضعیت گسترش یک لایه زغال سنگی را نشان می‌دهد. کدام عبارت اطلاعات درست‌تری برای حفاری چاه اکتشافی در نقاط ۱ و ۲ ارائه می‌دهد؟




۱) چاه‌های ۱ و ۲ در عمق مشابه به لایه زغال برخورد می‌کنند.

۲) چاه‌های ۱ و ۲ به لایه زغال برخورد نمی‌کند.

۳) چاه ۲ نسبت به چاه ۱ در عمق بیشتری به لایه زغال برخورد می‌کند.

۴) چاه ۲ نسبت به چاه ۱ در عمق کمتر به لایه زغال برخورد می‌کند.

- ۱۹۹- شکل (a) تصویر استریوگرافی از تمرکز قطب صفحات لایه‌بندی (Contour diagram) مربوط به یک سطح چین‌خورده را نشان می‌دهد. کدام یک از گزینه‌های نشان دهنده پروفیل سطح چین‌خورده مربوط به این دیاگرام است؟




- ۲۰۰- مهم‌ترین ساختارهای نقشه مقابله کدام است؟

۱) ۵ لایه، یک گسل و یک دگرشیبی

۲) یک دگرشیبی، ۲ چین و ۴ لایه

۳) یک چین، یک گسل و ۲ دگرشیبی

۴) یک گسل، ۲ دگرشیبی و ۵ لایه



- ۲۰۱- کدام عبارت، در مقایسه بین مایعات و جامدات درست است؟

۱) جامدات قادر مقاومت برشی هستند.

۲) مایعات قادر مقاومت برشی هستند.

۳) جامدات و مایعات قادر مقاومت برشی هستند.

۴) جامدات و مایعات مقاومت برشی دارند.

- ۲۰۲- بر روی صفحه گسلی با موقعیت S55W, 40NW میزان پلاتج (میل) خش خط (Slickenline) می‌تواند همه مقادیر

زیر باشد، به جز:

۴۰ (۴)

۰۵ (۳)

۴۵ (۲)

۰۰ (۱)

- ۲۰۳- اگر در یک سیستم تنش دو بعدی $\sigma_2 = 200 \text{ kb}$ و $\sigma_1 = 100 \text{ kb}$ باشد، شعاع و مرکز دایره مور بر حسب kb به ترتیب کدام است؟

- (۱) 15° و 100
 (۲) 100 و 300
 (۳) 15° و 50°
 (۴) 300 و 100



- ۲۰۴- چه نوع شکستگی بر اثر پیامدهای بعد از فشار می‌تواند در سنگ شکل بگیرد؟ این نوع شکستگی چه زاویه‌ای بر حسب درجه با جهت تنش اصلی می‌سازد؟

- (۱) رهایی - 90°
 (۲) برشی - 45°
 (۳) برشی - 30°
 (۴) کششی - صفر

- ۲۰۵- کدام گسل به تنش کمتری جهت تشکیل، نیاز دارد؟ (با شرایط لیتولوژی و عمقی یکسان)

- (۱) معکوس
 (۲) مورب لغز
 (۳) امتداد لغز
 (۴) عادی


- ۲۰۶- با توجه به ساختارهای شکل (a)، بیضی کرنش تنها یک کدام است؟



- ۲۰۷- همه عبارت‌ها در خصوص فشار سیال منفذی درست است، به جز:


- (۱) بر تنش برشی بی‌اثر است.
 (۲) بر تنش نرمال تأثیرگذار است.
 (۳) با افزایش عمق دفن توده سنگی، کاهش می‌یابد.
 (۴) باعث بی‌اثر کردن و کاهش فشار همه جانبه می‌شود.

- ۲۰۸- نام ساختار رو به رو کدام است؟



- (۱) گسل‌های دومینو
 (۲) گسل‌های نرمال
 (۳) گل ساخت مثبت
 (۴) گل ساخت منفی

- ۲۰۹- نمودار زیر مربوط به کرنش در دو بعد است. در کدام میدان افزایش مساحت ایجاد می‌شود؟



- ۲۱۰ - کدام یک از چینه‌های زیر مشخصاً در پهنه‌های برشی تشکیل می‌شوند؟
- (۱) جدایشی
 - (۲) نیامی
 - (۳) انتشار گسلی
 - (۴) خم گسلی

چینه‌شناسی:

۲۱۱ - در مطالعات سنگ‌چینه‌نگاری برای کدام مورد باید مقطع چینه‌شناسی تیپ معرفی کرد؟

Member (۴)	Series (۳)	Beds (۲)	Bed (۱)
------------	------------	----------	---------

۲۱۲ - نام‌گذاری کدام زمان، بر پایه تفاوت رخساره‌ها است؟

- (۱) کامبرین
- (۲) اردویسین
- (۳) تریاس
- (۴) زوراسیک

۲۱۳ - در تقسیم‌بندی چینه‌ها به واحدهای کرونوستراتیگرافی کدام مورد اهمیت نسبی بیشتری دارد؟

- (۱) رویدادهای زمین‌ساختی بزرگ مقیاس
- (۲) رخدادهای انقراض جمعی و کاهش فراوانی بایوتا
- (۳) رخدادهای ماقم‌تیسم و دگرگونی بزرگ مقیاس
- (۴) شواهد فیزیکی، شیمیایی و محتوی فسیلی طبقات

۲۱۴ - کدام عبارت درست است؟


- (۱) زمان بین قدیمی‌ترین و جوان‌ترین افق‌های فسیل‌دار در یک واحد سنگ‌چینه‌ای معرف یک واحد لیتوستراتیگرافی غیررسمی است.

(۲) برای تعیین سن دقیق به روش FTD Pb حاصل از واپاشی اورانیوم پراکندگی تقریباً یکنواختی در شبکه بلورین کانی‌هایی مانند مسکوویت داشته باشد.

(۳) تبدیل واحدهای لیتوستراتیگرافی غیررسمی به رسمی امکان‌پذیر بوده و منوط به شناسایی دقیق ویژگی‌های زیست‌چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی طبقات است.

(۴) کرونوزون واحد چینه‌شناسی رسمی، و معرف نهشته‌های تشکیل‌شده در فاصله زمان ظهرور تا ناپدیدشدن یک فرم یا گروه فسیلی بوده که ترجیحاً در رسوبات دریایی تعریف می‌شود.

۲۱۵ - همه موارد برای شکل زیر درست است، به جز:



- (۱) ممکن است بافت دولبریتی داشته باشد.

- (۲) امکان وجود قطعاتی از A در B منتفی است.

- (۳) مرز B با D ناپیوستگی نانکانفرمیتی است.

- (۴) ممکن است قطعاتی از C و D در A وجود داشته باشند.

۲۱۶ - همه موارد از ویژگی‌های دیاستم هستند، به جز:

- (۱) وجود آثار معرف عملکرد جریانات آشفته

- (۲) شباهت رسوبات بالا و پایین سطح چینه‌بندی

- (۳) امکان تشکیل در نهشته‌های آواری، کربناته و تبخیری

- (۴) وجود پیوستگی پیوسته‌نما در امتداد سطح چینه‌بندی

- در یک توالی چینه‌شناسی، تکرار کدام یک معرف دگرگشکلی و ناپایداری تکتونیکی است؟

۲۱۷ - Paraconformity (۴) Disconformity (۳) Palaeorelief (۲) Diastem (۱)

۲۱۸ - کدام گروه‌های فسیلی، به ترتیب، برای بیوستراتیگرافی نهشته‌های دریایی آواری دانه‌ریز و کربناته بالثوزوئیک زیرین مناسب‌ترند؟

- (۱) گراپتولیت‌ها، کونودونت‌ها

- (۲) جلبک‌ها، فوزولینیدها

- (۳) آرکنوسیاتیدها، فرامینیفرها

- کدام مورد در تفسیر شرایط محیط رسوبی اهمیت نسبی بیشتری دارد؟

Skip mark (۴) Graded bedding (۳) Flute mark (۲) Mud crack (۱)

- کدام عبارت درست است؟


(۱) فوزولینیدها در عصر لوپینگین، (از تقسیمات دور پرمین میانی) ناپدید شدند.

(۲) جنس *Nummulites* در منطقه زاگرس، در پایان دوره الیگوسن ناپدید شدند.


(۳) نهشته‌های تشکیل شده در عصر ایفلین یکی از تقسیمات سیستم دونین است.

(۴) یکی از گسترده‌ترین پیشروی‌های دریا در تاریخ زمین، در سیستم کرتاسه میانی روی داده است.

- تقسیم‌بندی زمان زمین‌شناسی در کدام نمودار دقیق‌تر نشان داده شده است؟



- کدام عبارت برای شکل زیر درست است؟




(۱) شواهد مربوط به رخداد یک مرحله خشکی‌زایی و دو فاز کوه‌زایی دیده می‌شوند.

(۲) در زیر کنتاکت گسله، طبقات پالئوزوئیک بالایی در یال برگشته یک تاقدیس دیده می‌شوند.

(۳) شواهد مربوط به رخداد دو مرحله خشکی‌زایی و یک فاز کوه‌زایی دیده می‌شوند.

(۴) در زیر سطح ناپیوستگی فرسایشی، طبقات پالئوزوئیک زیرین در یال یک ناویدیس دیده می‌شوند.

- به ترتیب کدام عبارت‌ها یا اصطلاحات، شرایط تشکیل پدیده‌های A و B را توضیح می‌دهند؟



Channel mark .Pediplain (۱)

Disconformity .Peneplain (۲)

(۳) حاصل تاثیر انرژی جریان اجسام خارجی، نتیجه عملکرد انرژی امواج

(۴) فرسایش سطح چینه‌بندی رسوبات و سنگ‌ها، به تعادل رسیدن نهشته‌های حاصل رسوب‌گذاری سریع

- در کدام مورد، زیر سطح ناپیوستگی ممکن است، بازالت وجود داشته باشد؟

Nonconformity (۱) Paraconformity (۲) Disconformity (۳) Diastem (۴)


- در شکل زیر، مهم‌ترین فسیل شاخص در کدام طبقات دیده می‌شود؟

Outcrop 1	Outcrop 2	Outcrop 3	
Permian X	Devonian ○	Permian △ X	Silurian (۱)
Pennsylvanian X △	Silurian △	Pennsylvanian △ X	Permian (۲)
Mississippian X	Ordovician □	Devonian ○ △	Devonian (۳)
Devonian ○ □	Cambrian ☆	Silurian △	Pennsylvanian (۴)

- در شکل زیر، برای تعریف Concurrent range biozone کدام دو فسیل را انتخاب می‌کنید؟



- با توجه به شکل زیر، کدام عبارت درست است؟



(۱) قدیمی‌تر از A، کنタکت O با G و U با A نانکانفرمیتی

(۲) قدیمی‌تر از X، بین D و P دو رخداد کوزایی و یک رخداد خشکی‌زایی روی داده است.

(۳) اگر B گنیس باشد، پنج مرحله خروج از آب و فرسایش روی داده است، بین E و N به ترتیب L، K، و Q قرار دارند.

(۴) اگر B کوارتریت باشد، شش مرحله خروج از آب و فرسایش روی داده است، بین V و W به ترتیب T، A، و Z قرار دارند.


- در شکل زیر به ترتیب قدیمی‌ترین و جدیدترین نهشته کدامند؟

(۱) شیل تریلوبیت‌دار، ماسه‌سنگ و نهشته‌های یخچالی


(۲) ماسه‌سنگ خاکستری، نهشته‌های یخچالی

(۳) کنگلومرا، آهک فسیل‌دار

(۴) شیل، شیل سیاه‌رنگ




- ۲۲۹- در شکل زیر، احتمال وجود قطعاتی از کدام لایه یا توده درون لایه یا توده دیگر منتفی است؟



۱) A در H و E
۲) K در D و C
۳) C در H و G
۴) D در I و C

- ۲۳۰- در شکل زیر، اگر H اسلیت باشد، کدام عبارت درست است؟



- ۱) ممکن است قطعاتی از K در A وجود داشته باشند، امکان وجود قطعاتی از H در E منتفی است.
- ۲) ممکن است قطعاتی از H در A وجود داشته باشند، در امتداد M و O دو نوع ناپیوستگی دیده می‌شود.
- ۳) قدیمی‌ترین رویداد قبل استنباط تشکیل سنگ مادر H است، ممکن است قطعاتی از A در G وجود داشته باشند.
- ۴) شواهد مربوط به دو نانکانفرمیتی، دو رخداد کوهزایی، و یک فاز فرسایشی وجود دارند، پیش از O منطقه تحت رژیم کششی قرار داشت.

زمین‌شناسی اقتصادی:

- ۲۳۱- همه کانی‌های زیر در شرایط فوگاسیته بالای اکسیژن تشکیل می‌شوند، به جزء:

- ۱) فلوئوریت
- ۲) مگنتیت
- ۳) پیروتیت
- ۴) باریت

- ۲۳۲- کدام پارامتر نقش مهم‌تری در ورود N به ساختمان سیلیکات‌ها دارد؟

- ۱) دما
- ۲) pH
- ۳) غلظت H_2S
- ۴) فوگاسیته اکسیژن

- ۲۳۳- کدام یک از بافت‌های زیر، مشخصه اصلی کانسارهایی است که در مناطق سطحی تشکیل می‌شوند؟

- ۱) کلوئیدی
- ۲) پرکننده فضای خالی
- ۳) جانشینی
- ۴) رگهای

- ۲۳۴- کماتیت‌ها، ماغماهای الترامافیک با بیش از ۱۸ درصد هستند.

- ۱) آندزیتی، O
- ۲) آندزیتی، CaO
- ۳) بازالتی، CaO
- ۴) بازالتی، MgO

- ۲۳۵- در فرایند جوشش کانسارهای اپیترمال، با افزایش شوری و مواد فرار دمای جوشش چه تغییری می‌کند؟
- (۱) افزایش
 - (۲) کاهش
 - (۳) ابتدا کاهش بعد افزایش
 - (۴) تفاوتی نمی‌کند.
- ۲۳۶- ذخایر طلای نوع کوهزایی و نوع کارلین به ترتیب ناشی از کدام سیالات هستند؟
- (۱) دگرگونزاد، دگرگونزاد
 - (۲) دگرگونزاد، گرمابی
 - (۳) گرمابی، گرمابی
 - (۴) گرمابی، دگرگونزاد
- ۲۳۷- در کدامیک از کانسارهای زیر، فلزات عمدتاً توسط لیگاندهای آلی و کلوری انتقال می‌یابند؟
- | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|
| MVT (۴) | PCD (۳) | SEDEX (۲) | VMS (۱) |
|---------|---------|-----------|---------|
- ۲۳۸- از اختلاف سن کدام دو کانی به روش K-Ar می‌توان زمان تبلور ماقما را به دست آورد؟
- (۱) بیوتیت، هورنبلند
 - (۲) موسکویت، نفلین
 - (۳) لوسيت، پلاژیوکلاز
 - (۴) گلاکونیت، هورنبلند
- ۲۳۹- مهم‌ترین نوع ذخایر آهن کدام است و این ذخایر به کدام دوره زمین‌شناسی تعلق دارند؟
- (۱) اسکارن، فانروزوئیک
 - (۲) ماگمایی، پروتروزوئیک
 - (۳) تشکیلات آهن نواری، پروتروزوئیک پایینی
 - (۴) سیدریتی، پروتروزوئیک بالایی
- ۲۴۰- مهم‌ترین کمپلکس‌های انتقال‌دهنده طلا در دماهای بالا و پایین به ترتیب کدامند؟
- (۱) کلریدی، بی‌سولفیدی
 - (۲) بی‌سولفیدی، کلریدی
 - (۳) سولفیدی، کلریدی
- ۲۴۱- در منطقه داربستی کانسارهای سولفید توده‌ای، نسبت مس به روی از بخش کلریتی به طرف بخش سریستی چگونه تغییر می‌کند؟
- (۱) افزایش
 - (۲) کاهش
 - (۳) افزایش و سپس کاهش
 - (۴) تغییر نمی‌کند.
- ۲۴۲- کدامیک در مورد ذخایر مس پروفیری ایران درست است؟
- (۱) همه مربوط به الیگومن
 - (۲) همه مربوط به پالئوسن
 - (۳) بیشتر مربوط به ائوسن
 - (۴) بیشتر مربوط به میوسن
- ۲۴۳- معادن طلای زرشوران و آقدره در شهرستان تکاب در کدام دسته از کانسارهای طلا قرار می‌گیرند؟
- (۱) اپیترمال پر سولفید
 - (۲) کوهزایی
 - (۳) کارلین
 - (۴) اپیترمال کم سولفید
- ۲۴۴- همه عبارت‌ها درست هستند، به جز:
- (۱) اسکارن‌ها مهم‌ترین ذخایر منبع تنگستان هستند.
 - (۲) پرعيارترین کانسارهای اورانیوم نوع دگرشیبی هستند.
 - (۳) کانسارهای مس نوع زامبیا شبیه کانسارهای نوع مانتو هستند.
 - (۴) کیمبرلیت از ذوب‌بخشی پریدوتیت حاوی فلوگوپیت و دولومیت تشکیل می‌شود.
- ۲۴۵- کدام کانی آهن‌دار در بخش‌های عمیق‌تر محیط‌های دریایی رسوب می‌کند؟
- (۱) هماتیت
 - (۲) مگنتیت
 - (۳) سیدریت
 - (۴) پیریت
- ۲۴۶- همه کانی‌های زیر از پتانسیل‌های معدنی پگماتیت‌ها هستند، به جز:
- (۱) تورمالین
 - (۲) هورنبلند
 - (۳) میکا
 - (۴) فلدسپار

- ۲۴۷ - مهم‌ترین ذخیره فسفر ایران در کدام زون ساختاری قرار دارد؟
 ۱) ایران مرکزی ۲) زاگرس ۳) البرز
 ۴) کپه‌داغ
- ۲۴۸ - تفاوت کانسارهای قلع پورفیری با مس پورفیری در کدام است؟
 ۱) نوع دگرسانی ۲) عیار ۳) نوع سنگ میزبان
 ۴) تناز
- ۲۴۹ - آلتراسیون‌های شاخص در کانسارهای طلای تیپ کارلین کدام است؟
 ۱) پتاسیک ۲) کلریت - ایلیت ۳) سریسیت - پیریت
 ۴) سیلیسی
- ۲۵۰ - ذخایر گرمابی، حاصل تبلور کدامیک و در کجا تشکیل می‌شوند؟
 ۱) سیالات فوق بحرانی، مجاور توده ماقمایی
 ۲) بخارات و گازها، بخش فوقانی باتولیت‌ها
 ۳) بخارت، بخش بالایی پigmاتیت‌ها
 ۴) گازها، نزدیکی سطح زمین
- زمین‌شناسی زیست محیطی:
- ۲۵۱ - کدام مورد در ارتباط با موج لاو درست است؟
 ۱) همیشه قبل از موج S ثبت می‌شود.
 ۲) در زلزله‌های عمقی تر این موج قوی‌تر است.
 ۳) نسبت به موج ریلی قدرت تخرب کمتری دارد.
 ۴) به اجسام موجود در سطح زمین نیروی افقی از نوع چپ و راست اعمال می‌کند.
- ۲۵۲ - نظریه اتساع بذیری (Dilatancy Theory) برای توجیه کدام گروه از زلزله‌ها کاربرد دارد؟
 ۱) کانون خیلی عمیق
 ۲) کانون عمق متوسط
 ۳) کانون کم عمق
 ۴) سطحی
- ۲۵۳ - علت گرمای لایه اوزون، جذب کدام پرتوها است؟
 ۱) فرابینش، مرئی و فروسخ
 ۲) ایکس و گاما
 ۳) میکروویوهای گاما و فروسخ
 ۴) ایکس نرم و ایکس سخت
- ۲۵۴ - در کدام شرایط قاعده هیدروگراف سیل پهنه‌نر و زمان تأخیر افزایش می‌یابد؟
 ۱) حوضه‌های آبریز با مساحت کم
 ۲) حوضه‌های آبریز با شبیه زیاد
 ۳) حوضه‌های آبریز گرد با ضریب شکل نزدیک به یک
 ۴) حوضه‌های آبریز تشکیل شده در دامنه‌های شمالی نیمکره شمالی زمین
- ۲۵۵ - برای دوره آماری ۳۵ ساله، دوره تکرار سیلاب با رتبه سوم چقدر است؟
 ۱) ۸
 ۲) ۱۰
 ۳) ۱۲
 ۴) ۱۶
- ۲۵۶ - در کدام مناطق مربوط به عوارض سیل خیز خطر سیلاب بیشتر است؟
 ۱) دشت‌های سیلابی و سطوح کفه‌ای
 ۲) دشت‌های سیلابی و مخروط افکنه‌ها
 ۳) مخروط افکنه‌ها و سطوح کفه‌ای
 ۴) دلتاهای و سطوح کفه‌ای
- ۲۵۷ - کدام گروه از آتشفسان‌ها فراوان‌ترند؟
 ۱) مخروط سپری با فعالیت گدازه از نوع بازی
 ۲) مخروط سپری با فعالیت گدازه اسیدی
 ۳) مخروط سپری با فعالیت گدازه اسیدی

- ۲۵۸- کدامیک از روش‌های زیر برای شناسایی غارهای زیرزمینی قدرت تفکیک بیشتری دارد و برای شناسایی حفره‌های کم عمق کاربرد دارد؟
- (۱) روش نقل‌سنگی
 - (۲) روش مقاومت‌سنگی
 - (۳) رادار زمینی مخصوص GPR
 - (۴) روش انعکاس لرزه‌ای
- ۲۵۹- مهمترین شکل آلدگی هوا هنگام استخراج معدن کدام است؟
- (۱) ورود ذرات معلق به هوا
 - (۲) ورود گازهای گوگردی هنگام انفجار
 - (۳) تولید گازهای CO_2 و CO
 - (۴) فرایند پرعيارسازی به روش فلوتاسیون
- ۲۶۰- کدامیک از فرایندهای زیر می‌تواند سبب اسیدی شدن خاک و شستشوی عناصر مغذی آن شود؟
- (۱) فرایند ذوب مواد معدنی
 - (۲) ایجاد سدهای رسوبگیر طی فرایند فرآوری
 - (۳) فرایند اکتشاف در مناطق جنگلی
 - (۴) در کدام‌یک از مراحل چرخه سوخت هسته‌ای خطر تولید و تنفس گاز رادون بیشتر است؟
- (۱) فرایند غنی‌سازی
 - (۲) استخراج اورانیوم
 - (۳) دفن مواد زائد هسته‌ای
 - (۴) فرآوری میله‌های سوخت
- ۲۶۲- کدام عنصر در تولید انسولین و کنترل قند خون اهمیت دارد؟
- (۱) کروم
 - (۲) سدیم
 - (۳) مس
 - (۴) کبالت
- ۲۶۳- اگر یک دریاچه دچار پرگذایی (Eutrophication) گردد:
- (۱) میزان اکسیژن خواهی زیستی افزایش می‌یابد.
 - (۲) به دلیل ایجاد شرایط هوایی تولید گاز سولفید هیدروژن کم می‌شود.
 - (۳) انحلال پذیری عناصر آهن و منگنز و آزادسازی آن‌ها از رسوب کاهش می‌یابد.
 - (۴) اکسیژن محلول در آب به دلیل رشد گیاهان و افزایش فتوسنتز بیشتر می‌شود.
- ۲۶۴- جذب سطحی آنیون‌ها و کاتیون‌ها در کدام شرایط pH خاک بیشتر است؟
- (۱) در pH های قلیایی
 - (۲) در pH های اسیدی
 - (۳) آنیون‌ها در pH های اسیدی و کاتیون‌ها در pH های قلیایی
 - (۴) آنیون‌ها در pH های قلیایی و کاتیون‌ها در pH های اسیدی
- ۲۶۵- به طور کلی کدامیک از فلزات سنگین در محیط خاک امکان تحرک پذیری بیشتری دارد؟
- (۱) سرب
 - (۲) کادمیم
 - (۳) آلومینیم
 - (۴) آهن
- ۲۶۶- کدام روش معمولاً در بیشتر طرح‌های پایدارسازی توده‌های لغزشی به کار برده می‌شود؟
- (۱) شمع کوبی
 - (۲) مهار با کابل
 - (۳) زهکشی سطحی
 - (۴) اصلاح هندسه شیب
- ۲۶۷- سریع‌ترین و کندترین حرکت دامنه‌ای به ترتیب از راست به چپ کدام است؟
- (۱) جریان گلی - خزش
 - (۲) بهمن‌های سنگی - خزش
 - (۳) بهمن‌های سنگی - زمین‌لغزه چرخشی
 - (۴) جریان گلی - خزش
- ۲۶۸- شکل آلی کدام عنصر خطرناک تر و معمولاً از طریق مصرف ماهی وارد بدن انسان می‌شود؟
- (۱) کادمیم
 - (۲) سرب
 - (۳) آرسنیک
 - (۴) جیوه

۲۶۹ - خطر کدام کانی آذبستی در صورت ورود به ریه انسان کمتر است؟

- (۱) ترمولیت
- (۲) کروسیدولیت
- (۳) کریزوتیل
- (۴) اکتینولیت

۲۷۰ - کدام غلظت فلوئور در آب آشامیدنی می‌تواند سبب فلوروسیس اسکلتی شود؟

- (۱) بیش از ۴ میلی‌گرم در لیتر
- (۲) ۱/۵ تا ۲ میلی‌گرم در لیتر
- (۳) ۱/۵ تا ۱/۵٪ میلی‌گرم در لیتر
- (۴) کمتر از ۵٪ میلی‌گرم در لیتر

