



مشاوره تحصیلی هپوا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ثبت نام مدارس ، برنامه ریزی درسی و آمادگی
برای امتحانات مدارس

برای ورود به صفحه مشاوره مدارس کلیک کنید

برای ورود به صفحه نمونه سوالات امتحانی کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی مدارس

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹

تماس از تلفن ثابت



مبارزه علمی برای جوانان، زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیت‌های است.

دفترچه سؤالات مرحله اول سال ۱۳۹۸

سی امین دوره المپیاد شیمی

صبح - ساعت: ۰۹:۰۰

کد دفترچه: ۱

تعداد سؤالات	مدت آزمون (دقیقه)
۵۰	۹۰

شماره صندلی:






نام خانوادگی: نام:

توضیحات مهم

استفاده از هر نوع ماشین حساب مجاز است.

- ۱- کد دفترچه سؤالات شما ۱ است. این کد را در محل مربوط روی پاسخ‌نامه با مداد پر کنید. در غیر این صورت پاسخ‌نامه شما تصحیح نخواهد شد. توجه داشته باشید که دفترچه سؤالات شما که در زیر هر یک از صفحه‌های این دفترچه نوشته شده است، با کد اصلی که در همین صفحه است، یکی باشد.
- ۲- بلافاصله پس از آغاز آزمون، تعداد سؤالات داخل دفترچه وجود همه برگه‌های دفترچه سؤالات را بررسی نمایید. در صورت وجود هرگونه ۵ یک برگ پاسخ‌نامه در اختیار شما قرار گرفته که مشخصات شما بر روی آن نوشته شده است. در صورت نادرست بودن آن، در اسرع وقت مسؤول جلسه را مطلع کنید. ضمناً مشخصات خواسته شده در پایین پاسخ‌نامه را با مداد مشکی بنویسید.
- ۳- برقه پاسخ‌نامه را دستگاه تصحیح می‌کند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگه دارید و به علاوه، پاسخ هر پرسش را با مداد مشکی نرم در محل مربوط علامت بزنید. لطفاً خانه مورد نظر را کامل‌سیاه کنید.
- ۴- پاسخ درست به هر سوال ۳ نمره مثبت و پاسخ نادرست ۱ نمره منفی دارد.
- ۵- همراه داشتن هرگونه کتاب، جزو، یادداشت و لوازم الکترونیک مانند تلفن همراه و لپ‌تاپ ممنوع است. همراه داشتن این وسائل حتی اگر از آنها استفاده نکنید یا خاموش باشد، تقلب محسوب می‌شود.
- ۶- شرکت‌کنندگان در دوره تابستانی از بین دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم انتخاب می‌شوند.
- ۷- داوطلبان نمی‌توانند دفترچه سؤالات را با خود ببرند. (دفترچه باید همراه پاسخ‌نامه تحویل داده شود.)


۱. از واکنش آبکافت کامل یک پلی‌آمید، تنها یک نوع مونومر (A) به دست می‌آید. از واکنش A با ترکیب B در شرایط مناسب، ترکیب C به دست می‌آید که وزن مولکولی آن از دوبرابر وزن مولکولی A کمتر است. واکنش C با ترفتالیک اسید (D) به تشکیل زنجیرهای پلی‌آمیدی جدید منجر می‌شود. B کدام ترکیب می‌تواند باشد؟



۲. انحلال پذیری PbSO_4 , AgCl , CuS و pH با کاهش به ترتیب از راست به چپ چه تغییری می‌کند؟

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ۱) کاهش، بدون تغییر، کاهش | ۲) افزایش، افزایش، افزایش |
| ۳) کاهش، افزایش، افزایش | ۴) افزایش، بدون تغییر، افزایش |

۳. نام درست ترکیب‌های A و B کدام است؟



A

۱) ۶-دی‌برمو-۳،۳-دی‌متیل اوکتان

۲) ۶-دی‌برمو-۳،۳-دی‌متیل اوکتان

۳) ۶-دی‌برمو-۳،۳-دی‌متیل اوکتان

۴) ۶-دی‌برمو-۳،۳-دی‌متیل اوکتان

B

۱) ۶-دی‌برمو-۳،۳-دی‌متیل اوکتان

۲) ۶-دی‌برمو-۳،۳-دی‌متیل اوکتان

۳) ۶-دی‌برمو-۳،۳-دی‌متیل اوکتان

۴) ۶-دی‌برمو-۳،۳-دی‌متیل اوکتان

۴. در اثر واکنش آبکافت ترکیب $(C_5H_8O_2)$ A، که در ساختار آن گروه عاملی استری وجود دارد، ترکیب $(C_5H_10O_2)$ به دست می‌آید. در اثر اکسایش ترکیب B با اکسندۀ مناسب، ترکیب $(C_5H_8O_4)$ D به دست می‌آید. از واکنش استری شدن ۱ مول ترکیب D با یک مول اتانول، تنها یک نوع فراورده استر به دست می‌آید. چند ساختار برای A می‌توان در نظر گرفت؟ (در واکنش‌های اکسایش، اسکلت کربنی تغییر نمی‌کند.)

۱) ۴

۲) ۳

۴) ۲

۳) ۱

۵. بهمنظور جلوگیری از فرو ریختن خردۀای شیشه در اثر ضربه، از کدام پلیمر در بین صفحه‌های شیشه استفاده می‌شود؟

۴) کولار

۳) پلی‌استرها

۲) پلی‌سیانو اتن

۱) پلی‌وینیل کلرید

۶. از آبکافت استر $(C_{16}H_{16}O_2)$ A، دو ترکیب B و $(C_8H_8O_2)$ D به دست می‌آید. ترکیب B در اثر اکسایش با واکنشگر مناسب به ترکیب D تبدیل می‌شود. ترکیب D را می‌توان با اکسایش بیشتر در شرایط مناسب به ترفتالیک اسید تبدیل کرد. اگر یکی از اتم‌های هیدروژن B با دوتریم جایگزین شود، امکان تشکیل چند ایزومر ساختاری وجود دارد؟ (در واکنش‌های اکسایش پیوندهای کربن - کربن شکسته نمی‌شود.)


۵) ۴

۴) ۳

۶) ۲

۳) ۱

۷. کدام یک از واکنش‌های داده شده، با افزایش فشار به سمت چپ (واکنش برگشت) و با افزایش دما به سمت راست (واکنش رفت) جابه‌جا می‌شود؟



۸. در عبارت‌های زیر، X به یکی از عناصر Ca, Fe, Pb، یا Cu اشاره دارد. X کدام گزینه است؟

- X(s) در محلول HCl(aq) ۱ mol/L واکنش می‌دهد و H_۲(g) تولید می‌کند.

- در شرایط استاندارد، واکنش ۳X^{۲+}(aq)+۲Al(s) → ۳X(s)+۲Al^{۳+}(aq) خودبهخودی است.

- در شرایط استاندارد X(s) عامل کاهنده بهتری از Co(s) است.

نیم واکنش	E°	Pb (۴)	Fe (۳)	Ca (۲)	Cu (۱)
Ca ^{۲+} (aq)+۲e ⁻ → Ca(s)	-۰/۸۴ V				
Al ^{۳+} (aq)+۳e ⁻ → Al(s)	-۰/۶۶ V				
Fe ^{۳+} (aq)+۳e ⁻ → Fe(s)	-۰/۴۴ V				
Co ^{۳+} (aq)+۳e ⁻ → Co(s)	-۰/۲۸ V				
Pb ^{۲+} (aq)+۲e ⁻ → Pb(s)	-۰/۱۳ V				
۲H ^{۱+} (aq)+۲e ⁻ → H _۲ (g)	۰/۰۰ V				
Cu ^{۲+} (aq)+۲e ⁻ → Cu(s)	۰/۳۴ V				
Pt ^{۲+} (aq)+۲e ⁻ → Pt(s)	۱/۱۸ V				

۹. یک سنگ معدن مس با Cu_۲S٪ ۳۸، با هوای حاوی ۲۲ درصد اکسیژن حرارت داده می‌شود. در این واکنش،

فلز مس و گاز گوگرد دی‌اکسید حاصل می‌شود. برای تبدیل یک تن از این سنگ معدن به مس، چند متر مکعب

هوای در شرایط STP لازم است؟ (Cu: ۶۳/۵ S: ۳۲)

۳۰۴ (۴) ۲۴۳ (۳) ۳۰۰ (۲) ۳۳۰ (۱)

۱۰. کدام گزینه ترتیب افزایش نقطه جوش ترکیبات داده شده را درست نشان می‌دهد؟



۱۱. گاز AX_n تا دمای $K = 605$ گرم می‌شود و در نتیجه گرما دادن به صورت زیر تفکیک می‌شود:



در صورتی که $5/80$ مول از این گاز به مقدار 35 درصد تفکیک شود و در لحظه تعادل، مقدار $11/89$ مول از همه گازها وجود داشته باشد، n کدام است؟

(۳)

(۴)

(۲)

(۱)

۱۲. اضافه کردن 10 میلی‌لیتر از کدام یک از مواد زیر، به 10 میلی‌لیتر از محلول $HCl 5 \text{ mmol/L}$ ، بیشترین تأثیر را روی pH محلول دارد؟

(۲) سدیم نیترات

(۱) سدیم سولفات

(۴) سدیم فلورورید

(۳) سدیم کلرید

۱۳. کدام ترکیب بالاترین نقطه جوش را دارد؟

(۲) سیس-۲،۱-دی‌کلرواتن

(۱) سیس-۲-بوتن


(۴) ترانس-۲،۱-دی‌کلرواتن

(۳) ترانس-۲-بوتن

۱۴. ترتیب درست افزایش زاویه پیوند در گونه‌های SO_4^{2-} , NO_3^- و NCN^{2-} . کدام است؟

 $SO_4 > NO_3 > NCN^{2-}$ (۲) $SO_4 < NO_3 \cong NCN^{2-}$ (۱) $SO_4 < NO_3 < NCN^{2-}$ (۴) $SO_4 \cong NO_3 < NCN^{2-}$ (۳)

۱۵. در ساختار زیر، اتم مرکزی X می‌تواند کدام عنصر باشد؟




(۴) کلر

(۳) گوگرد

(۲) فسفر

(۱) کربن

۱۶. در شکل زیر، اگر پل نمکی حذف شود، چه اتفاقی می‌افتد؟



- (۱) پتانسیل صفر و جریان غیر قابل اندازه‌گیری می‌شود.
- (۲) پتانسیل غیر قابل اندازه‌گیری و جریان صفر می‌شود.
- (۳) پتانسیل و جریان هر دو غیر قابل اندازه‌گیری می‌شوند.
- (۴) پتانسیل و جریان هر دو صفر می‌شوند.

۱۷. چهار عنصر X، Z، A و D می‌توانند مطابق جدول زیر، اکسید و هیدرید تشکیل دهند. این عناصر به ترتیب کدامند؟

X:	X_2O_7	XH_4
Z:	ZO	ZH_4
A:	A_2O	AH
D:	DO_7	DH_4

- (۱) آلومینیم، کلسیم، رو بیدیم، سیلیسیم
- (۲) رو بیدیم، آلومینیم، کلسیم، سیلیسیم
- (۳) رو بیدیم، کلسیم، آلومینیم، رو بیدیم
- (۴) سیلیسیم، کلسیم، آلومینیم، رو بیدیم

۱۸. محلولی از اگزالیک اسید با حجم ۱۲ mL، با محلول استاندارد پتانسیم پرمنگنات 0.077 mol/L تیتر می‌شود. اگر بدانیم که فراورده‌های واکنش تیتراسیون Mn^{2+} و گاز کربن دی‌اکسید است و برای ظاهر شدن رنگ پرمنگنات در محلول تیترشونده، باید حداقل ۱۲/۶ میلی‌لیتر از محلول پرمنگنات اضافه شود، غلظت آنیون اگزالات ($C_2O_4^{2-}$) کدام است؟

- ۰/۰۳ (۴) ۰/۰۵۵ (۳) ۰/۰۱ (۲) ۰/۰۲ (۱)

۱۹. اضافه کردن پودر فلزات روی و قلع به ترتیب موجب ایجاد چه رنگی در محلول وانادیم(V) می‌شود؟



(۱) بنفس - بنفس (۲) آبی - آبی (۳) بنفس - سبز (۴) سبز - سبز

۲۰. مقدار ۲۰ مول از $\text{NH}_4\text{NO}_7(s)$ را وارد یک ظرف خالی ۱۰ لیتری کرده و آن را تا دمای 200°C حرارت می‌دهیم. واکنش انجام شده به صورت زیر است:



در لحظه تعادل، فشار گاز $10^5 \times 1/5$ پاسکال است. چند مول $\text{NH}_4\text{NO}_7(s)$ به صورت تجزیه نشده باقی می‌ماند؟ ($R = 0.083 \text{ L bar mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

(۱) ۰.۱ (۲) ۰.۷۸ (۳) ۰.۹۸ (۴) ۱.۶۲


۲۱. قدرت اسیدی محلول 0.02 mol/L هیدروکلریک اسید در آب به قدرت اسیدی کدام یک از محلول‌های زیر نزدیک‌تر است؟

- (۱) محلول 0.02 mol/L استیک اسید
- (۲) محلول 0.01 mol/L سولفوریک اسید + محلول 0.01 mol/L نیتریک اسید
- (۳) محلول 0.01 mol/L سولفوریک اسید
- (۴) محلول 0.01 mol/L هیدروکلریک اسید + محلول 0.01 mol/L نیتریک اسید

۲۲. واکنش کلی باتری سربی به صورت زیر است:



با توجه به نیم واکنش های کاهش زیر، E° باتری برحسب ولت کدام است؟



۱/۱۱ (۴)

۲/۰۴ (۳)

۱/۸۱ (۲)

۱/۳۴ (۱)

۲۳. در واکنش $\text{A}(aq) \rightarrow \text{B}(aq)$ ، غلظت A برحسب زمان در جدول زیر آمده است. سرعت متوسط واکنش در دو دقیقه اول برحسب میلی مول بر لیتر بر دقیقه ($\text{mmol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$) کدام است؟

زمان (ثانیه)	غلظت A (مول بر لیتر)
۰	۰/۱۵۶۵
۶۰	۰/۱۴۹۸
۱۲۰	۰/۱۴۳۳

۰/۱۱ (۴)

۶/۵ (۳)

۶/۷ (۲)

۶/۶ (۱)

۲۴. در یک پیل سوختی:

- ۱) گاز اکسیژن در کاتد کاهش یافته و یون هیدروژن در آند اکسید می شود و فراورده خروجی آب است.
- ۲) گاز اکسیژن در کاتد کاهش یافته و گاز هیدروژن در آند اکسید می شود و فراورده خروجی آب است.
- ۳) آب در کاتد کاهش یافته و اکسیژن در آند اکسید می شود و فراورده خروجی گاز هیدروژن است.
- ۴) آب در آند کاهش یافته و در کاتد اکسید می شود و فراورده خروجی گاز هیدروژن و اکسیژن است.

۲۵. اسید HA که ثابت اسیدی 1×10^{-7} دارد، به رنگ قرمز و باز مزدوج آن به رنگ آبی است. فرض کنید در مخلوطی شامل اسید و باز مزدوج آن، اگر نسبت اسید به باز برابر ۵ باشد، رنگ مخلوط قرمز است و در صورتی که نسبت باز به اسید برابر ۸ باشد، مخلوط به رنگ آبی درمی‌آید. محلولی از HA با غلظت 0.005 مول بر لیتر و با حجم 10 میلی‌لیتر، با اضافه شدن $2/8$ میلی‌لیتر محلول سود، از قرمز به آبی تبدیل می‌شود. غلظت سود اضافه شده کدام است؟


۰/۰۱۴ (۴)

۰/۰۱۱ (۳)

۰/۰۱۶ (۲)

۰/۰۴ (۱)

۲۶. نمودار زیر برای رفتار یک گاز ایده‌آل در آزمایشگاه به دست آمده است.



این نمودار می‌تواند کدام یک از موارد زیر باشد؟

- ۱) $\frac{pV}{T}$ بر حسب p ، وقتی که مقدار گاز و حجم ثابت باشد.
 ۲) T بر حسب p ، وقتی که مقدار گاز ثابت باشد.
 ۳) pV بر حسب T ، وقتی که فشار و حجم ثابت باشند.
 ۴) p بر حسب T ، وقتی که مقدار گاز ثابت باشد.

۲۷. فرض کنید غواصی از عمق $38/1$ متری بدون ذم و بازدم خود را به سطح آب برساند. در نتیجه انتقال غواص به سطح آب، ریه‌های او با چه ضریبی نسبت به عمق $38/1$ متری منبسط می‌شود؟ چگالی آب دریا برابر با $(g = ۹/۸ \text{ m/s}^2)$ و چگالی جیوه $۱۳/۵ \text{ g/mL}$ و چگالی جیوه $۱۰/۴ \text{ g/mL}$ است.

۳/۹ (۴)

۲/۲ (۳)

۴/۹ (۲)

۵/۲ (۱)

۲۸. ترکیب‌هایی با فرمول مولکولی $\text{C}_7\text{H}_7\text{Cl}_2$ و N_2F_2 را در نظر بگیرید. چند ایزومر ساختاری از این ترکیب‌ها در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کنند؟

۴) بیشتر از ۵

۳ (۳)


۴ (۲)

۲ (۱)

۲۹. معادلات ترموشیمیایی زیر را در نظر بگیرید:



با استفاده از این معادلات، ΔH° واکنش زیر بر حسب kJ/mol کدام است؟ گرمای تشکیل یک مول $\text{CO}_2(g)$ برابر kJ -۳۹۴ و گرمای تشکیل یک مول $\text{H}_2\text{O}(l)$ برابر kJ -۲۸۶ است.




$$-455 \text{ (۴)} \quad -1089 \text{ (۳)} \quad -1723 \text{ (۲)} \quad -1367 \text{ (۱)}$$

۳۰. به یک محلول ناشناخته، چهار محلول اضافه شده و نتایج زیر به دست آمده است. کاتیون در محلول ناشناخته کدام است؟

نتیجه	محلول اضافه شده
رسوب نمی‌دهد.	۰/۰۵ mol/L S^{2-}
رسوب می‌دهد.	۰/۰۵ mol/L CO_3^{2-}
رسوب می‌دهد.	۰/۰۵ mol/L PO_4^{3-}
رسوب نمی‌دهد.	۰/۰۵ mol/L OH^-

$$\text{Cd}^{2+} \text{ (۴)} \quad \text{Fe}^{2+} \text{ (۳)} \quad \text{Ba}^{2+} \text{ (۲)} \quad \text{Ag}^+ \text{ (۱)}$$

۳۱. انحلال پذیری $\text{BaF}_2(s)$ در آب در دمای 25°C برابر با $0/018 \text{ mol/L}$ است. ثابت تعادل واکنش زیر کدام است؟



$$4/3 \times 10^{-5} \text{ (۴)} \quad 3/2 \times 10^{-5} \text{ (۳)} \quad 2/3 \times 10^{-5} \text{ (۲)} \quad 3/1 \times 10^{-5} \text{ (۱)}$$

۳۲. اعداد جدول زیر، برای سرعت‌های اولیه واکنش زیر به دست آمده‌اند:



$[\text{ClO}_7^-]$	$[\text{OH}^-]$	سرعت اولیه ($\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$)
۰/۱۰	۰/۱۰	۰/۲۴
۰/۲۰	۰/۱۰	۰/۹۶
۰/۱۰	۰/۰۵	۰/۱۲

در صورتی که سرعت واکنش متناسب با $[{\text{ClO}_7^-}]^a [{\text{OH}^-}]^b$ باشد، مقادیر a و b به ترتیب از راست به چپ کدامند؟

- ۱) ۱ و ۲ ۲) ۳ و ۲ ۳) ۱ و ۲ ۴) ۲ و ۱

۳۳. مایع درون سلول‌های موجودات زنده، pH حدود ۷/۱۵ دارد. نسبت غلظت یون H_2PO_4^- به HPO_4^{2-} در این مایع کدام است؟

$$\frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 6/2 \times 10^{-8}$$

- ۱) ۴۴ ۲) ۲۸ ۳) ۱/۱۴ ۴) ۰/۸۸

۳۴. ترکیبی با جرم مولکولی ۱۷۷، فقط از اتم‌های C, H, Br و O تشکیل شده است. اگر نسبت جرمی کربن به هیدروژن ۸ به ۱ باشد، نسبت تعداد اتم‌های اکسیژن به برم چند است؟ (H: ۱, C: ۱۲, O: ۱۶, Br: ۸۰)

- ۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۳۵. ترتیب افزایش انرژی نخستین یونش عناصر در کدام گزینه درست است؟

- | | |
|---------------------|---------------------|
| N < P < Si < Ca (۲) | N < Si < P < Ca (۱) |
| Ca < N < P < Si (۴) | Ca < Si < P < N (۳) |

۳۶. می‌دانیم که امکان دارد برای حجم‌های برابر از گازها، در دما و فشار استاندارد، تعداد ذرات برابر وجود داشته باشد. کدام گزینه دلیل مناسبی برای این موضوع است؟

۱) ذرات گاز خیلی از هم دور هستند.

۲) ذرات گاز دارای اندازه‌های بزرگ هستند.

۳) اندازه ذرات گازها معمولاً برابر هستند.

۴) چگالی گازها به جرم مولی آنها وابسته نیست.

۳۷. کدام آرایش الکترونی، لایه ظرفیت عناصر دسته d را مشخص می‌کند؟ (منظور از ۱-۱۰-۱۰-۱ اعداد از ۱ تا ۱۰ است و بقیه هم مانند آن).

$$(n-1)s^x nd^{1-x} \quad (2)$$

$$(n-1)d^{1-x} ns^{x-2} \quad (4)$$

$$(n-1)p^x ns^x \quad (1)$$

$$(n-1)d^{1-x} ns^x (n-1)p^x \quad (3)$$

۳۸. در لایه والانس اتم‌ها در مولکول N_2O_7 ، چند جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد؟

۵ (۴)

۶ (۳)

۸ (۲)

۷ (۱)

۳۹. جرم اتمی دوتریم (ایزوتوپ سنگین هیدروژن)، ۲/۰۱۴۱ و جرم اتمی هیدروژن، ۱/۰۰۷۸ گرم بر مول است. اگر جرم اتمی متوسط هیدروژن در کره زمین ۱/۰۰۸۰ باشد، درصد فراوانی دوتریم کدام است؟

۰/۰۰۰۲ (۴)

۰/۰۰۲ (۳)

۰/۰۲ (۲)

۰/۲ (۱)

۴۰. برای واکنش $SbCl_5(g) \rightleftharpoons SbCl_4(g) + Cl(g)$ در دمای معین ثابت تعادل $K_c = ۰/۰۳۰$ است. اگر در یک ظرف ۲/۵ لیتری، ۳۰۰ مول $SbCl_5$ با ۱۵۰ مول Cl_2 مخلوط شود، در لحظه تعادل غلظت $SbCl_4$ چند مول بر لیتر خواهد بود؟

۰/۰۶۴ (۴)

۰/۰۴۳ (۳)

۰/۱۱ (۲)

۰/۱۷ (۱)

۴۱. چه تعداد از کمیت‌های زیر هیچ‌گونه وابستگی به دما ندارند؟

ظرفیت گرمایی؛ آنتالپی واکنش؛ ثابت تعادل واکنش؛ حجم مولی؛ غلظت مولار؛ حلایت در آب؛ انرژی یونش اتم

۴) صفر

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۲. در واکنش زیر n_A , n_B و n_C ضرایب استوکیومتری واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها هستند:



اگر سرعت مصرف A برابر $1 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$ و سرعت اولیه تولید B و C به ترتیب 0.08 و 0.02 مول بر لیتر بر ثانیه باشد، ضرایب n_A و n_B به ترتیب از راست به چپ کدامند؟




(۴) ۲ و ۴

(۳) ۲ و ۲

(۲) ۲ و ۱

(۱) ۱ و ۱

۴۳. کدام یک از واکنش‌های زیر، قابل انجام نیست؟



۴۴. ترکیبی با فرمول بسته $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$ آروماتیک است و در ساختار آن گروه کربونیل وجود دارد. چند ساختار برای آن می‌توان در نظر گرفت؟

(۴) ۴

(۳) ۷

(۲) ۶

(۱) ۵

۴۵. مخلوطی از کربن و گوگرد به جرم ۳/۰ گرم به طور کامل می‌سوزد و مخلوطی از CO_2 و SO_2 با جرم $9/2$ گرم به دست می‌آید. درصد جرمی گوگرد در مخلوط اولیه چقدر بوده است؟ (S: ۳۲, C: ۱۲)


(۴) ۳۶

(۳) ۱۷

(۲) ۶۴

(۱) ۸۳

۴۶. مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در واکنش زیر، پس از موازنی کدام است؟



(۴) ۳۶

(۳) ۳۹

(۲) ۴۰

(۱) ۲۸

۴۷. از هجده عنصر اول جدول تناوبی، چند عنصر در دمای 25°C و فشار 100 kPa گاز هستند؟


9 (f)

八〇

YCT

۶۱

۴۸. ترکیبات زیر، در یک حل آلی حل شده‌اند:



دانشآموزی می‌خواهد ترکیب A را براساس انحلال پذیری از مخلوط جدا کرده به صورت خالص در یک ظرف مجزا نگهداری کند. برای این منظور وجود کدام یک از مواد شیمیایی، زیر در آزمایشگاه ضروری است؟

۲۹) گزینه‌های

٣) الكل مناسب


۲) باز مناسب

۱) اسید مناسب

۴۹. کدام یک از واکنش‌های زیر به فرایند خوردگی الکتروشیمیایی آهن گالوانیزه در محل خراش ایجادشده بر آن مربوط است؟



۵. نور خورشید بهازای هر متر مربع، انرژی معادل $1/10 \text{ kW}$ فراهم می‌کند ($1 \text{ J/s} = 1 \text{ W}$)。 گیاهان در طی زمان یک ساعت، بهازای هر متر مربع دریافت انرژی، حدود $1/2 \text{ گرم ساکارز}$ مطابق معادله زیر تولید می‌کنند:



چند درصد از انرژی نور خورشید صرفاً تولید ساکارز می‌شود؟ ($C_{12}H_{22}O_{11}$: ۳۴۲/۳ g/mol)

11 · 100 CF

W.T.D.C.F

• 1 •

• 1092 (1)

لطفا در این کادر چیزی ننویسید.

۱۳۹۸-۹۹

مطابق توضیحات دفترچه تکمیل شود.

کد دفترچه ۲

غلط صحیح

لطفا گزینه را به صورت کامل و فقط با مداد مشکی نرم پر کنید.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی طیب‌درآمد ایران مرحله اول المسار ششمی

۱	۱	۲	۳	۴
۲	۱	۲	۳	۴
۳	۱	۲	۳	۴
۴	۱	۲	۳	۴
۵	۱	۲	۳	۴
۶	۱	۲	۳	۴
۷	۱	۲	۳	۴
۸	۱	۲	۳	۴
۹	۱	۲	۳	۴
۱۰	۱	۲	۳	۴

۲۱	۱	۲	۳	۴
۲۲	۱	۲	۳	۴
۲۳	۱	۲	۳	۴
۲۴	۱	۲	۳	۴
۲۵	۱	۲	۳	۴
۲۶	۱	۲	۳	۴
۲۷	۱	۲	۳	۴
۲۸	۱	۲	۳	۴
۲۹	۱	۲	۳	۴
۳۰	۱	۲	۳	۴

۴۱	۱	۲	۳	۴
۴۲	۱	۲	۳	۴
۴۳	۱	۲	۳	۴
۴۴	۱	۲	۳	۴
۴۵	۱	۲	۳	۴
۴۶	۱	۲	۳	۴
۴۷	۱	۲	۳	۴
۴۸	۱	۲	۳	۴
۴۹	۱	۲	۳	۴
۵۰	۱	۲	۳	۴

۶۱	۱	۲	۳	۴
۶۲	۱	۲	۳	۴
۶۳	۱	۲	۳	۴
۶۴	۱	۲	۳	۴
۶۵	۱	۲	۳	۴
۶۶	۱	۲	۳	۴
۶۷	۱	۲	۳	۴
۶۸	۱	۲	۳	۴
۶۹	۱	۲	۳	۴
۷۰	۱	۲	۳	۴

۱۱	۱	۲	۳	۴
۱۲	۱	۲	۳	۴
۱۳	۱	۲	۳	۴
۱۴	۱	۲	۳	۴
۱۵	۱	۲	۳	۴
۱۶	۱	۲	۳	۴
۱۷	۱	۲	۳	۴
۱۸	۱	۲	۳	۴
۱۹	۱	۲	۳	۴
۲۰	۱	۲	۳	۴

۳۱	۱	۲	۳	۴
۳۲	۱	۲	۳	۴
۳۳	۱	۲	۳	۴
۳۴	۱	۲	۳	۴
۳۵	۱	۲	۳	۴
۳۶	۱	۲	۳	۴
۳۷	۱	۲	۳	۴
۳۸	۱	۲	۳	۴
۳۹	۱	۲	۳	۴
۴۰	۱	۲	۳	۴

۵۱	۱	۲	۳	۴
۵۲	۱	۲	۳	۴
۵۳	۱	۲	۳	۴
۵۴	۱	۲	۳	۴
۵۵	۱	۲	۳	۴
۵۶	۱	۲	۳	۴
۵۷	۱	۲	۳	۴
۵۸	۱	۲	۳	۴
۵۹	۱	۲	۳	۴
۶۰	۱	۲	۳	۴

۷۱	۱	۲	۳	۴
۷۲	۱	۲	۳	۴
۷۳	۱	۲	۳	۴
۷۴	۱	۲	۳	۴
۷۵	۱	۲	۳	۴
۷۶	۱	۲	۳	۴
۷۷	۱	۲	۳	۴
۷۸	۱	۲	۳	۴
۷۹	۱	۲	۳	۴
۸۰	۱	۲	۳	۴

محل امضاء

..... با کد ملی فرزند اینجانب

مطابقت اطلاعات مندرج در پاسخ برگ را با مشخصات خود تایید می نمایم.

(تمصر)

ك

٩٨-٨٣٦

شیخ علی بن ابی طالب

شیخ علی