

پاسخه تعالی

ساعت شروع: ۷:۳۰ صبح	رسته: علوم تجربی	تعداد صفحه: ۳	سوالات آزمون شبہ نهایی درس فیزیک ۳
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
سوالات آزمون شبہ نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴			مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد)	نمره												
۱۴	<p>در جدول زیر برای هر گزاره از ستون (۱)، عبارت مناسب را از ستون (۲) انتخاب کنید و در پاسخ برگ بنویسید.</p> <p>(یک عبارت در ستون (۲) اضافی است)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ستون (۲)</th> <th>ستون (۱)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>پوزیترون</td> <td>الف) در گسیل، فوتون در جهتی کاتورهای گسیل می‌شود.</td> </tr> <tr> <td>نوترون</td> <td>ب) ذره گسیل شده توسط هسته در واپاشی β^+..... نامیده می‌شود.</td> </tr> <tr> <td>خود به خود</td> <td>ج) در واپاشی β^-، یک نوترون درون هسته، به و الکترون تبدیل می‌شود.</td> </tr> <tr> <td>القایی</td> <td>د) در ایزوتوپ‌های سنگین $Z > 83$، اگر هسته بخواهد پایدار باقی بماند، باید تعداد درون هسته افزایش یابد.</td> </tr> <tr> <td>پروتون</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ستون (۲)	ستون (۱)	پوزیترون	الف) در گسیل، فوتون در جهتی کاتورهای گسیل می‌شود.	نوترون	ب) ذره گسیل شده توسط هسته در واپاشی β^+ نامیده می‌شود.	خود به خود	ج) در واپاشی β^- ، یک نوترون درون هسته، به و الکترون تبدیل می‌شود.	القایی	د) در ایزوتوپ‌های سنگین $Z > 83$ ، اگر هسته بخواهد پایدار باقی بماند، باید تعداد درون هسته افزایش یابد.	پروتون		
ستون (۲)	ستون (۱)													
پوزیترون	الف) در گسیل، فوتون در جهتی کاتورهای گسیل می‌شود.													
نوترون	ب) ذره گسیل شده توسط هسته در واپاشی β^+ نامیده می‌شود.													
خود به خود	ج) در واپاشی β^- ، یک نوترون درون هسته، به و الکترون تبدیل می‌شود.													
القایی	د) در ایزوتوپ‌های سنگین $Z > 83$ ، اگر هسته بخواهد پایدار باقی بماند، باید تعداد درون هسته افزایش یابد.													
پروتون														
۱۵	<p>یک چشم نور فوتون‌هایی با طول موج 600 nm گسیل می‌کند. اگر در هر ثانیه 10^{-3} فوتون گسیل شود، توان تابشی این چشم نور چند وات است؟ ($hc = 2 \times 10^{-35} \text{ J.m}$)</p>	۰.۷۵												
۱۶	<p>الکترونی در دومین حالت برانگیخته اتم هیدروژن قوار دارد. کوتاهترین طول موجی که امکان گسیل آن وجود دارد چند نانومتر است؟ ($R = 0.1 \text{ nm}^{-1}$)</p>	۱												
۱۷	<p>به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) دو مورد از نارسایی‌های مدل اتمی رادرفورد را بنویسید.</p> <p>(ب) منظور از خط‌های فرانهوفر چیست؟</p>	۱												
۱۸	<p>شکل زیر نمودار تغییرات تعداد هسته‌های مادر پرتوزای موجود در یک ماده پرتوزا را بر حسب زمان نشان می‌دهد.</p> <p>الف) نیمه عمر این عنصر چند ساعت است؟</p> <p>ب) پس از گذشت ۴۰ ساعت چه کسری از هسته‌های اولیه واپاشیده می‌شود؟</p>	۱.۲۵												
۲۰	<p>موفق باشید</p> <p>صفحه ۳ از ۳</p>													

پاسخه تعالی

ساعت شروع: ۷:۳۰ صبح	تعداد صفحه: ۳	سوالات آزمون شبہ نهایی درس فیزیک
عدد آزمون: ۱۲۰	نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۲/۱۶	سوالات آزمون شبہ نهایی (آمادگی برای آزمون های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴

ردیف	سوالات (پاسخ برگ دارد)	نمره
۱	<p>دوستی یا نادرستی جمله های زیر را با کلمه های "درست" و "نادرست" در پاسخ برگ مشخص کنید.</p> <p>الف) پاره خط جهت داری که مکان آغازین حرکت را به مکان پایانی حرکت وصل می کند، بردار جایی نامیده می شود.</p> <p>ب) شتاب متوسط متحرک بین دو لحظه از زمان برابر شبیه پاره خطی است که نقاط نظری آن دو لحظه در نمودار سرعت - زمان را به یکدیگر وصل می کند.</p> <p>ج) طبق قانون سوم نیوتون، نیروهای کنش و واکنش همواره به دو جسم وارد می شوند و هم نوع اند.</p> <p>د) در حرکت چتریاب با تندي حدى به طرف پایین، اندازه نیروی وزن بزرگتر از اندازه نیروی مقاومت هوا است.</p> <p>ه) هر چه ارتفاع ماهواره از سطح زمین بیشتر شود، نیروی گرانشی زمین بر آن، افزایش می یابد.</p>	۱.۲۵
۲	<p>شکل زیر نمودار مکان - زمان متحرکی را که در راستای محور X حرکت می کند، نشان می دهد.</p> <p>در هر یک از جملات زیر عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخ برگ بنویسید.</p> <p>الف) در بازه زمانی t_1 تا t_2 حرکت متحرک (تند شونده - کند شونده) است.</p> <p>ب) در (لحظه t_1 - لحظه t_2) بردار مکان جسم تغییر جهت داده است.</p> <p>ج) در بازه زمانی صفر تا t_2 تندي متوسط متحرک با اندازه سرعت متوسط آن (برابر - نابرابر) است.</p> <p>د) در بازه زمانی t_1 تا t_2 متحرک در (جهت - خلاف جهت) محور X حرکت کرده است.</p>	۱
۳	<p>جسمی با سرعت ثابت بر مسیری مستقیم در حرکت است. اگر جسم در لحظه $t_1 = 1s$ در مکان $x_1 = 8m$ و در لحظه $t_2 = 3s$ در مکان $x_2 = 2m$ باشد، معادله مکان - زمان آن را بنویسید.</p>	۱.۲۵
۴	<p>خودرویی که در جاده ای مستقیم در حال حرکت است، مانع را در فاصله 45 متری خود دیده و اقدام به ترمز می کند.</p> <p>اگر معادله سرعت - زمان این متحرک در SI بصورت $-5t + 20$ باشد.</p> <p>الف) آیا جسم به مانع برخورد می کند؟ (با انجام محاسبات لازم پاسخ دهید)</p> <p>ب) چند ثانیه طول می کشد تا متحرک به طور کامل متوقف شود؟</p>	۱.۲۵
۵	<p>فنری به طول $L_1 = 20\text{cm}$ را از یک نقطه آویزان می کنیم و به سر دیگر آن وزنه 100 گرمی وصل می کنیم. پس از رسیدن به تعادل، طول فنر به $L_2 = 25\text{cm}$ می رسد. ثابت فنر چند نیوتون بر متر است؟ ($g = 10\text{ N/kg}$)</p>	۱
۶	<p>مطابق شکل مقابل نیروی ثابت $F = 140\text{N}$ در راستای افقی به جسمی به جرم 20kg وارد می شود.</p> <p>اگر ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی جعبه و سطح به ترتیب $6/4$ و $4/0$ باشد.</p> <p>اندازه و نوع نیروی اصطکاک بین جسم و سطح را تعیین کنید. ($g = 10\text{ N/kg}$)</p>	۱.۲۵
۷	<p>شکل زیر، منحنی نیروی خالص بر حسب زمان را برای متحرکی نشان می دهد</p> <p>که از حال سکون شروع به حرکت کرده است. اگر انرژی جنبشی جسم بعد از به اندازه $J = 120$ باشد، جرم جسم را بدست آورید.</p>	۱.۲۵

پاسخه تعالی

ساعت شروع: ۷:۳۰ صبح	تعداد صفحه: ۳	رسانه: علوم تجربی	سوالات آزمون شبہ نهایی درس فیزیک ۳
مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۲/۱۶	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز ارزشیابی و نفسمین کیفیت نظام آموزش و پرورش			سوالات آزمون شبہ نهایی (آمادگی برای آزمون‌های نهایی) پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه اردیبهشت ۱۴۰۴

ردیف	سوالات (پاسخ برگ دار)	نمره
۸	<p>هر یک از جمله‌های زیر را با استفاده از عبارت‌های داده شده کامل کنید و در پاسخ برگ بنویسید.</p> <p>(ممکن است یک عبارت بیش از یکبار استفاده شود)</p> <p style="text-align: center;">بسامد طبیعی – بسامد واداشته – افزایش – کاهش</p>	
۹	<p>الف) نوسانگر با انحراف از وضع تعادل پا بسامد معین شروع به نوسان می‌کند. پا بسامد این نوسان..... گفته می‌شود.</p> <p>ب) در سامانه جرم – فنر با افزایش جرم نوسان کننده، دوره نوسان..... می‌یابد.</p> <p>ج) اگر در طول طیف امواج الکترومغناطیسی از امواج رادیوئی به طرف پرتوهای گاما حرکت کنیم، بسامد..... می‌یابد.</p> <p>د) آمبولانسی به سمت شنونده ساکن حرکت می‌کند، اندازه طول موج در جلو آمبولانس نسبت به پشت آن..... می‌یابد.</p>	۱
۱۰	<p>معادله حرکت یک نوسانگر هماهنگ ساده در SI بصورت $x = + / - 4\cos 20\pi t$ است.</p> <p>الف) بسامد این نوسانگر چند هرتز است؟</p> <p>ب) اگر جرم نوسانگر ۲۰۰g باشد، انرژی مکانیکی آن را بدست آورید. ($\pi^2 = 10$)</p> <p>ج) در بازه زمانی صفر تا ۱ / + تایله، نوسانگر چه مسافتی را طی می‌کند؟</p>	۱.۷۵
۱۱	<p>توان متوسط یک منبع صوتی $30W$ است.</p> <p>الف) شدت صوت در فاصله ۵ متری منبع صوت چند دسی بر متر مربع است؟ ($\pi = 3$)</p> <p>ب) تراز شدت این صوت چند دسی بل است؟ ($I = 10^{-12} W/m^2$)</p>	۱.۲۵
۱۲	<p>به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.</p> <p>الف) چرا به موج‌های عرضی و طولی، موج‌های پیش‌رونده گفته می‌شود؟</p> <p>ب) دو مورد را نام ببرید که در آن از مکان‌یابی پژواکی استفاده شده است.</p>	۱
۱۳	<p>شکل زیر یک مدل سازی از پدیده سراب است که تغییر جبهه‌های موج و خمیدگی مربوط به آن را در روزهای بسیار گرم و نزدیک سطح زمین نشان می‌دهد. با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) جبهه‌های موج در کدام محیط با تندری بیشتری حرکت می‌کنند؟</p> <p>ب) دمای کدام محیط بیشتر است؟</p> <p>ج) ضریب شکست کدام محیط بیشتر است؟</p>	۰.۷۵

