



مشاوره تحصیلی هپوا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ثبت نام مدارس ، برنامه ریزی درسی و آمادگی
برای امتحانات مدارس

برای ورود به صفحه مشاوره مدارس کلیک کنید

برای ورود به صفحه نمونه سوالات امتحانی کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی مدارس

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹



تماس از تلفن ثابت

ساعت شروع: ۸ صبح	نام و نام خانوادگی:	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۹۹/۰۵/۲۵	تعداد صفحه:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۹		

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	نمره	الف) سوالات بخش الزامی
۱		دانش آموز عزیز به سوالات ۱ تا ۱۵ جهت کسب نمره ۱۶ نموده باشد (پاسخ نامه دارد)
۲	۰/۲۵	<p>شکل رو به رو نمودار مکان - زمان حرکت یک متحرک که در راستای محور x حرکت می کند را نشان می دهد.</p> <p>(الف) در کدام لحظه متحرک بیشترین فاصله از مبدأ مختصات را دارد؟</p> <p>(ب) سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی ۸s تا ۱۵s چند متر بر ثانیه است؟</p> <p>(پ) مسافت طی شده در بازه زمانی صفر تا ۸s چند متر است؟</p>
۳	۰/۷۵	<p>متحرکی در راستای محور x با شتاب ثابت در حرکت است. در مکان $x_1 = +10\text{m}$ سرعت متحرک $+4\text{m/s}$ و در $x_2 = +20\text{m}$ سرعت متحرک $+6\text{m/s}$ است.</p> <p>(الف) شتاب حرکت متحرک چقدر است؟</p> <p>(ب) پس از چند ثانیه سرعت متحرک از $+4\text{m/s}$ به سرعت $+6\text{m/s}$ می رسد؟</p>
۴	۰/۵	<p>نمودار سرعت - زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند همانند شکل رو به رو است.</p> <p>(الف) در کدام بازه های زمانی بردار شتاب در خلاف جهت محور x است؟</p> <p>(ب) حرکت متحرک در بازه زمانی t_1 تا t_2 کندشونده است یا تندشونده؟</p>
۵	۰/۵	<p>هر یک از گزاره های زیر، به کدام یک از قانون های نیوتون مربوط می شود؟</p> <p>(الف) هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هماندازه و هم راستا اما در خلاف جهت وارد می کند.</p> <p>(ب) یک جسم، حالت سکون یا حرکت با سرعت ثابت خود را حفظ می کند مگر آنکه نیروی خالص غیر صفری به آن وارد شود.</p>
۶	۰/۷۵	<p>شخصی یک سطل محتوی مصالح به جرم 20kg را با طناب سبکی به طرف بالا می کشد.</p> <p>اگر تندی حرکت رو به بالای سطل، ثابت باشد نیروی کشش طناب چند نیوتون است؟</p> <p>(از مقاومت هوا صرف نظر شود).</p> <p>www.Heyvagroup.com</p>
		ادامه سوالات در صفحه دوم

ساعت شروع: ۸ صبح	نام و نام خانوادگی:	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۹۹/۰۵/۲۵	تعداد صفحه:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانشآموزان روزانه سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۹		

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سؤالات	نمره
۷	<p>در هر یک از پرسش‌های زیر، گزینه درست را انتخاب کنید و در پاسخ‌نامه بنویسید.</p> <p>الف) ثابت فنر (k) به کدام‌یک از عوامل زیر بستگی <u>ندارد</u>؟</p> <p>(۱) تغییر طول فنر (۲) شکل فنر (۳) اندازه فنر</p> <p>ب) هر چه فاصله ماهواره از سطح زمین بیشتر شود، نیروی گرانشی وارد بر ماهواره</p> <p>(۱) افزایش می‌یابد (۲) کاهش می‌یابد (۳) تغییر نمی‌یابد</p> <p>پ) مساحت سطح زیر نمودار نیرو - زمان برابر است.</p> <p>(۱) تغییر تندی (۲) تغییر نیرو</p> <p>ت) کدام‌یک از روابط زیر در مورد اندازه نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه، درست است؟</p> $f_{s,\max} < f_s \quad (۱)$ $f_{s,\max} > \mu_s F_N \quad (۲)$ $f_{s,\max} = \mu_s F_N \quad (۳)$	۱
۸	<p>نیروی موتور یک قایق موتوری که جرم آن با سرنشینش 400 kg است</p> <p>به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در بازه زمانی معینی، همواره نیروی افقی خالص N 800 به طرف جلو بر قایق وارد می‌کند.</p> <p>الف) اگر نیروی پیشran 1400 N باشد، نیروی مقاومت در آن لحظه چقدر است؟</p> <p>ب) شتاب این قایق چقدر و در چه جهتی است؟</p>	۰/۷۵
۹	<p>معادله مکان - زمان نوسانگ هماهنگ ساده‌ای با دامنه 0.6 m و بسامد 5 Hz را بنویسید. با فرض اینکه در لحظه $t = 0.5$ نوسانگ در بیشینه فاصله از نقطه تعادل ($x = +A$) باشد.</p>	۰/۷۵
۱۰	<p>ریسمانی به طول 8 m و جرم 4 kg بین دو نقطه ثابت با نیروی 50 N کشیده شده است. تندی انتشار موج در این ریسمان چند متر بر ثانیه است؟</p>	۰/۷۵
۱۱	<p>الف) دو عامل مؤثر بر تندی انتشار موج صوتی را بنویسید.</p> <p>ب) چرا امواج الکترومغناطیسی برای انتقال انرژی به محیط مادی <u>نیاز ندارند</u>؟</p> <p>پ) دلیل پاشیدگی نور سفید در یک منشور چیست؟</p>	۰/۵ ۰/۵ ۰/۲۵
۱۲	<p>دانشآموزی رو به صخره قائمی در فاصله 204 متری از صخره ایستاده است و فریاد می‌زند. اولین پژواک صدای خود را چند ثانیه بعد از فریاد می‌شنود؟ (سرعت صوت در هوا $\frac{340\text{ m}}{\text{s}}$ فرض شود)</p>	۰/۷۵
۱۳	<p>در مکانی که مقدار شتاب گرانشی $\frac{9}{75}\text{ m/s}^2$ است، دوره تناوب یک آونگ ساده در حال نوسان، 2 ثانیه است.</p> <p>الف) طول آونگ چند متر است؟ ($\pi = 3.14$)</p> <p>ب) آیا جرم آونگ تأثیری در بسامد آونگ دارد؟</p>	۰/۷۵ ۰/۲۵

ساعت شروع: ۸ صبح	نام و نام خانوادگی:	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۹۹/۰۵/۲۵	تعداد صفحه:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانشآموزان روزانه سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۹		

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سوالات	نمره
۱۴	<p>درستی یا نادرستی هر گزاره را با واژه ((درست)) یا ((نادرست)) مشخص کنید و در پاسخ نامه بنویسید.</p> <p>الف) آزمایش نشان می دهد که بیشینه نیروی اصطکاک ایستایی با اندازه نیروی عمودی سطح، متناسب است.</p> <p>ب) اگر کابل آسانسور پاره شود، آسانسور سقوط آزاد می کند و اندازه شتاب حرکت آسانسور برابر صفر است.</p> <p>پ) تاب خوردن کودکی که به طور دوره ای هل داده می شود مثالی از یک نوسان طبیعی است.</p> <p>ت) بلندی صوت، بسامدی است که گوش انسان درک می کند.</p> <p>ث) امواج الکترومغناطیسی تخت تابیده به یک سطح تخت، پس از بازتابش در یک نقطه کانونی می شوند.</p> <p>ج) یک موج صوتی با شدت $I = I_0$، تراز شدت صوتی برابر صفر دسی بیل دارد</p>	۱/۵
۱۵	<p>الف) شکل رو به رو، یک موج سینوسی را در لحظه ای از زمان نشان می دهد که در جهت محور x در طول ریسمان کشیده شده ای حرکت می کند.</p> <p>چهار جزء از این ریسمان روی شکل نشان داده شده اند. نام اجزایی که در این لحظه، به طرف پایین می روند را بنویسید.</p> <p>ب) کدام یک از دو شکل زیر، یک شکست نور را نشان می دهد که از لحاظ فیزیکی ممکن است؟ توضیح دهید.</p> <p style="text-align: center;">شکل (۲)</p> <p style="text-align: center;">شکل (۱)</p>	۰/۵
	<p>ب) سوالات بخش اختیاری</p> <p>دانشآموز عزیز جهت کسب ۴ نمره از بین سوالات ۱۶ تا ۲۳، فقط به ۴ سوال به دلخواه پاسخ دهید.</p>	۰/۷۵
۱۶	یک چشم نور فوتون هایی با طول موج 398nm گسیل می کند. انرژی هر فوتون چند ژول است؟ ($hc = ۱۹/۹ \times 10^{-۲۶} \text{ J.m}$)	۱
۱۷	طیف گسیلی یک جسم در چه مواردی پیوسته و در چه مواردی گستته (خطی) است؟ منشأ فیزیکی این تفاوت را توضیح دهید.	۱
۱۸	<p>الف) چرا به ایزوتوپ ها، هم مکان گفته می شود؟</p> <p>ب) چرا هسته اتم ها در واکنش های شیمیایی برانگیخته نمی شوند؟</p>	۰/۵
۱۹	جهای خالی در فرایندهای واپاشی زیر را کامل کنید. (در پاسخ نامه، هسته دختر با نماد ${}^A_Z Y$ نوشته شود)	۱
	$(1) {}^{۹۴}_{\text{Pu}} \rightarrow \dots + \alpha$ $(2) {}^{۱۸}_9 F \rightarrow \dots + {}_{+1}^0 \beta$	۰/۵

ساعت شروع: ۸ صبح	نام و نام خانوادگی:	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: فیزیک ۳
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۹۹/۰۵/۲۵	تعداد صفحه:	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانشآموزان روزانه سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۹		

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) مجاز می باشد.

ردیف	سوالات	نمره
۲۰	با توجه به مفاهیم حرکت هماهنگ ساده، واژه مناسب برای هر گزاره را مشخص کنید و در پاسخ نامه بنویسید. الف) تندی بیشینه نوسانگر برابر حاصل ضرب بسامد زاویه‌ای در نوسان است. ب) بسامد زاویه‌ای سامانه جرم - فنر با جذر به طور وارون، متناسب است. پ) انرژی پتانسیل سامانه جرم - فنر در نقاط بازگشتی است. ت) با کاهش تندی نوسانگر، انرژی نوسانگر ثابت می‌ماند.	۱
۲۱	الف) طول موج و تندی انتشار پرتوهای گاما و پرتوهای فرابنفش را هنگام انتشار در خلا با هم مقایسه کنید. ب) منظور از جبهه‌های موج (هنگام تشکیل موج بر سطح آب) چیست؟	۰/۵ ۰/۵
۲۲	نمودار سرعت - زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می‌کند و در لحظه $t = 0$ از مکان $x = 0$ می‌گذرد همانند شکل زیر است. سرعت متوسط این متحرک در بازه زمانی صفر تا ۱۵s را حساب کنید.	۱
۲۳	همانند شکل رو به رو، جسمی را با نیروی افقی $F = 10\text{ N}$ به دیوار فشرده و ثابت نگاه داشته‌ایم. الف) سایر نیروهای وارد بر جسم را در پاسخ نامه رسم کنید. ب) نیروی خالص وارد بر جسم چقدر است؟	۰/۷۵ ۰/۲۵
	شاد و سلامت باشید	۲۴

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) پاره خط جهت داری که مکان آغازین حرکت را به مکان پایانی حرکت وصل می کند. ب) اگر جابه جایی هر جزء نوسان کننده ای از محیط، در راستای انتشار موج باشد موج را موج طولی می گویند.	۱
۲	الف) 85 (۰/۲۵) $v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (۰/۲۵) $v_{av} = \frac{16 - ۹}{۸ - ۶} = ۳ / ۵ \text{ m/s}$ (۰/۵) ب) $l = ۱۶ \text{ m}$ (۰/۲۵)	۱/۲۵
۳	الف) $a = ۱ \text{ m/s}^2$ (۰/۲۵) $v_{av} = \frac{v + v_o}{2}$ (۰/۲۵) $\frac{10}{\Delta t} = \frac{6 + 4}{2}$ (۰/۲۵) ب) $\Delta t = ۲s$ (۰/۲۵) 25 ص. (۰/۲۵)	۱/۵
۴	الف) بازه زمانی $t_۲ - t_۱ = ۰$ بازه زمانی $t_۴ - t_۳ = ۰$ (۰/۲۵) ب) کندشونده است (۰/۲۵) اندازه سرعت در حال کاهش است.	۱
۵	الف) قانون سوم (۰/۰) ص. ۲۹ . ب) قانون اول (۰/۰) ص. ۲۹ .	۰/۵
۶	الف) $T = ۲۰۰ N$ (۰/۰) ص. ۴۳ .	۰/۷۵
۷	الف) (۱) ص. ۴۱ . ب) هر مورد (۰/۰) ص. ۲۹ .	۱
۸	الف) $F_{net} = F - F_{ مقاومت } = ۶۰۰ N$ (۰/۰) ص. ۶۰۰ . ب) شتاب قایق به طرف جلو (۰/۰) ص. ۳۱ .	۱/۷۵
۹	الف) $x = A \cos \omega t$ (۰/۰) ص. ۵۶ .	۰/۷۵
۱۰	الف) $v = \sqrt{\frac{F \cdot L}{m}}$ (۰/۰) ص. ۶۵ . $v = \sqrt{\frac{۵۰ \times ۰ / ۸}{۰ / ۴}} = ۱۰ \text{ m/s}$ (۰/۰) ص. ۶۵ .	۰/۷۵
۱۱	الف) جنس محیط (۰/۰) دمای محیط (۰/۰) ص. ۷۱ . ب) امواج الکترومغناطیسی، از میدان های الکتریکی و مغناطیسی تشکیل شده اند و این میدان های برای انتقال انرژی به محیط مادی نیاز ندارند. (۰/۰) ص. ۶۸ . پ) ضریب شکست محیط (منشور) برای طول موج های مختلف نور، متفاوت است. (۰/۰) ص. ۸۷ .	۱/۷۵
۱۲	الف) $t = \frac{۲L}{v}$ (۰/۰) ص. ۷۹ . $t = \frac{۲ \times ۲۰۴}{۳۴۰} = ۱ / ۲s$ (۰/۰) ص. ۷۹ .	۰/۷۵
۱۳	الف) $T = ۲\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ (۰/۰) ص. ۱۳ . $L = ۰ / ۹۷۵ \text{ m}$ (۰/۰) ص. ۱۳ .	۱
	ب) خیر (۰/۰) ص. ۵۹ . ادامه راهنمای تصحیح در صفحه دوم	

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: فیزیک ۳

رشته: علوم تجربی

ساعت شروع: ۸ صبح

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

تخصصی ترین مشاوره کشور


تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

تعداد صفحه: ۲

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
<http://aee.medu.ir>

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

دانش آموزان روزانه سراسرکشور شهریورماه سال ۱۳۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۴	(الف) درست ص. ۳۸. ب) نادرست ص. ۳۷. ت) نادرست ص. ۷۴.	۱/۵ پ) نادرست ص. ۶۰. ج) درست ص. ۷۳. هر مورد (۰/۲۵)
۱۵	الف) ص. ۹۰. ب) شکل (۲). (۰/۲۵) طبق رابطه $\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{n_1}{n_2}$ ، چون ضریب شکست محیط دوم بیشتر است، تندی انتشار کمتر و زاویه شکست از زاویه تابش کوچکتر می شود. (۰/۵) ص. ۸۶.	۱/۲۵
۱۶	مصحح گرامی اگر دانش آموز به بیش از ۴ سؤال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط ۴ سؤال اول را تصحیح نمایید.	
۱۷	طیف گسیلی جسم جامد، پیوسته (۰/۲۵) و طیف گسیلی گاز کم فشار و رقیق، گستته (خطی) است. طیف پیوسته ناشی از برهم کنش قوی بین اتم های سازنده جسم جامد است در حالی که اتم های منفرد گازها از این برهم کنش های قوی بین اتم ها، آزادند. (۰/۵) ص. ۹۹.	۱
۱۸	الف) هسته هایی که تعداد پروتون مساوی ولی تعداد نوترون متفاوت دارند خواص شیمیایی یکسانی دارند در نتیجه در جدول تناوبی عناصر هم مکان هستند. (۰/۵) ص. ۱۱۳. ب) زیرا اختلاف بین ترازهای انرژی نوکلئون ها در هسته از مرتبه MeV تا مرتبه KeV است در حالی که اختلاف بین ترازهای انرژی الکترون ها در اتم از مرتبه eV است. (۰/۵) ص. ۱۱۵.	۱
۱۹	ص. ۱۲۴. (۱) $^{238}_{92}Y$ (۰/۵) (۲) $^{18}_8Y$ (۰/۵)	۱
۲۰	الف) دامنه ص. ۵۹. ب) جرم وزنه ص. ۵۷. پ) بیشینه ص. ۵۸. ت) مکانیکی ص. ۵۸. هر مورد (۰/۲۵)	۱
۲۱	الف) طول موج پرتو گاما کمتر از پرتو فرابینفش (۰/۰) و تندی انتشار هر دو پرتو، برابر است. (۰/۲۵) ص. ۹۱. ب) به هر یک از برآمدگی ها یا فرفتگی های ایجاد شده روی سطح آب، یک جبهه موج می گویند. (۰/۵) ص. ۶۳.	۱
۲۲	الف) رسم درست هر بردار نیرو (۰/۲۵) ب) صفر (۰/۲۵) $\Delta x = s_{V-t} = \frac{(15+5) \times 10}{2} = 100 \text{ m} \quad (۰/۵) \quad v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{100}{15} \approx 6.6 \text{ m/s} \quad (۰/۵) \quad \text{ص. ۲۰.}$	۱
۲۳		۱
۲۴	همکاران محترم ضمن عرض سلام و خسته نباشید لطفاً برای دیگر پاسخ های درست، نمره منظور شود. www.Heywagroup.com	